

نور محمد علی صاحب دکن

انجمن ترقی دکن

Syed A. Shah

11-11-18

ترکاریاں -

تصیف ۱۸۹۹ء

۴ لٹا

۲ آٹا

۱ گندہ

۲ مینہ

$\frac{1}{2}$  بھول

$\frac{1}{4}$  مینہ

۱ لٹا

۱ لٹا

۴ مری



کھیتا ہے      پہلی زمین کے لکھی ترکاڑیاں  
 مٹی      یوٹا      کھیتا ہے

(1) خجوزہ = 41      //      11      +

(2) ترکوزہ = 44      //      11      +

(3) شکر خندہ = 72      0      0

(4) ادرب = 95      0      0

(5) ماقلم = 111      x      x

(6) گاج = 153      x      نرم زمی

(7) 169 = 55      0      0

(8) پیاز = 212      x      x

x      بزرگی فردی

x      بنگن

//      مٹی

—      کھیتا

x      تلخ

x      خندہ







# خلاصہ تمہید طبع اول

پروردگار حقیقی نے انسان کی خوراک کے لئے جو بے بہا نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سبزی ترکاری بھی ایک ہے۔ انسان کی روز مرہ کی ضرورت زندگی میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ عالمان علم طب اس امر پر متفق الہائے ہیں کہ ہر شخص کو اپنی معمولی خوراک کے ساتھ ہر روز مختلف اقسام کی تازہ سبز ترکاریاں ضرور استعمال کرنی چاہئیں۔ یہ علاوہ تغذیہ کے صلیح خون کو پیدا کرتی ہیں اور اسے صاف رکھنے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ علاوہ ازیں اگر غور سے دیکھا جاوے تو ان کے بغیر انسانی خوراک بالکل بے لطف ہے۔ ہر سبز ترکاری میں نیا اور انواع و اقسام کا ذائقہ ہوتا ہے اسلئے خوش خور اور تبدل پسند طبائع کے اصحاب انھیں مختلف طور پر استعمال میں لاتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک مدت دراز سے ہمارے بازاروں اور باغیچوں میں سبز ترکاریوں کی بہت قلت چلی آتی ہے۔ بالعموم بوئے والوں کو معدودے چند ترکاریوں کے سوا اور زیادہ کا نہ علم ہوتا ہے اور نہ وہ ان کے طریق کاشت سے ماہر ہوتے ہیں۔

چند ترکاریاں جو اس وقت جا بجا کاشت کیجاتی ہیں انکی حالت میں کسی



قسم کی ترقی نہیں ہوئی۔ خاص خاص موسموں میں خاص خاص ترکاریاں  
صرف بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں میسر آتی ہیں۔ آپ کو کئی  
ایسے شہر اور قصبے بھی ملیں گے کہ جہاں دو ایک موسمی ترکاریاں بھی  
شکل سے ملتی ہیں اور اگر تھوڑی بہت ملتی بھی ہیں تو اسقدر گراں کہ  
ہر شخص انہیں آسانی سے خرید نہیں سکتا۔ اگر سوچا جاوے تو اس نعمت  
عظمت سے محروم رہنے کی وجہ سوائے ہماری عدم توجہی اور لاعلمی کے  
اور کوئی نظر نہیں آتی۔ اگر لوگوں کو شوق ہو تو بہت تھوڑی سی جگہ  
میں بہت کم تردد سے سب ترکاریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر عوام کو فوراً  
بھی شوق ہو تو بیسیوں نئی قسم کی سب ترکاریاں باسانی تمام متیا ہو سکتی  
ہیں۔ نیز بچوں کے تغیر و تبدل سے موجودہ ترکاریوں کی حالتیں بھی نمایاں  
ترقی ہو سکتی ہے؛ یورپ میں سب ترکاریوں کی کاشت کے بارہ میں چند  
مستند کتابیں موجود ہیں اور ہمیشہ ان کی ترقی کے لئے اخبارات اور اس  
فن کے خاص رسالجات میں بحث ہوتی رہتی ہے۔ اردو میں بظاہر ایک  
کتاب بھی اب تک ایسی مکمل موجود نہیں نظر پڑی جس میں وضاحت کے ساتھ باقاعدہ  
اس مضمون پر مبتدیوں اور نو آموز اصحاب کے لئے ضروری ہدایات قلمبند  
کی گئی ہوں؛ اس کتاب کے لکھنے کی خاص غرض یہ ہے کہ لوگوں کو اس  
جانب توجہ ہو اور وہ سب ترکاریوں کی تعداد بڑھانے اور ان میں عمدگی پیدا  
کرنے کی طرف راغب ہوں؛

جن اصحاب کو چمن بندہ اور کھیتی باڑی کے معاملات سے واسطہ پڑا



ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ سبز ترکاریوں کی کاشت کچھ کم نفع انگیز نہیں  
 ہے۔ بالخصوص اُن مقامات پر جہاں آس پاس آبادی ہو۔ دیہات میں  
 گو سبز ترکاریوں کا اسوقت بہت خرچ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عام  
 لوگ کھیتوں کے ساگ پات سے کام چلا لیتے ہیں لیکن اگر وہاں بھی ہر  
 موسم کی مختلف ترکاریاں بقدر ضرورت پیدا ہوا کریں تو اُمید قوی ہے  
 کہ بہت سے لوگ انھیں شوق سے خرید لیا کریں۔ نیز اُن کا بہت سا  
 حصہ قرب و جوار میں فروخت کے لئے بھیجا جا سکتا ہے۔ جوں جوں لوگ  
 ان کے عادی ہوتے جاوینگے اور ان کے فوائد اور قدر و منزلت کو  
 سمجھنے اور پہچاننے لگیں گے ویسے ہی اُنکی ضرورت بڑھتی جاوے گی۔  
 سبز ترکاریوں کی کاشت تھوڑی سی زمین میں ہو سکتی ہے اور تھوڑے  
 سے سرمایہ اور تھوڑی سی محنت سے منافع کثیر حاصل ہو سکتا ہے۔  
 مثلاً اگر صرف آلوؤں کی ہی کاشت کو ترقی دیجائے تو بہت تھوڑے عرصہ  
 میں تمام اخراجات نکال کر ایک معقول رقم پچ رہتی ہے۔ آلو مدت تک  
 اپنی اصلی حالت پر قائم رہ سکتے ہیں اور دُور دراز کے مقامات میں بھی  
 آسانی تمام جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بہت سی چیزیں مثلاً سفید و  
 سُرخ شکر قند۔ زمیں قند۔ رتالو۔ مختلف قسم کی ارویاں۔ کٹی قسم کے ماتھی  
 چک وغیرہ ایسی اشیاء ہیں کہ احتیاط اور حفاظت سے انھیں دیر تک رکھ  
 سکتے ہیں اور حسب موقعہ معقول نفع پر انھیں فروخت کر سکتے ہیں۔ دیگر  
 سبز ترکاریاں جو زیادہ عرصہ تک نہیں ٹھہر سکتیں ضرورت کے مطابق بدل



کے ذریعہ صبح سے شام تک دور دور پہنچ سکتی ہیں۔ غرضکہ یہ کام آدمی کا ایک معقول ذریعہ ہے بشرطیکہ عہدگی کے ساتھ کیا جاوے۔ جو اصحاب اپنے مکانات اور کوٹھی بنگلوں اور باغ باغیچوں میں اپنے اہتمام کے لئے ان کی کاشت کرانا چاہیں انھیں بھی بہت فائدہ ہو سکتا ہے \* اس کتاب کی تیاری میں مسٹر گولن گورنمنٹ سپرنٹنڈنٹ بوٹانیکل گارڈنز سہارنپور کی انگریزی کتاب کے مفید نکات سے زیادہ مدد ملی ہے۔ نیز پادری فرمنجر صاحب، ڈورو صاحب و بیٹن صاحب اور دیگر لائق و تجربہ کار اصحاب کے اشارات نے بھی بہت کچھ کام دیا ہے۔ انگریزی کے زراعتی رسالوں اور بڑے بڑے تخم فروشوں کے اشتہارات سے بھی بعض موقعوں پر مدد کی گئی ہے \*۔

میں خوب سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کتاب میں بہت کچھ ترقی کی گنجائش ہے مگر یہ کام ایک دن کا نہیں ہے رفتہ رفتہ سب کچھ ہو جاوے گا۔ ہمیں پہلے لوگوں میں اس فن کا مذاق پیدا کرنا ہے پھر ان سے قدر دانی و حوصلہ افزائی کی اُسید کی جا سکتی ہے۔ قسم قسم کی نباتات۔ بیسیوں اقسام کے ساگ اور جڑیں جنگلوں۔ دریاؤں اور میدانوں میں پیدا ہوتی ہیں جنکی اگر باقاعدہ کاشت کیجاوے تو وہ ہماری سبز ترکاریوں کی تعداد بڑھانے کے علاوہ اور کئی طرح مفید ثابت ہو سکتی ہیں \*۔

ہندوستان خود ایک بڑا عظیم اور خلاصہ عالم ہے۔ اسکے ہر حصہ میں مختلف اقسام کی نباتات اُگتی ہیں اور اُس نواح کے باشندے انھیں نہایت



لذیذ اور صحت بخش سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوشش کیجاوے تو وہ  
 اور مقامات میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن ان تجربات کے لئے کچھ  
 وقت اور سرمایہ درکار ہے اور یہ مدعا اسوقت تک حاصل نہیں ہو سکتا  
 جب تک کہ لوگوں کو اس جانب دلی شوق نہ ہو۔ بہت سی خود رو نباتات  
 دریاؤں جھیلوں۔ اور ندی نالوں کے کنارے اور کھیتوں میں پیدا ہوتی ہیں  
 ان میں سے بہت سی بطور سبترکاری استعمال کیجا سکتی ہیں اور وہ  
 جہاں جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں کے باشندے انھیں استعمال بھی کرتے  
 ہیں مگر غیر مقامات کے لوگوں کو ان کی ہستی اور ماہیت کی مطلق خبر نہیں  
 ہوتی۔ اگر لوگوں میں اس فن کا مذاق ہو برابر بحث کرتے رہیں۔ اور  
 موزوں طریق سے نئی معلومات اور تجربوں کی کیفیت اور تفصیل مشہر ہوتی  
 رہے تو اس صیغہ میں بہت جلد نمایاں ترقی نمودار ہو سکتی ہے اور اسوقت  
 یہ امر تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ بہت سی خود رو چیزوں کی جب باقاعدہ  
 کاشت شروع کی گئی تو ان کی حالت بہت بہتر ہو گئی۔ وجہ یہ ہے کہ قدرت  
 ہمیں ہر ایک شے عطا کرتی ہے مگر ہنر اسے ترقی دیتا ہے۔



# باب اول

## ضروری ہدایات

پیشتر اسکے کہ سہر ترکاریوں کے طریق کاشت کی نسبت کچھ لکھا جاوے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نو آموز اور شایقین کے لئے ضروری ہدایات قلمبند کی جاویں جن پر کار بند ہونے سے پوری کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان ہدایات کو ہم سات حصوں میں منقسم کرتے ہیں۔ انھیں کے ضمن میں بہت سی فروعی باتیں بھی آجائیں گی جنکا سمجھنا اور جاننا اس فن کے شایقین کے لئے کچھ کم ضروری نہیں ہے :-

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| ۱۔ زمین               | ۵۔ تخم ریزی و پنیری لگانا۔ |
| ۲۔ زمین کو درست کرنا۔ | ۶۔ حفاظت تخم               |
| ۳۔ کھاویں۔            | ۷۔ موذی کیڑے مکوڑے اور     |
| ۴۔ آبپاشی             | جانوروں کے دفعیہ کے طریق۔  |

فیل میں ہر ایک امر کی نسبت تمام ضروری باتیں علیحدہ علیحدہ تجربہ کار اشخاص کے اقوال کے مطابق جن کی رائے اس فن میں مستند تسلیم کی جاتی ہے وضاحت سے لکھی جاتی ہیں۔



# زمین

## (soil)

چونکہ ہر ایک سبز ترکاری کے اجزاء اور خواص مختلف ہوتے ہیں اسلئے وہ سب یکساں زمین میں پیدا نہیں ہو سکتیں۔ ہر ایک ضلع میں بیسیوں قسم کی زمینیں ہوتی ہیں اور اُنکے جداگانہ نام ہوتے ہیں پس عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بالعموم سبز ترکاریاں ایسی زمین میں بخوبی پیدا ہو جاتی ہیں جہیں مٹی یا گھوں پیدا ہو سکتے ہیں۔ گویا یہ ایک آسان معیار ہے۔ سبز ترکاریاں بونے کے لئے زمین کی مٹی کو زیادہ باریک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ نرم و نازک بیلین اور رس وار پودے سخت جگہ اور ڈھیلوں میں مشکل سے نشو و نما ہو سکتے ہیں۔ کیسی ہی ناقص زمین ہو محنت توجہ اور سرمایہ لگانے سے عمدہ اور طاقتور ہو سکتی ہے۔ متواتر نباتاتی حیوانی اور کسیدہ سعدنی کھاویں دینے اور فصلیں بونے سے وہی زمین جو ابتداء میں سخت شوئی یا کمزور دکھائی دیتی تھی قیمتی ہو جاتی ہے اور خود بخود سونا اگلنے لگتی ہے۔ سبز ترکاریاں بونے کے لئے ایسی زمین موزوں نہیں ہوتی جو نہایت کڑی اور بہت چکنی ہو۔ ایسی زمین کی پہچان یہ ہے کہ تر ہو کر کیچڑ اور خشک ہونے پر لوسے کی مانند سخت ہو جاتی ہے۔ بعض زمین کنکریلی یا ایسی سخت ہوتی ہے کہ مشکل سے اسپر قلبہ رانی کر سکتے ہیں۔ ایسی زمینوں میں سبز ترکاریاں اسوقت تک اچھی طرح سے نشو و نما نہیں ہو سکتیں جب



کہ انکو لگا تار محنت اور اچھی کھادوں سے درست نہ کر لیا جاوے +  
 پہلے ان میں خوب گہری جوتائی کر کے نیچے کی مٹی اوپر اور اوپر کی مٹی  
 نیچے کرنی چاہئے۔ کچھ دنوں انھیں الٹ پلٹ کر ہوا اور حرارت آفتاب  
 سے مستفید ہونے کے لئے چھوڑ دینا چاہئے۔ پھر ان میں حسب حیثیت زمین  
 سبز کھاد۔ بوسیدہ گوہر اور گھوڑوں کی لید بھڑ بکری کی پینگنیاں بوسیدہ پتوں  
 کی کھاد اور کھاد مجموعہ خوب ڈالنی چاہئے۔ اس طرح دو چار مرتبہ کاشت کرنے  
 سے وہ زمین بتدریج عمدہ اور قیمتی بن جائیگی اور اُس میں سبز ترکاریاں اسی  
 آسانی سے پیدا ہو سکیں گی جیسی عمدہ باغیچوں میں ہوتی ہیں۔ گو ابتداء میں  
 پیداوار کم ہو گی مگر رفتہ رفتہ زیادہ ہوتی جاوے گی۔ ریتیلی یا نرمی ریتیلی  
 زمینیں بھی عام طور پر ہر ایک ترکاری کو پیدا کرنے میں قاصر ثابت ہوتی  
 ہیں مگر انھیں بھی اسی ترکیب سے کار آمد اور درست کر سکتے ہیں۔ بالکل بنجر  
 قطعات بھی تروڑ کرنے سے زرخیز ہو سکتے ہیں مگر پہلے کچھ لاگت لگانی پڑتی ہے

## زمین کو درست کرنا

(Preparation of soil.)

درستی زمین کی نسبت صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ کیاریوں میں تخم نری  
 کے وقت کنکر پتھر ٹھیکریاں مٹی کی ڈلیاں اور ناکارہ گھاسیں وغیرہ نہ رہنے  
 پاویں۔ مٹی خوب باریک ہو جاوے اور حسب ضرورت کھادیں دیدی جاویں +  
 کیاریوں کی تقسیم اور روش پٹری کی نسبت کوئی خاص صورت بیان نہیں



کی جا سکتی کیونکہ یہ امر زمین کی جائے وقوع اور اُس کے طول و عرض  
 وغیرہ پر منحصر ہے۔ البتہ یہ ضرور خیال رکھنا چاہئے کہ کھاریاں اس ڈھب سے  
 بنائی جاویں کہ آمد و رفت کے لئے آسانی رہے اور اُن میں پانی بسہولیت  
 تمام دیا جا سکے۔ کنوئیں سے نالیاں اس طرح لائی جائیں کہ راستہ میں اعتدال  
 کے موافق ڈھال رہے تاکہ پانی روانی کے ساتھ کھاریوں میں پہنچ سکے۔  
 پنج میں رُک نہ جاوے یا کھاریوں کی سطح پر کم و بیش نہ پہنچے۔ جب ڈھال  
 اچھی رہتی ہے تو کھاریوں میں یکساں پانی پہنچتا ہے ورنہ کہیں زیادہ اور  
 کہیں کم۔ اگر کھاریوں کی سطح ہموار نہ ہوگی تب بھی یہی نقص باقی رہیگا۔  
 کیونکہ نشیب میں قدرتا پانی زیادہ جمع ہو جاویگا اور بلندی پر تھوڑا پہنچےگا۔  
 اگر موسم گرما میں جبکہ موسم خشک ہو اور دھوپ زیادہ پڑتی ہو کھاریوں کو درست  
 کرنا ضروری ہے تو بہتر ہے کہ پہلے انھیں پانی سے تر کر لیا جاوے۔ اور  
 جب مٹی اعتدال کے موافق نرم ہو جاوے تب کام شروع کر دیں۔ اس طرح  
 سے محنت اور وقت کا بہت بچاؤ ہو جاتا ہے۔ خشک اور سخت زمین کو کھودنا  
 یا اسپرل چلانا اور پھر ڈھیلے توڑنا بہت محنت اور وقت لیتا ہے مگر وار  
 زمین میں یہ عمل نہایت آسانی سے بہت تھوڑے وقت میں ہو جاتا ہے  
 مگر بہت تر اور گیلی زمین میں یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہئے ورنہ یاد رہے کہ کام  
 اچھی طرح نہیں ہو سکے گا اور جو گیلی مٹی کے ڈھیلے بندھ جاویں گے وہ دھوپ  
 میں خشک ہو کر اینٹیں اور روڑے بن جاویں گے جن کے توڑنے اور باریک  
 کرنے کے لئے پھر اتنی ہی محنت درکار ہوگی جتنی خشک زمین کو درست



کرنے پر صرف ہوتی ہے اصل پودے اپنی خوراک زمین کی دو تہوں سے حاصل کرتے۔ ایک بیرونی سطح سے جسے انگریزی میں (Soil) کہتے ہیں اور یہ ۱۸۔ انچہ تک عمیق ہوتی ہے اس سے نیچے دوسری تہ شروع ہو جاتی ہے جسے اندرونی تہ یا تہ زمین اور انگریزی میں (Subsoil) سب سائل کہتے ہیں اگر بیرونی سطح یعنی زمین کی مٹی کمزور ہو اور تہ زمین کی طاقتور تو گہری کھدائی کرانا یا گہرا ہل چلوانا بہت مفید ہو گا۔ اگر تہ زمین کی مٹی کمزور ہے اور بیرونی سطح کی طاقتور تو گہرا ہل یا گہری کھدائی نہیں ہونی چاہئے۔ رفتہ رفتہ تہ زمین کو توڑنا چاہئے۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا گہرا ہل چلوا دیں کہ تہ زمین کی ایک انچہ مٹی کو باریک کر کے اوپر کی مٹی کے ساتھ ملا دے پھر دوسری فصل کی جوتائی کے وقت ایک آدھ انچہ اور گہرا ہل چلوا دیں اس طرح سے طاقتور زمین کے ساتھ ملنے۔ کھا دوں۔ ہوا اور حرارت آفتاب سے تہ زمین کی مٹی زرخیز اور طاقتور ہو جاوے گی۔ نیز ترکاریوں کی چشت کے مطابق بھی ہلکی اور گہری جوتائی کیجاتی ہے۔ مثلاً آلوں اور شکر قند وغیرہ کے لئے جوتائی گہری ہو گی اور سولے پالک کے لئے ہلکی +

## کھاویں (یا پاش)

(Manure)

کھاووں کا کھیتوں اور باغیچوں میں دینا بہت ضروری اور مفید عمل ہے۔ کیسی ہی ابتدا میں طاقتور زمین ہو لگا تار فصلیں بونے سے وہ کمزور اور بیکٹی ہو جاتی ہے۔ زمین سے جو اجزاء ترکاریوں وغیرہ کے ذریعہ نکال لئے جاتے



ہیں وہ انھیں اگر کسی ترکیب سے واپس نہ دیتے جاویں تو نتیجہ خراب نکلتا ہے پودے  
اپنی خوراک کچھ تو زمین سے حاصل کرتے ہیں کچھ کنوئیں نہر اور بارش کے پانی سے اور  
کچھ ہوا سے انکی پرورش کے سامان ان چیزوں میں قدرت نے کافی طور پر مہیا کیے ہیں  
کھاد جو سبز ترکاریوں کی کاشت کے لئے ڈالی جاوے اُسکا خوب بوسیدہ  
ہونا اشد ضروری ہے ورنہ عرصہ تک کیاریوں اور کھیتوں میں بیکار پڑی  
رہے گی بلکہ اُسکے سبب کھیتوں میں دیمک اور کیڑے مکوڑے پیدا ہو جانے  
کا پورا احتمال رہتا ہے۔ ہم ذیل میں سبز ترکاریوں کے لئے چار قسم کی کھادوں  
کی سفارش کرتے ہیں جو تجربہ سے یقین ہے کہ نہایت مفید ثابت ہونگی  
۱۔ کھیتوں یا کیاریوں میں جو خشک جڑیں باقی رہ جاتی ہیں یا خورد رویشیاں  
اور کئی قسم کی گھاسیں اور خار دار جھاڑیاں جو فصل کاٹنے کے بعد پیدا  
ہو جاتی ہیں ان کو بالعموم دوسری فصل بونے کے وقت جب زمین درست  
کیجاتی ہے تو اکھاڑ کر فضول پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر سمجھا جاوے تو یہ نقصان  
کثیر ہے اس قسم کی روئیدگی اور ایسے پودوں میں وہ بہت سے اجزاء موجود  
ہوتے ہیں جو پودوں کے تغذیہ و تنمیه کے لئے درکار ہیں مان کو ضائع  
کر دینا کوتاہ اندیشی و کم فہمی ہے۔ ان کی کھاد بنانے کا تجربہ سے سب سے  
بہتر طریق یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کو کٹوا کر اور اکھڑوا کر کیاریوں یا کھیتوں  
میں جمع کرا کے آگ دیدی جاوے مگر وہ آگ زیادہ بھڑکنے نہ پاوے بلکہ  
بہت مدھم مدھم سلگتی رہے جس سے وہ خار و خس جل کر بالکل راکھ کا ڈھیر  
نہ بن جاویں بلکہ چھوٹے چھوٹے اور پتلے پتلے کوئلے ہو جاویں۔ جب آگ



زیادہ بھڑکے تو باتھنگی اس پر پانی کے چھینٹے دے دے کر مدھم کر دیں۔  
 جو کھوڑی بہت راکھ پنچ رہے گی وہ بھی بہت کام کی چیز ہے۔ ان کوٹلوں  
 اور راکھ کو کیاریوں میں پھیلا سکتے ہیں اور یہ ایک بیش قیمت کھاد ہے۔  
 اسکے چھوٹے چھوٹے کوٹلے پانی کو جلد جذب کر لینے ہیں اور دہر تک نمی کو  
 خارج نہیں ہونے دیتے یہی وجہ ہے کہ ان کے باعث زمین عرصہ تک تر  
 رہتی ہے۔ راکھ بہت باریک ہونے کے سبب دیر تک تری کو قائم نہیں  
 رکھ سکتی۔ اس قسم کی کھاد پودوں کو باتھنگی ضروری بہم پہنچاتی رہتی ہے۔  
 (۱۲) کھاد مجموعہ۔ کھاد مجموعہ میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اور یہ کھاد سبز  
 ترکاریوں کی کاشت کے لئے بیش بہا اور مفید ثابت ہوئی ہے مگر اس کا  
 خوب بوسیدہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ کسی دور افتادہ جگہ میں ایک گڑھے  
 میں گائے بھینسوں کا گوبر۔ پس خوردہ بھوسہ سانی کی بچی ہوئی گھل۔ بھیر  
 بکریوں اور اونٹوں کی مینگنیاں گھوڑوں کی لید۔ سبز ترکاریوں کے پتے۔ چھلکے  
 اور ککڑی۔ اور کندوں کی راکھ وغیرہ جمع کرانے جاویں اور ساکھ کے  
 ساتھ ان پر ہلکا سا مٹی کا غلاف بھی چڑھاتے جاویں تاکہ اس کھاد کے  
 بہت سے اجزاء ابجرات بنکر اڑنے سے پنچ جاویں۔ غلاف چڑھانے سے  
 مراد یہ ہے کہ دو چار ٹوکریاں مٹی کی کھاد کے اوپر اس طرح سے ڈلوائیں  
 کہ وہ تمام سطح پر پھیل جاوے۔ اس کے اوپر پھر بدستور کھاد ڈلوانی شروع  
 کر دیں۔ جب کچھ مقدار جمع ہو جاوے تو پھر مٹی ڈلوادیں۔ اس قسم کی کھاد  
 گڑھوں میں بھی جمع کرا سکتے ہیں اور اونچے اونچے ڈھیروں کی صورت



میں بھی گڑھے کے چاروں طرف دو ڈھائی بالشت اونچی کچی مسٹر بنوا دیں تاکہ زور کی بارش کے وقت اس پاس کا پانی بہ کر کھاد کے گڑھوں میں نہ جمع ہو جاوے۔ ورنہ کھاد کے اجزاء گھل کر حرارت آفتاب کے ذریعہ بہت کچھ اڑ جاویں گے۔ کھاد ڈلوانے سے پہلے اگر گڑھے کی تہ میں پکٹی اینٹیں یا روڑے بچھوا دیئے جاویں تو انبہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کھاد کے رفیق اجزاء زمین کے اندر سرایت نہیں کر جاوینگے۔ گڑھے کی تہ کے پاس دیواروں پر بھی دو دو فٹ کی اونچائی تک چکنی مٹی سے موٹا موٹا لپوا دیں۔ تجربہ سے تحفظ کھاد کے لئے یہ عمل نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ اگر یہ دیکھیں کہ جس زمین میں فصل بونی ہے اس کی مٹی اعتدال سے زیادہ چکنی ہے تو کھاد مجموعہ کے ساتھ کسی قدر دریا یا کنوئیں کا موٹا اور چمکیلا بالوریت شامل کر دیں۔ یہ چکنی مٹی کے مساموں کو کشادہ رکھنے میں پوری مدد دیگا۔

۳۔ پتوں کی کھاد۔ یہ ایک قدرتی کھاد ہے جس سے بہت سہل طریق سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موسم خزاں میں جب پت جھڑھوتا ہے اس وقت پتے جمع کرا کے کسی گڑھے میں ڈھیر لگوانے شروع کرا دیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا باریک نمک ان پر چھڑک دیا جائے تو بہت کچھ فائدہ دیگا اور انجام میں سارے اخراجات کی کسر نکال دیگا کٹڈوں اور لکڑی کی راکھ بھی ایک حصہ ڈلواتے جاویں تو بہت بہتر ہے۔



اوپر مٹی کا ہلکا سا غلاف برابر چڑھاتے جاویں تاکہ کھاد محفوظ رہے۔ یہ کھاد جب خوب تخمیر ہو کر بوسیدہ ہو جاوے اُسوقت کام میں لایں۔ ایک سال کے اندر یہ قابل استعمال ہو جاتی ہے۔

ایک صاحب اپنے ذاتی تجربہ سے پتوں کی کھاد بنانے کی ایک نئی ترکیب لکھتے ہیں جسکا غالباً عوام کو بہت ہی کم خیال ہو گا وہ فرماتے ہیں کہ پتوں کو لیکر دو تین دن دھوپ میں خشک کر لیں پھر لکڑی کی موگلی سے کٹوا کر اُن کا چُورا کرا لینا چاہئے۔ بعد ازاں لوہے کی چھلنی میں اُنھیں چھنوا لیں مگر چھلنی کے سُوراخ یا خانے بہت باریک نہیں ہونے چاہئیں۔ چھنا ہوا پتوں کا چُورا پتوں کی کھاد سمجھنا چاہئے اور اس کھاد کو فی الفور استعمال کر سکتے ہیں وہی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کھاد مُفید اور سریع التاثر ثابت ہوئی ہے۔ بہر حال اس نئی ترکیب کا مزید تجربہ ہونا چاہئے۔

۴۔ مٹی کی کھاد۔ دیمک کے ٹیلوں (White ant hill) کی مٹی نہایت عمدہ کھاد ہوتی ہے حسب ضرورت اسے کام میں لا سکتے ہیں۔

۵۔ سبز کھاد۔ سبز ترکاریوں کی کاشت کے لئے ”سبز کھاد“ بھی نہایت مُفید ہے۔ سبز کھاد عام طور پر اس طرح دیتے ہیں کہ سُن بو کر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اہل چلا کر اُسے مٹی کے نیچے کر دیتے ہیں تھوڑے ہی عرصہ میں وہ گل کر مٹی کے ساتھ آمیز ہو جاتا ہے اور کھاد کا کام دیتا ہے۔ لیکن یہ عمل وسیع رقبوں میں سہولیت کے ساتھ کیا جاسکتا ہے بلغیچوں میں بہتر یہ ہے کہ مٹر لوہے مولی کے۔ سینگرے۔ اروی۔ سیم اور کھلمج۔



وغیرہ پھلی دار پودوں سے جب پھلیاں اتر چکیں اور کچھ باقی رہاویں  
 تو معہ بیلوں کے اکھڑا کر دیں یا جہاں سبز کھاد دینی منظور ہو زمین  
 میں خوب پھیلوا کر دبوا دیں اور دیکھ لیں کہ اُنپر چھٹا انچہ مٹی چڑھ  
 گئی۔ مٹھوڑا سا پانی بھی دلوا دیں تاکہ جگہ تر ہو جاوے بہت جلد یہ  
 کھاد زمین کو طاقتور اور زرخیز بنا دیتی ہے۔ آگ (مدار) کے پتے اور اُسکی  
 شاخوں کے ٹکڑے اور نیل بکر جب وہ ڈیڑھ فٹ اونچا ہو جاوے۔ ہل چلوا دینا  
 اور ناگ پھنی کے پھن اور اُسکے تنہ کے ٹکڑے اور ڈنڈا مٹھوہر کے ٹکڑے کیاریوں  
 میں دبوا دینے بھی سبز کھاد میں شامل ہیں۔ مگر دبوانے سے پیشتر بہتر یہ ہے  
 کہ اُنہیں ڈرمٹ یا لکڑی کی موگلی سے کسید کر کٹوا دیا جاوے تاکہ اُنکے  
 آگ آنے کا احتمال باقی نہ رہے۔ چونکہ یہ کھاد زیادہ تیز ہوتی ہے اسلئے  
 بہتر ہے کہ اُس کے ساتھ درختوں کی شاخوں کے (جو چھانگ کر پھینک دی  
 جاتی ہیں) سبز پتے۔ ناکارہ گھاس پلاس جو نلائی میں اکھاڑ دیجاتی ہے اور  
 نیم خشک شدہ بیلین وغیرہ شامل کر دیجاویں۔ زمین میں داب کر چھ انچہ مٹی  
 چڑھوا دینی چاہئے۔ بہت جلد بیش قیمت سبز کھاد زمین کو بلجاویگی +

بہر حال اس قسم کی کھادیں سال ڈیڑھ سال کے اندر قابل استعمال  
 ہو جاتی ہیں۔ بہت سے اشخاص کی یہ رائے ہے کہ گہرے گڑھے کھدوا  
 کر اُن میں کھاد ڈلواتے جاویں جب وہ اتنے بھر جاویں کہ قریب قریب معمور  
 ہو جاویں تو اُنھیں مٹی سے بند کر اویں چونکہ وہ سطح زمین کے ہموار ہونگے  
 اسلئے کسی کو مشکل سے معلوم ہوگا کہ یہاں کیا ہے۔ اوپر گھاس پلاس



اگ آویگی۔ سطح سے کھاد دس مہینے کے اندر قابل استعمال ہو جاتی ہے  
مگر گڑھے کا منہ یتغہ کرانے سے پہلے اس قدر پانی ضرور چھوڑواویں جس  
سے کھاد کم دار ہو جاوے \*

۴۔ رقیق کھاد۔ پتلی کھادیں ایسے پودوں کو دینے سے زیادہ فائدہ  
متصور ہے جو خوب نشو و نما ہو رہے ہوں۔ کئی ولایتی سبز ترکاریوں  
کو رقیق کھاد دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً مارچوبہ اور گوبھی کے  
حق میں رقیق کھاد بہت مفید ہے \* باغیچہ کے کسی دور افتادہ گوشہ میں  
کسی آڑ کی جگہ میں زمین کے اندر ایک بڑا سا گھڑا یا خم گاڑ دیں اسیں  
گائے بھینسوں کا گوبر اور بکریوں کی مینگنیاں۔ پرندوں کی بیٹ وغیرہ  
ڈال کر پانی چھوڑ دیں۔ پانچ چار دن بعد نکال کر اور کچھ اور پانی ڈال کر  
پودوں کی جڑوں میں ڈالیں۔ اگر دیکھیں کہ یہ کھاد گاڑھی اور تیز ہے تو  
زیادہ پانی ڈال کر پتلی اور ہلکی کر لیں ورنہ نقصان متصور ہے۔ کسی  
ٹمین کے ٹونٹی دار برتن سے جسکا منہ آگے سے کشادہ ہو کھاد پودوں  
کی جڑوں میں دینی چاہئے۔ اگر مینگنیاں اور پرندوں کی بیٹ وغیرہ نہ  
ملے تو صرف گائے بھینسوں کا گوبر اور لید کا خم میں گھول دینا کافی ہے  
صابون اور رٹھیوں کو پانی میں گھول کر اور جھاگ اٹھا کر پودوں  
پر چھڑکنا اور اُن کی جڑوں میں ڈالنا گویا رقیق کھاد دینا ہے۔ تمام اقسام  
کی گوبھی کے لٹے یہ کھاد نہایت فائدہ مند ہے۔ اس سے کٹرے مکوڑے  
پودوں کے پاس کم آتے ہیں اور پودے خوب نشو و نما ہوتے ہیں



مگر کمزور اور بہت چھوٹے پودوں کو یہ کھاد ہرگز نہیں دینی چاہئے؛

## آبیاشی

(Irrigation)

سبز ترکاریوں کی کاشت کے لئے بالعموم کوڑوں سے آبیاشی کیجاتی ہے اور بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ لوگوں کو حسب سہولیت اختیار ہے کہ خواہ روٹ سے پانی دیں یا نہر چرسے۔ اور ڈھیکلی سے۔ یا کسی اور کل وغیرہ کے ذریعہ۔ کوئیں سے سیچنے سے بڑا فائدہ یہ تصور ہے کہ پانی کیاریوں میں اعتدال کے مطابق پہنچتا ہے۔ اگر کہیں نہر کا پانی دینا ہو تو مقدم احتیاط یہ رکھیں کہ پانی زیادہ نہ دیا جائے ورنہ بہت خرابیاں واقع ہونگی۔ جن کی تشریح اس موقع پر ضروری معلوم نہیں ہوتی۔ بالعموم اپنی جمالت اور لا پرواہی کے سبب لوگ نہروں کے پانی پر الزام لگاتے ہیں۔ مگر یہ ہمت غلط ہے۔ کوڑوں سے پانی دیتے وقت کچھ جسمانی محنت بھی کرنی پڑتی ہے اسلئے جہاں کیاریاں تر ہوئیں اسیوقت پانی بند کر کے اور میں موڑ دیتے ہیں مگر نہر کے پانی کو اندھا دھند چلنے دیتے ہیں یہاں تک کہ کیاریاں خاصی گڈبکی لگانے کے قابل ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں مٹی اعتدال سے زیادہ گھل جاتی ہے اور پودوں کی خوراک کے اجزاء کئی صوٹوں سے بہت جلد خارج اور ختم ہو جاتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصہ میں زمین



کمزور پڑ جاتی ہے۔ بعض باغیچے جہاں آب رسانی کا کام جاری ہے نل کے پانی سے بھی آبپاش ہو سکتے ہیں اس صورت میں بھی اعتدال مد نظر رکھنا چاہئے + جن کھیتوں یا کیاریوں میں بارش کا پانی زیادہ دیر تک کھڑا رہتا ہے اور کافی ڈھال نہ ہونے کے سبب وہیں جمع رہتا ہے یا بہت دیر میں خشک ہوتا ہے وہ درحقیقت پودوں اور بیلوں کو حد سے زیادہ گزند پہنچاتا ہے۔ بارش کا پانی پودوں پر خواہ کتنا ہی پڑے چنداں نقصان نہیں کرتا۔ لیکن جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور جڑوں میں مرنے لگتا ہے تو نباتات کے حق میں ضرر رساں ثابت ہوتا ہے۔ پس ابتداء سے ہی یہ خیال رکھنا چاہئے کہ کیاریوں کی ڈھال درست رہے +

## تخم ریزی اور پییری لگانا

(Seed sowing and Transplanting)

فصل کی عمدگی کا دار و مدار بیجوں پر ہوا کرتا ہے۔ اگر بیج عمدہ طاقتور اور صحیح و سالم ہونگے تو پودے بھی بہر صورت تناور اور اچھے پیدا ہونگے ورنہ بصورت دیگر پودے ناقص اور مریض برآمد ہونگے۔ یہاں ہاں بالعموم بیجوں کے حاصل کرنے اور انتخاب کرنے میں بہت کم توجہ کی جاتی ہے۔ جہاں سے جیسے بیج ملے لے آئے اور بو دیئے۔ یورپ میں صرف تخم فروشی کے بڑے بڑے کارخانے۔ لاکھوں گودروں روپیہ کے سرمایہ



سے بڑی عمدگی کیساتھ چل رہے ہیں۔ ان کارخانوں کا محض یہی کام ہے کہ ہر قسم کے تخم پرویار و امصار سے منگوا دیں یا خود پیدا کر کے دیں انھیں بحفاظت تمام رکھیں اور حسب فرمایش اپنے وطن اور مالک غیر کو بہم پہنچا دیں۔ ان کے گماشتے جو اس کام میں بہت مشاق ہوتے ہیں ہمیشہ اعلیٰ درجہ کے تخم خریدتے ہیں اور خوب غور سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان میں کسی قسم کا نقص تو نہیں ہے۔ مثلاً خام۔ نیم پختہ یا کرم خورد اور گھسنہ بیجوں کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے۔ پس اگر عمدہ فصلیں بونی منظور ہیں تو مقدم کام یہ ہے کہ اچھے بیج بولتے جا دیں۔ اس وقت بازاروں میں جس قدر سبز ترکاریاں ملتی ہیں وہ قریب قریب سب بہ ذائقہ اور بختمی ہوتی ہیں۔ انہیں ترکاریوں کے معتبر تخم فروش کارخانوں سے بیج منگوا کر بوئے یا جہاں سے عمدہ بیج ملیں یکر کاشت کرائیے پھر آپ کو خود بخود صورت شکل اور ذائقہ میں زمین و آسمان کا فرق معلوم ہو جاویگا۔ یورپ کے سوداگران تخم ہر سال لاکھوں روپیہ کا ہندوستان سے صرف بیجوں کا بیوپار کرتے ہیں اور ان کے بیوپار کو روز بروز ترقی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بیجوں کی قدر اور ماہیت کو سمجھتے ہیں اور اس تجارت کو فروغ دینے کے طریقہ کو چاہتے ہیں۔

اس کتاب میں جو ہر ایک سبز ترکاری کیلئے جو موسم کاشت دیا گیا ہے اس میں دو باتیں ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ یعنی بہت شروع کا موسم جبکہ تخم ریزی کر سکتے ہیں اور آخری سے آخری وقت جب تک بیج بو



سکتے ہیں۔ بولتے وقت ہر شخص اپنی سہولیت کو سمجھ سکتا ہے ہماری  
 رائے میں جو موسم کاشت اس کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اُس میں اوسط کے  
 ایام بہترین ہیں بہت پہلے بولنے سے بڑی غور و پرواخت کی ضرورت ہوتی ہے  
 بہت پچھیتی فصل بولنے میں جیسی کہ چاہئے کامیابی نہیں ہوتی۔ مگر یہ لازمی  
 نہیں ہے کہ تمام سبز ترکاریاں وسطی ایام میں بولی جاویں۔ اگر موسم فوالمراو  
 ہو اور زمین اچھی ہو تو اگیتی اور پچھیتی فصلوں میں چنداں نا کامی نہیں  
 ہوتی۔ مگر تخم ریزی کے لئے مدرس۔ بیسی۔ آلہ آباد۔ اور لاہور میں بھی کسی قدر  
 وقت کا تفاوت رکھنا پڑتا ہے۔ موسم سرما کی فصلوں کے لئے ولایتی تخم  
 بسا اوقات یورپ سے جولائی اور اگست میں یہاں آ جاتے ہیں۔ بہت  
 سے اصحاب اُنہیں فی الفور بوندیتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ  
 یا تو بالکل اُگتے ہی نہیں یا اُگ کر مرجھا جاتے ہیں۔ بات اصل یہ ہوتی  
 ہے کہ وہ بہت سرد ملک کے تخم ہوتے ہیں وہ یہاں جلدی بولنے نہیں  
 چاہئیں۔ البتہ ہمارے پہاڑوں پر جو سبز ترکاریاں ولایتی تخموں سے بولی  
 جاویں اُن کا لحاظ اور طرح رکھنا چاہئے۔ ہمارے پہاڑ سرد ہیں اور جو  
 سبز ترکاری ولایت میں اپریل میں بولی جاتی ہے وہی ہمارے پہاڑوں  
 پر بھی اپریل میں بولی جا سکتی ہے۔ مثلاً انگلستان کے میدانوں میں  
 پھول گوبھی کی ایک فصل اپریل میں بولتے ہیں پس سمجھ لینا چاہئے  
 کہ ہم اپنے پہاڑوں پر بھی اپریل میں پھول گوبھی بول سکتے ہیں۔  
 لیکن ہم اپنے میدانوں میں اگر پھول گوبھی بونا چاہیں تو ہمیں اکتوبر



تک انتظار کرنا پڑیگا۔ گویا ولایت کے سرد مقامات کی ترکاریاں ہمارے پہاڑوں پر قریب قریب یکساں وقت پر بوئی جا سکتی ہیں البتہ بعض ترکاریاں ایسی ہیں کہ زیادہ بلندی پر بغیر خاص ترقو کے پیدا نہیں ہو سکتیں +

تخم ریزی کے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ کیسے بیج کتنی گہرائی میں بونے چاہئیں۔ مثلاً مٹر اور باقلا وغیرہ کے بیج یا موٹے بیج ہمیشہ ڈیڑھ دو انچ گہرے بونے چاہئیں۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان پر دو انچ کے قریب مٹی کا غلاف چڑھانا چاہیئے۔ چھوٹی اقسام کے بیجوں پر صرف آدھ انچ مٹی کا غلاف کافی ہے اور بہت ہی ننھے ننھے بیجوں پر برائے نام مٹی چھڑک دینی چاہئے جس سے وہ ذرا ڈھک جاویں۔ موٹے اور بہت کڑے بیجوں کو اکثر دو چار گھنٹہ پانی میں بھگو کر بونا چاہئے۔ پنیری اکھاڑنے اور لگانے میں بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ اکھاڑتے وقت یہ لحاظ رہے کہ جڑیں کٹنے یا ٹوٹنے اور مڑنے نہ پاویں۔ جب پنیری کو ایک ایک کر کے علیحدہ کیا جاوے تو جلدی نہیں کرنی چاہئے ورنہ پودوں کو نقصان پہنچےگا۔ پنیری لگانے کا طریق جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے وہ ناقص ہے۔ بالعموم پنیری اس طرح سے لگاتے ہیں کہ قطاروں پر انگلی سے سوراخ نکالا اور اُسکے سٹھ پر پنیری کے سٹی حصہ کو رکھ کر انگلی سے دبا دیا۔ اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پنیری کی جڑ اوپر کو اکٹھ جاتی ہے اور بیج کا حصہ نیچے زمین میں لگ جاتا ہے اسبوجہ سے اکثر



بودے مائے جاتے ہیں اور بعض بہت کمزور رہ جاتے ہیں۔ انگلی سے  
 بھی سورخ کرنے سے سورخ یکساں نہیں ہوتا۔ ولایت میں پنیری کے  
 سورخ نکالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں خاص ترکیب سے بنائی جاتی  
 ہیں جن سے سورخ یکساں نکلتا ہے اور انپر انچوں کا اندازہ ہوتا ہے  
 جتنا انچہ گرا سورخ نکالنا چاہو نکال سکتے ہیں اگر اسکو استعمال کیا  
 جاوے تو بہت بہتر ورنہ پنسل یا انگریزی قلم کی ڈنڈی بھی قریب  
 قریب ہی کام دے سکتی ہے۔ پنیری کو سورخ کے اندر دابنے سے پہلے  
 ماتہ سے سیدھی کر لینی چاہئے تاکہ جڑ سیدھی زمین سے مل جاوے  
 گو یہ کام کسی قدر توجہ اور محنت طلب ہے مگر اس کے فوائد  
 کثیر ہیں +

## حفاظتِ تخم

(Seed storage)

بیجوں کو بحفاظت تمام رکھنے کی ہمارے مالیوں کو چنداں پرواہ  
 نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بارہ میں کوئی خاص تردد کرتا فضول  
 ہے۔ سبز ترکاریوں کے بیج یا تو وہ کسی طاق میں معمولی پھتے پرانے  
 کپڑے کی بوتلی میں باندھ کر رکھ دیتے ہیں یا کسی تھیلی میں ڈالکر  
 رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح بیجوں کا ستیاناس ہو جاتا ہے اور انکی



اصلی طاقت بہت کچھ زائل ہو جاتی ہے۔ ولایت سے جو تخم آتے ہیں وہ بہت حفاظت سے بکسوں میں بند ہو کر آتے ہیں تاکہ انکو ہوا اور نمی نہ پہنچ سکے۔ اسے بکس چاروں طرف سے بند ہوتے ہیں یا ان کے منہ پر خوب پھنسا ہوا پیچدار ڈاٹ لگا ہوتا ہے اگر ایسے بکس مل سکیں تو بہتر ورنہ بوتلوں میں بیج رکھ کر کاگ سے انھیں اس طرح بند کر دیں کہ ذرا بھی ہوا اندر نہ جا سکے۔ کاگ اور بوتل کا منہ ایک ہو جاوے۔ پھر ان بوتلوں کو ایسے کمروں میں یا ایسی جگہ رکھیں جہاں زیادہ گرمی یا ریل نہ ہو۔ شور دار کوٹھڑیوں یا مرطوب مقامات میں تخم ہرگز نہیں رکھنے چاہئیں۔ جب ضرورت ہو بیج نکال لیں۔ مگر پھر کامل احتیاط سے فی الفور انھیں بند کر دیں بوتلوں میں بیج بھرنے سے پہلے انھیں پانی سے صاف کر کے دھوپ میں خشک کر لینا چاہئے۔ کاگ اچھا ہو کہیں سے گلا سٹرا نہ ہو ورنہ ہوا کو اندر جانے سے وہ روک نہیں سکے گا۔ اگر تخم فروشوں سے بیج منگوائے جاویں گے تو یا تو وہ چاروں طرف سے بند بکسوں میں آویں گے یا پولندوں میں جو کاغذ اور موم جامہ وغیرہ سے خوب بند ہوتے ہیں یا ایسے تخم اُسوت نکالنے چاہئیں جبکہ نکالتے ہی بو دیئے جاویں۔ کھلے رکھنے سے نقصان متصوہ ہے۔



# مُوزی کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کے دفعیہ کے طریق

(Noxious insects and)

(pests)

مُوزی کیڑے مکوڑے اور جانور زیادہ تر پھل اور پھولوں کو نقصان پہنچاتے ہیں مگر سبز ترکاریوں کو بھی کم و بیش آزار پہنچانے میں حسب موقع وہ کوتاہی نہیں کرتے ۔

پرمندے چڑیاں۔ کوئے۔ فاختہ۔ ہینا وغیرہ پرندوں سے سبز ترکاریوں کی کیاریوں کو صرف تخم ریزی کے وقت بچانے کی ضرورت ہوتی ہے بعد ازاں اُن سے بہت کم اندیشہ رہتا ہے۔ اکثر یہ کیا جاتا ہے کہ فصلیں بونے کے وقت دس پندرہ دن کے لئے لڑکے رکھ لیٹے جاتے ہیں تاکہ وہ دن میں کھیتوں یا باغیچوں میں برابر چکر لگاتے رہیں اور غل مچا کر یا بانس کے کھٹکھٹے سے پرندوں کو اڑاتے رہیں۔ یہ طریق بہت اچھا ہے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اُن کیاریوں میں جنمیں بیج بوٹے جلتے ہیں۔ ایک لکڑی گاڑ کر اُسپر ایک اُلٹی ٹانڈی کو رکھ دیتے ہیں جس کا پیندا خوب سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس سے درحقیقت پرندے بہت کچھ خوف کھاتے ہیں اور شاید یہ سمجھتے ہوں کہ کوئی کل سراچوکیدار پہرہ پر ڈٹا کھڑا ہے



یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کیاریوں کے پاس کوئی درخت ہوتا ہے تو اس میں ٹہین کا کھٹ کھٹا لٹکا دیتے ہیں اور اس میں ایک لمبی سی رسی باندھ دیتے ہیں جسے کھینچنے سے زور زور سے کھٹ کھٹ ہونے لگتی ہے اور اس پاس کے پرندے فی الفور اڑ جاتے ہیں بعض اشخاص کیاریوں میں بیج بو کر اور چھوٹی چھوٹی لکڑیاں گاڑ کر ان پر جال پھیلا دیتے ہیں بالخصوص یہ عمل مٹر کی کیاریوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ طریق بھی بہت اچھا ہے۔ بعض اصحاب کی یہ رائے ہے کہ اگر بیجوں کے ساتھ کسی قدر سوئے کے بیج شامل کر کے بوئے جاویں تو پرندے کیاریوں کے پاس نہیں آتے۔ جب سویا اگ آوے تو اسے اکھاڑ ڈالیں یا ساگ بنا لیں یا سبز کھاد کے طور پر کیاریوں میں ڈال دیں +

(گھریاں۔ چوہے)۔ گھریاں اور چوہے بھی سبز ترکاری کی کیاریوں کو زیادہ تر اسی وقت تک گزند پہنچاتے ہیں جب تک کہ بیج پھوٹ کر کچھ اونچے نہیں ہو جاتے۔ یہ جانور مٹر۔ لوبے۔ اور اقسام سیم کے بیجوں کو زیادہ کھودتے اور کروڑتے ہیں۔ ایک تجربہ کار صاحب کی رائے ہے کہ اگر ان بیجوں کو پہلے ایک مضبوط کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر اور پیٹھے تیل میں ڈبو کر کسی مٹی کے برتن میں رکھ دیا جاوے اور اوپر سے سیندور چھڑک دیا جاوے اور پھر بو دیں تو اس طرح سے چوہے گھریوں اور پرندوں کی دستبرد سے یہ بچے رہیں گے +

جنگلی چوہے وغیرہ زیادہ تر ان کھیتوں اور باغ باغیچوں میں مسکن گزریں



ہو جاتے ہیں جن کی غور و پرداخت کم ہوتی ہے اور جن میں انسان کا ماتھ کم کام کرتا ہے اور قدم گاھے ماہے پڑتا ہے۔ چوہوں کو بھگا دینے کی موثر ترکیب یہ ثابت ہوئی ہے کہ اُن کو دق کیا جاوے اور پھین سے نہ رہنے دیا جاوے مثلاً کبھی اُنکے بلوں میں پانی چھڑوا دیا جایا کرے کبھی بلوں میں کوٹ کوٹ کر روڑے اور مٹی بھروا دی جایا کرے۔ اگر وہ زیادہ ہوں تو چوہے والی سے پکڑوا کر اور دُور لیجا کر چھوڑوا دینا چاہئے۔ دیمک نہایت مؤثر جیونٹی ہے سبز ترکاری کو یہ زیادہ تر نقصان نہیں پہنچاتی مگر ترکاری کی بیلوں وغیرہ کے نیچے جو دختوں کی شاخوں وغیرہ کی ٹیکیں دی جاتی ہیں اُن پر یہ چڑھائی شروع کر دیتی ہے۔ اس سے ٹیکوں کو محفوظ رکھنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ ٹیکیں گاڑنے سے پہلے اُنکے سروں کو جس طرف سے کہ وہ زمین میں گاڑنے ہوں گرم چیرھ کے تیل یا کولتار میں ڈبو دیا جاوے۔ چیرھ کا تیل برش یا کپڑے سے ٹیکوں کے سروں کو لگانے میں یہ نقص باقی رہ جاتا ہے کہ پتہ پتہ میں جہاں تیل یا کولتار نہیں لگتا وہاں دھتے باقی رہ جاتے ہیں ان مقامات سے دیمک لکڑی میں آسانی سوراخ کر لیتی ہے اور اندر ہی اندر گھسن کی طرح لکڑی کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تیل یا کولتار سروں پر اس انداز سے لگایا جاوے کہ زمین میں گڑ کر کچھ حصہ سطح زمین سے اوپر کا روغن آلود رہے۔

دیمک کے دفعیہ کی سب سے بہتر یہ ترکیب ہے کہ باغ یا کھیت



میں دیمک کے بل تلاش کرا کے کھدوانے شروع کئے جاویں اور  
 نیچے سے دیمک کی ملکہ کو نکالوا کر اُس کا قلع منع کرا دیا جاوے۔  
 بعض بعض پُرانے اور بڑے بڑے دیمک کے ٹیلوں کے نیچے سے دو  
 دو چار چار دیمک کی بیگمات نکلتی ہیں ان کا تخت چھن جانے پر انکے  
 حوالی موالی فی الفور منتشر ہو جاتے ہیں۔ دیمک کے بلوں میں ایلوے  
 کو پانی میں گھول کر ڈالنا اور پھر بلوں کو موٹے بالورٹ سے بھر دینا  
 بہت کارگر ثابت ہوتا ہے۔ پودوں اور بیلوں کے ارد گرد جہاں دیمک  
 کا گزر ہو پتھر کے تیل کو چھڑک دینے سے بھی بہت کچھ امن رہتا ہے  
 بعض اوقات دیمک کے بلوں میں بھی مٹی کا تیل چھوڑ دیا جاتا ہے +  
 ٹڈی دل۔ کبھی کبھی ٹڈیوں کا بھی کھیتوں اور باغیچوں کے اوپر سے  
 گزر ہوتا ہے جن مقامات پر یہ اتر آتی ہیں وہاں سبزہ کا بہت  
 نقصان کر جاتی ہیں۔ سبز ترکاریوں کے کھیت یا کھاریاں ٹڈیوں کی  
 یورش سے اگر پوری کوشش کیجاوے تو بہت کچھ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔  
 کھاریوں کے اوپر گھاس پھوس پھیلانے۔ چٹائیاں ڈالنے یا جال تاننے  
 سے بہت کچھ حفاظت ہو سکتی ہے۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ  
 جس وقت ٹڈی دل نمودار ہو اسی وقت کھیتوں اور باغیچوں میں  
 ہوا کا رخ دیکھ کر لکڑیاں جلاویں۔ تاکہ دھواں خوب پھیلے۔ ان لکڑیوں  
 پر چڑھ کا تیل اور درخت سیہند کی ہری ہری ٹہنیاں کاٹ کر  
 جلاویں۔ ٹڈیاں ہرگز نیچے نہیں آویں گی۔ درخت سیہند کا لاطینی



نام (Euphorbia Tirucalli) ہے اور انگریزی میں اسے  
(Milk bush) ملک بُش کہتے ہیں۔ یہ درخت بہت چھوٹا ہوتا  
ہے اور ہندوستان میں اکثر مقامات میں بطور بار لگایا جاتا ہے۔  
اسکا دودھ بہت تلخ اور تیز ہوتا ہے اور اس میں سے بڑی جھال  
نکلتی ہے۔ اس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس سے کاٹھ کے  
چھوٹے چھوٹے کھلونے زیادہ بنائے جاتے ہیں۔ اسے ہر جگہ بطور بار  
لگا سکتے ہیں۔ بعض اصحاب آگ (مدار) اور ڈنڈا تھور کے پودوں  
کو بھی ملک بُش (Milk bush) کہتے ہیں مگر اصلی ملک بُش  
کا ویسی نام سیہند ہے جسے بنگال میں لنکاج کہا جاتا ہے۔ عام  
طور پر ٹڈیاں آنے کے وقت ڈھول بجواتے ہیں اور کھڑکے والی  
چیز جو جس کے ماتھے آوے اُس سے کھڑکا کرتے ہیں۔ شور و غل مچایا  
جاتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ ٹڈیاں نیچے نہ اُتریں \*

مُوزی کیڑے مکوڑے۔ کئی طرح کے کیڑے مکوڑے سبز ترکاریوں  
پر حملہ کرتے ہیں۔ ان سے بچاؤ کی بہترین ترکیب یہ ہے کہ روز صبح  
کیاریوں اور کھیتوں میں چکر لگا کر پتوں کے نیچے اوپر شاخوں اور بیلوں  
کے ہر طرف غور سے دیکھتے رہیں جہاں کہیں کسی قسم کا مُوزی کیڑا  
نظر آوے فی الفور اُس پتے یا شاخ کو قلم کرا کے اور دُور لیجا کر  
جلوا دیں یا ماتھے سے اٹھوا کر وضع کرا دیں صبح کا وقت اس کام کے  
لئے بہت موزوں ہے کیونکہ اُس وقت مُوزی کیڑے مکوڑے سگریے

جہاں ٹڈیاں رات بس جاتی ہیں وہاں علاوہ سبزہ کا نقصان کرنے کے انڈوں کی صورت میں اپنی نشانی چھوڑ  
جاتی ہیں۔ انڈوں سے چند گھنٹوں کے اندر ہی چھوٹے چھوٹے ٹڈے نکل آتے ہیں اور یہ ہی سی صفائی کرنے پر  
مستعد ہو جاتے ہیں۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن انڈوں کو اکٹھا کرا کے دُور جگہ گھرے کر ڈھکے داکر دبا دیں \*



سمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جوں جوں دن چڑھتا جاتا ہے وہ چست ہوتے جاتے ہیں۔ اوپلوں یا لکڑی کی راکھ کو پودوں اور بیلوں پر چھڑکنے سے موزی کیڑے مکوڑے دور ہو جاتے ہیں اس عمل سے کسی قدر پودوں کے مسام بند ہو جاتے ہیں مگر وہ ایک دن کے اندر ہی ہوا اور شبنم سے راکھ صاف ہو جاتی ہے اور وہ پودوں کو کھاد کا کام دیدیتی ہے۔ دسی تبا کو کے پتوں کو پانی میں خوب جوش دیکر اور پانی کو سرد کر کے پودوں پر چھڑکنا بہت مفید ہے اس سے موزی کیڑے مکوڑے فی الفور غائب ہو جاتے ہیں۔ ریٹھوں کو پانی میں جوش دیکر اور پانی کو سرد کر کے پودوں پر چھڑکنا بھی بہت اچھا ہے اس سے کیڑے مکوڑے معدوم ہو جاتے ہیں سرسوں۔ رائی سفوف ہلدی۔ سفوف طوطیا۔ سفوف کچلا اور ہل ہل کے بیجوں کو پیسکر اور پانی میں گھول کر پودوں پر چھڑکنا موزی کیڑوں کے دفعیہ کے لئے سریع التأثير حکمت ہے۔ ولایت میں موزی کیڑوں مکوڑوں کے دور کرنے کے لئے وھوئیں اور کاجل کو استعمال کرتے ہیں یہ علاوہ کرم کش ہونے کے نہایت مفید کھاد ہے۔ اس کے استعمال کرنے کے دو طریق ہیں ایک تو راکھ کی طرح پودے پر چھڑکنا۔ دوسرے اس کی پوٹلی بنا کر اس میں ایک پکٹی اینٹ یا پتھر کا ٹکڑا رکھ کر کسی پانی سے بھرے ہوئے گھڑے یا حتم میں چھوڑ دینا تاکہ اس کا اثر تمام پانی میں ہو جاوے اینٹ پتھر کے ٹکڑے رکھنے سے یہ مطلب ہے کہ پوٹلی پانی کے اندر ڈوبی رہے۔ ۲۴ گھنٹہ کے بعد اس پانی کو پودوں

سے سرسوں رائی۔ کچلے۔ ایلوے اور ہل ہل کے بیجوں کو پیل یا کوٹھی میں پیسکر اور پانی ڈال کر چھڑکنا چاہیے۔ مگر بادی اور طوطے کو سفوف کر کے پودوں پر چھڑکنا کافی ہے۔



پر چھڑکنا چاہئے۔ اس عمل سے بھی کرم معدوم ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان کے بازاروں میں اس قسم کا دھواں اور کاجل عام طور پر دستیاب نہیں ہوتا۔ جناب گولن صاحب کی رائے ہے کہ بوقت ضرورت ریل کے انجن کی چمینی یا کسی اور کُل کے انجن کی چمینی سے کاجل حاصل کر کے کام میں لا سکتے ہیں۔ اکثر گھروں میں پتھر کا تیل ٹین یا پیتل کے چراغوں میں جلتا ہے جن پر کالچ کی چمینیاں نہیں ہوتیں۔ یہ چراغ طاقچوں میں بالعموم رکھے جاتے ہیں۔ ان طاقچوں سے تھوڑی مقدار میں کاجل حاصل ہو سکتا ہے جسے ضرورت کے وقت استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے بیٹھو گرانک (پتھر پر چھپائی کے) چھاپہ خانوں میں رول دینے کے لئے زیادہ تر پڑیوں کی سیاہی برتی جاتی ہے جسے جہازی سیاہی کہتے ہیں۔ سنا ہے کہ یہ دھانی جہازوں کا کاجل ہوتا ہے اسے اگر پیکر استعمال کیا جاوے تو غالباً مطلب برآری ہو سکتی ہے +

۱۵ انگریزی میں اس دھوئیں کو (Sassaparilla) (سوٹ) کہتے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر انجنوں کے دودھش سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یورپ میں اس کے خوب دام کھڑے کیئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ اکارتھ جاتا ہے +



# باب دوم

موسم گرما کی ترکاریاں

(Achro, Okra, Gombo, Ladiesfingers)

(Hibiscus Esculentis)

## بھنڈی

ہندوستانی نام

انگریزی یا لاطینی نام  
بھنڈی - بھنڈی توری - رام توری  
دھن رس - اوچرو - اوکرا - گومبو - لیڈیز فنگر -  
ہامی بس کس اس کیولن ٹس -

موسم کاشت

میدانوں میں

پہاڑوں میں

شروع پلج سے اخیر جولائی تک  
وسط اپریل سے وسط جون تک

بیان و استعمال

بھنڈی کا استعمال زیادہ تر بطور ترکاری ہوتا ہے البتہ اسکی ترکاری بنانے کی مختلف ترکیبیں ہیں۔ بعض اوقات اسے اور ترکاریوں کے ساتھ ملا کر بھی بناتے ہیں۔ اکثر خوش خور چھوٹی چھوٹی بھنڈیوں کا اچار ڈالتے ہیں۔ اور مصالح کے ذریعہ اسے لذیذ بنا لیتے ہیں۔ اسکے پودے کی کوئی



شے بھی بیکار نہیں جاتی اسکے پتوں کو جلا کر باغیچہ کے لیے اعلیٰ درجہ کی کھاو پیتار کی جا سکتی ہے۔ اسکے تنہ سے نہایت عمدہ ویرپا اور ریشم کی مانند ریشہ نکلتا ہے۔

طریق کاشت۔ گو بھنڈی ہر قسم کی زمینوں میں بآسانی ہو سکتی ہے مگر طاقتور اور ایسی زمین میں جہاں پہلے سے خوب کھاو پڑی ہو یہ بہت عمدہ پیدا ہوتی ہے اور کمالیت کے درجہ کو پہنچتی ہے۔ سخت زمین میں اس کا پلووا اچھی طرح نشو و نما نہیں ہوتا۔ پہلے کسی کیاری میں تخم بو کر پنیری پیدا کر لینی چاہئے۔ جب پودے ۴ یا ۵ انچ اونچے ہو جاویں اُسوقت کمزور پودوں کو اکھاڑ کر پھینک دیں اور صحیح و سالم پودوں کو احتیاط سے نکال کر کیاریوں کی قطاروں پر لگاویں۔ قطاروں کا فاصلہ آپس میں دو دو فٹ سے کم نہیں ہونا چاہئے اور پودوں کا بھی ایک دوسرے سے دو دو فٹ فاصلہ رکھنا چاہئے۔ اکثر اشخاص بھنڈی کے بیجوں کو قطاروں پر ہی بو دیتے ہیں اور جب پودے ذرا اونچے ہو جاتے ہیں تو انھیں بیج بیج میں سے اس طرح اکھاڑ ڈالتے ہیں کہ بقیہ پودوں کا آپس میں قریب ایک ایک گز کے فاصلہ رہ جاتا ہے۔ یہ طریق بھی خاصہ ہے۔ اگر لگا تار بھنڈیاں یعنی مد نظر ہوں تو شروع باج سے اخیر جولائی تک میدانوں میں تین تین ہفتہ کے بعد بیج بونے چاہئیں پہاڑوں میں بھی کاشت کا طریق عمل یہی ہے جہاں جہاں تک ممکن ہو سکے بھنڈیاں کاعلی جگہ میں بوویں تاکہ حرارت آفتاب سے اُس کے پودے خوب



مستفید ہوتے رہیں۔

جب موسم خشک ہو تو چوتھے پانچویں دن ضرور پانی دینا چاہیے۔ نیز حسب ضرورت نلای کرتے رہیں ورنہ زمین کے سخت ہو جانے اور نا کارہ گھاسوں کے اُگنے کے سبب پودے خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکیں گے۔

**عام کیفیت** یہ پودا ہر سال نیا بویا جاتا ہے۔ دوسرے سال یا دوسری فصل میں کام نہیں دیتا۔ امریکہ سے جو تخم آتے ہیں اُن کی بھنڈیاں بہت عمدہ اور نرم ہوتی ہیں۔ اُن میں بڑا وصف یہ ہوتا ہے کہ اُن کی جلد پر سفید رُواں نہیں ہوتا۔ انگلستان میں بھی بھنڈیوں کی کئی اقسام ہیں مگر امریکہ کی بھنڈیاں افضل شمار کی جاتی ہیں۔ اگر ہمارے ہاں بھی عمدہ بیج بوئے جاویں اور اچھی طرح سے غور و پردہت ہو تو کسی حالت میں یہاں کی بھنڈیاں اور ممالک کی بھنڈیوں سے کمتر نہیں رہ سکتیں۔ بونے کے لیے بیجوں کا یہ اندازہ رکھنا چاہیے کہ ۵۰ گز لمبی قطار کے لیے ۶۔ اونس تخم کافی ہیں۔ اسی اندازہ سے کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً ۱۰ گز لمبی قطار کے لیے ۱۲۔ اونس تخم درکار ہونگے۔ اور ۲۵ گز لمبی قطار کے لیے صرف ۳۔ اونس بیج اکتفا کریں گے۔

بھنڈیوں کے جن پودوں سے ریشہ نکالنا منظور ہوتا ہے انہیں پھول آتے ہی کاٹ لیتے ہیں ورنہ ریشہ بہت کم۔ موٹا اور بھڑا برآمد ہوتا ہے جب آپ تخم فروشوں سے بھنڈیوں کے بیج منگواویں تو دو قسم کے بیجوں کی جو امریکہ سے آتے ہیں ضرور فرمایش کریں، *White Velvet*۔



وٹائیٹ دلوٹ (۲) Dwarf proliferator Density  
 ڈوارف پرالی فک یا (ڈن سٹی) یہ اقسام نہایت خوبصورت اور خوش  
 ذائقہ شمار کی گئی ہیں۔ نیز ان سے بھنڈیاں بھی افراط سے  
 اُترتی ہیں ۛ

## ٹنڈس

(Citrullus, Vulgaris (Var) fistulosus)

ہندوستانی نام      انگریزی یا لاطینی نام

ٹنڈے۔ ٹینڈس۔ ٹینڈو۔ ٹینسی۔ دلپنڈ۔ رست۔ ریوس۔ دل گے رس۔

(سیدالوں میں)      (پھاڑوں میں)

وسط جون سے اخیر اگست تک۔      وسط پانچ سے وسط مئی تک۔

## بیان و استعمال

ٹنڈس۔ زیادہ تر ترکاری کے کام آتے ہیں۔ جب تک یہ کچے اور ملائم  
 رہتے ہیں اور جسامت میں بڑھ نہیں جاتے اور بیج بھی سخت نہیں ہوتے  
 تب تک ترکاری کے مطلب کے لئے اچھے خیال کیئے جاتے ہیں۔ جب بہت  
 بڑے ہو کر سخت ہو جاتے ہیں اُس وقت اُن کی طرف کم التفات کی جاتی  
 ہے۔ اسکی ترکاری بنانے کی مختلف ترکیبیں ہیں۔ اسے اور ترکاریوں کے ساتھ  
 بھی ملا کر بناتے ہیں۔ بعض اشخاص اسے آبی اچاروں کے مصرف میں  
 بھی لے آتے ہیں۔ مگر بہت سے اشخاص اسے بوجہ اسکے سیٹھے ذائقہ کے  
 پسند نہیں کرتے لیکن ٹنڈوں میں مصالحہ وغیرہ بھرنے سے ترکاری لذیذ بن جاتی ہے



اہل یورپ انھیں اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اوسط درجہ کے ٹینڈس بیکر  
پہلے انھیں چاقو سے اوپر سے کھرج ڈالتے ہیں تاکہ کاغذی چھلکا دور  
ہو جاوے۔ پھر تراش کر اور بیج نکال کر انھیں پانی میں جوش دیتے  
ہیں۔ جب یہ اہل جاتے ہیں تو انھیں نکال کر دو بارہ تھوڑے سے نم  
میں اُباتے ہیں اور اوپر سے نمک۔ کالی مرچ اور جائفل ڈال کر کھاتے ہیں۔  
طریق کاشت

اسکے بونے کی عمدہ ترکیب یہ ہے کہ کیاریوں کو خوب درست کر کے  
اور بوسیدہ کھاؤ ڈال کر اسکے تخم دو دو تین تین لے کر ایک جگہ گز گز  
بھر کے فاصلہ پر (اس طرح سے کہ چاروں طرف سے فاصلہ گز سوا گز سے  
کم نہ ہو) بونے جاویں۔ جب تخم پھوٹ آویں اور قریب ۴۔۵ انچ کے اونچے  
ہو جاویں تو کمزور پودوں کو اُکھاڑ ڈالیں اور باقی بدستور رہنے دیں۔ جب  
پودے پھیل جاویں تو احتیاط رکھیں کہ ناکارہ گھاسیں کیاریوں میں آگئے  
نہ پاویں کبھی کبھی اس طرح گوڈ دیا کریں کہ پودوں کو نقصان نہ پہنچے  
ٹینڈس ایسی زمین میں خوب پیدا ہوتے ہیں جس میں اعتدال  
کے ساتھ ریت کا جزو بھی ہو۔ سخت اور بہت چکنی زمین میں یہ  
پورا ملا جاتا ہے۔

### عام کیفیت

وڈ رو صاحب لکھتے ہیں کہ علاقجات گجرات اور سندھ



میں موسم گراما میں ٹنڈس کو اسطرح سے پیدا کرتے ہیں جیسے بنگال میں  
پانوں کو بہیتوں (پھونس کے بنگلوں) کے اندر پیدا کیا جاتا ہے مگر شمالی ہند  
میں اسطرح سے انھیں بویا نہیں جاتا۔ یہاں انھیں خربڑے اور تربوزوں  
کی طرح کھلی کیاریوں میں بغیر ٹیکوں کے بڑھتے ہیں +  
کوہ کانگرہ میں ٹنڈس برابر پیدا ہوتے ہیں +

## پیٹھا

(Benincasa *terifera*)

(White gourd)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

وہاٹ گورڈ۔

پیٹھا۔ بھنجا۔

موسم کاشت

(پھاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع وزوری سے اخیر پرج تک

وسط مئی سے وسط جولائی تک۔

بیان و استعمال

پیٹھا۔ عام طور پر ترکاری کے کام میں نہیں آتا مگر بعض کاریگر ترکیب کے  
ساتھ اسکی ترکاری بھی بنا لیتے ہیں۔ زیادہ تر یہ مٹھائی بنانے کے کام آتا  
ہے۔ ہندوستانی مٹھائیوں میں پیٹھے کی مٹھائی مشہور ہے۔ پیٹھے کا پتھا بہت  
اچھا بنتا ہے اور بہت گراں بکتا ہے۔ پیٹھے کا مرتبہ بھی اعلیٰ درجہ کا مرتبہ  
شمار کیا جاتا ہے۔ اور یونانی اطباء اسے کئی امراض میں تجویز کرتے ہیں۔



پیٹھا بڑیوں میں بھی بہت پڑتا ہے اور اس مطلب کے لئے ہزاروں  
من خرچ ہوتا ہے +

## طریق کاشت

اسکی کاشت کے لئے ہلکی اور ایسی زمین انتخاب کیجاتی ہے جس میں ریت  
کا جزو معقول ہو۔ پہلے کیاریوں میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ دے دینی  
چاہیئے تاکہ وہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح سے آمیز ہو جاوے یا جہاں جہاں تخم  
بونے ہوں وہاں پہلے سے کھاد ڈال دیں۔ بعد ازاں سطح کو ہموار کر کے  
بج چاروں طرف سے پانچ پانچ فٹ کے فاصلہ پر بو دیں۔ ایک ایک  
جگہ تین تین چار چار بج بونے چاہئیں۔ جب وہ پھوٹ کر کچھ اُونچے  
ہو جائیں اُسوقت کمزور پودے اکھاڑ کر پھینک دیں اور باقی رہنے دیں  
کیونکہ کمزور پودوں کے رکھنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ احتیاط رکھیں کہ کسی قسم  
کی گھاس یا خود رو بلیں پودوں کے نیچے آگ کر اُن کی خوراک نہ ہضم  
کرنے لگ جائیں +

ہسٹروں میں بھی پیٹھا پیدا ہوتا ہے وہاں اسے اس طرح بونے ہیں کہ  
چاروں طرف سے چھ چھ سات سات فٹ کے فاصلہ پر گڑھے کھود لیتے ہیں  
جنکی گہرائی تین فٹ ہونی ہے۔ اتنے ہی فٹ وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔  
ان گڑھوں کو مٹی سے جس میں خوب بوسیدہ گوبر کی کھاد ملی ہوئی ہوتی ہے  
بھر دیتے ہیں۔ پھر ان میں تین تین چار چار بج دو اونچے گہرے بو دیتے  
ہیں۔ جب وہ پھوٹ آتے ہیں تو چھانٹ دیتے ہیں تاکہ بلیں اچھی طرح



سے پھیلے۔ حسب ضرورت نکائی کرتے رہتے ہیں۔ اور موقعہ موقعہ پر پانی کی بھی خبر رکھتے ہیں۔ مگر میدانوں کی نسبت پہاڑوں پر پانی دینے کی ضرورت بہت ہی کم لاحق ہوتی ہے۔

عام کیفیت پیٹھے کی کاشت ہر جگہ عام طور پر نہیں کیجاتی۔ بلکہ خاص خاص مقامات میں اسے بولتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کیاب ہے اور گراں بکتا ہے۔ اگر ہر ضلع میں کئی کئی مقامات پر بویا جاوے۔ تو اسکی زیادہ افراط ہو سکتی ہے اور اسطرح سے عام لوگوں کو اسکی اشیاء آسانی سے میسر آ سکتی ہیں۔ البتہ بنگال میں اسے زیادہ بولتے ہیں۔ وہاں دیہاتی لوگ اسکی بیلوں کو اپنے چھپڑوں پر چڑھا دیتے ہیں۔ اور درحقیقت یہ عمدہ ترکیب ہے۔

## پھونٹ

(*Cucumis Momordica*)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کوکیبوس۔ مومور ڈیکا۔

پھونٹ۔

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط فروری سے اخیر مئی تک شروع اپریل سے وسط مئی تک

بیان و استعمال۔ پھونٹ کو عام طور پر عمدہ چیز شمار نہیں کرتے۔



خریزوں کے بعد موسم برسات اور شروع خزاں میں یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ انکو کھانا صحت کے لحاظ سے مفتر سمجھا جاتا ہے مگر تاہم لوگ کم و بیش اپنے اپنے مذاق کے مطابق انھیں مختلف ترکیبوں سے استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پھونٹ جو جوان آدمی کی ران کے برابر موٹے اور چار پالی کے پائے کے برابر لمبے ہوتے ہیں انھیں زیادہ تر دیہات کے وہ لوگ جنھیں جسمانی کام زیادہ کرنا پڑتا ہے شکر یا چھاچھ کے ساتھ ملا کر ہضم کر جاتے ہیں۔ چھوٹے اور عمدہ پھونٹوں کو بعض اصحاب جنکے مزاج میں نفاست ہوتی ہے چھیل کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے عمدہ قند یا بورے کے ساتھ ملا کر کھاتے ہیں اور اس طرح یہ کسی قدر خربزے کا ذائقہ دیتے ہیں۔ بہت چھوٹے یا سخت پھونٹوں کو خواجہ والے بطور چاٹ بیچتے ہیں۔ یعنی انکے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اور کئی طرح کے خوشبودار مصالح اور نمک چھڑک کر اور اوپر سے لیموں پنچوڑ کر فروخت کرتے ہیں۔ کچے پھونٹوں کو بعض مقامات میں کچرے بھی کہتے ہیں اور انکی خاص ترکیب کے ساتھ ترکاری بنائی جاتی ہے۔ پھونٹ کے بیج موشیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ بعض یورپین کچے پھونٹوں کے ٹکڑے سرکہ میں ڈال کر کھاتے ہیں +

### طریق کاشت

تین تین چار چار فٹ کے چوگرد فاصلہ سے (یعنی چاروں طرف سے تین یا چار فٹ فاصلہ ہو) گڑھے کھود لیئے باویں جو دو فٹ چوڑے اور دو فٹ لمبے اور دو فٹ گہرے ہوں۔ کھدی ہوئی مٹی کے ساتھ بوسیدہ



کھاد مجموعہ ملا کر گرھے بھر دیئے جاویں اور اُنکے عین وسط میں تین  
 تین چار چار پھونٹوں کے بیج بو دیئے جاویں جب وہ چار پانچ انچہ اوپنے  
 ہو جاویں تو کمزور اکھاڑ کر پھینک دیں اچھے رہنے دیں۔ تھوڑے ہی عرصہ  
 میں بیلین چلنے لگیں گی۔ آٹھویں دسویں نلای کر نی چاہیئے اور شروع میں  
 اگر موسم خشک ہو تو تیسرے چوتھے پانی دیتے رہیں جب پھونٹ دو  
 ستانی پک جاویں تو پانی دینا کم کر دیں اور جب وہ بالکل پک جاویں تو  
 پانی صرف اُسوقت دینا چاہیئے جبکہ بیلوں کے خشک ہو جانے کا احتمال ہو  
 اگر پھونٹ حد اعتدال سے زیادہ بیلوں میں نظر آویں تو انھیں کم کر دینا  
 چاہیئے ورنہ وہ بیلوں کو کمزور کر دیں گے اور خود ناقص رہ جاویں گے +  
 عام کیفیت۔ اگر عمدہ بیج حاصل کر کے چھوٹی اقسام کے پھونٹ بولے  
 جاویں تو وہ ترکاری کے مصرف میں زیادہ آ سکتے ہیں +



# خرپڑے

خرپڑے

(Cucumis, Melo)  
(Musk melon, Sugar melon)

ہندوستانی نام	انگریزی یا لاطینی نام
خرپڑے - خربوزے	مُسک میلن - شوگر میلن (کوکبوس میلو)

## موسم کاشت

(میدانوں میں)	(پہاڑوں میں)
وسط فروری سے وسط اپریل تک	شروع اپریل سے وسط مئی تک

## بیان و استعمال

خرپڑے درحقیقت اعلیٰ درجہ کے پھلوں میں شمار کئے جاتے ہیں مگر کچے خرپڑوں کی نہایت عمدہ ترکاری بھی بنتی ہے۔ یوں تو خرپڑے کئی مقامات کے مشہور ہیں مگر تمام ہندوستان میں لکھنؤ کے خرپڑے افضل شمار کئے جاتے ہیں خرپڑوں کے تخم ادویات اور ٹھنڈائی بنانے کے کام آتے ہیں۔ انھیں چھیل کر کھاتے ہیں اور ان سے خوش ذائقہ شکر تریاں بھی بنائی جاتی ہیں۔ خرپڑوں کے چھلکے مویشیوں کو کھلا دیئے جاتے ہیں۔

گولن صاحب فرماتے ہیں کہ خرپڑے پہاڑوں میں نہیں ہوتے مگر تحقیقات سے معلوم ہوا کہ خوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب اپنی کتاب موسومہ ”پنجاب پلینٹس“ میں لکھتے ہیں کہ پنجاب میں ملتان اور جھنگ کے خرپڑے بہت عمدہ اور شیریں ہوتے ہیں مگر کشمیر کے خرپڑے سیٹھے



ہوتے ہیں۔ ایک صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ملک تبت میں (سلحہ سمند) سے ساٹھ دس ہزار فٹ کی بلندی پر (خرپڑے) بوٹے جاتے ہیں وہ چھوٹے مگر اچھے ہوتے ہیں۔ لداخ میں بھی خرپڑے ہوتے ہیں۔ افغانستان میں کئی اقسام کے خرپڑے پیدا ہوتے ہیں مگر سب میں فضل سرواگنا جاتا ہے (جسے عام طور پر کابل کا سروا) کہتے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں من سروے افغانستان سے پشاور کے راستے ہندوستان میں آتے ہیں اور گراں قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ سرووں کے بیج ہندوستان میں بوئے جاتے ہیں مگر ان سے سروے پیدا نہیں ہوتے بلکہ ایک قسم کے خرپڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاص ترکیب سے مکتان میں چند مرتبہ سروے پیدا کر لئے گئے تھے +

### طریق کاشت

خرپڑے پونے کے لئے بہترین زمین ریتی ثابت ہوئی ہے جہیں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ ڈال دیگئی ہو۔ ایسی زمین میں پانچ پانچ فٹ کے چوگرد فاصلہ پر دو دو فٹ مربع گڑھے کھود لیں اور کھدی ہوئی مٹی کے ساتھ بوسیدہ کھاد مجموعہ ملا کر پھر گڑھے پر کر دیں۔ ان گڑھوں کے وسط میں چار چار پانچ پانچ عمدہ اقسام کے خرپڑوں کے بیج حاصل کر کے بو دیں۔ جب وہ آگ کر کچھ بڑے ہو جاویں تو کمزور اکھاڑ کر پھینک دیں۔ باقی رہنے دیں۔ کھوڑے ہی دنوں میں بلیں چاروں طرف پھیلنے لگیں گی۔ ابتداء میں اگر موسم خشک ہو تو حسب ضرورت تیسرے دن پانی دیتے ہیں



جب پھل آجاوے اور خُربزے کچھ بڑے ہو جاویں تو پانی دینا کم کر دیں اور جب وہ پکنے لگیں تو پانی صرف اسی وقت دینا چاہئے جبکہ بیلین خشک ہو جانے کا احتمال ہو۔ ابتدا میں جب تک کہ بیلین سطح زمین کو ڈھانپ نہ لیں آٹھویں دسویں نکالی ضرور ہونی چاہئے۔ اگر اعتدال سے زیادہ خُربزے لگیں تو بیلوں پر سے بار کم کرنے کے لئے پھلوں کو چھانت دینا چاہئے ورنہ خُربزے چھوٹے اور بد مزہ ہونگے۔ زیادہ تر اُن پھلوں کو چھانتنا چاہئے جو بیلوں کی جڑوں سے دُور ہوں یعنی بیلوں کے آخری سرے کے قریب ہوں \*

بعض اصحاب خُربزوں کے بیجوں کو اُس وقت بوتے ہیں جبکہ وہ پھوٹ آتے ہیں۔ یعنی پہلے ۲۴ گھنٹہ تک خُربزوں کے بیجوں کو شیر گرم پانی میں بھگو دیتے ہیں۔ بعد ازاں نکال کر گٹلوں یا ناندوں میں راکھ بھر کر اور اُسے پانی سے نم دار کر کے بیج چھڑکواں بو دیتے ہیں۔ جب وہ پھوٹ نکلتے ہیں تو انہیں اکھاڑ کر کیاریوں میں جہاں مُستقل طور پر خُربزے بونے منظور ہوتے ہیں چار چار فٹ کے فاصلے پر گاڑ دیتے ہیں \*

عام کیفیت سوداگران تخم کی فرستوں میں ولایتی خُربزوں کی کئی اقسام بوج ہیں۔ ان کے بیج بھی منگوا کر بونے چاہئیں \*



ہندوستان

## تربوز

Cucumis Citrullus  
Citrullus vulgaris  
(Water-melon)

انگریزی یا لاطینی نام  
واٹر میلن - کوکیوس - سائی ٹرگس -

ہندوستانی نام

تربوز

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

شروع اپریل سے وسط مئی تک

(میدانوں میں)

آخر فروری سے وسط اپریل تک

و  
شروع جولائی سے آخر اگست تک

## بیان و استعمال

تربوز بھی در اصل پھلوں میں شمار ہونا چاہیئے مگر اس کتاب میں اسلئے اسکا ذکر کیا گیا ہے کہ کچے تربوزوں کی خاص ترکیب سے عمدہ ترکاری بنتی ہے۔  
تربوز کی بلحاظ صورت - شکل - قد و قامت - گودے - رنگ اور بچوں کے کٹی  
متیں ہیں مگر یہ فرق صرف زمین اور آب و ہوا کی وجہ سے ہوتا ہے  
سرسہ - رُہتک - گوڑ گانوں باگرٹ - راجپوتانہ - اور بیکانیر کے ریگستانی علاقوں کے  
تربوز میٹھے کہلاتے ہیں اور یہ بہت بڑے بڑے اور خوش ذائقہ ہوتے  
ہیں۔ انکے بیج ہوا سے اڑ کر دور دور تک جھل میں چلے جاتے ہیں اور



اپنے موسم میں وہ خود بخود پھوٹ آتے ہیں۔ یہ ذائقہ میں بہت شیریں ہونے میں اور اُن کا پانی ریگستانی علاقہ کے لوگوں کو ٹھنڈے پانی کا کام دیتا ہے۔ جہاں یہ بکثرت پیدا ہوتے ہیں وہاں انکے تر اور خشک پھلکوں کی ترکاری بناتے ہیں۔ پھلکے سادہ یا نمک لگا کر سکھائے جاتے ہیں اور انھیں سال سال دو دو سال تک رکھ چھوڑتے ہیں اور حسب ضرورت پانی میں بھگو کر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تربوز کے بیج ادویات اور ٹھنڈائی میں کام آتے ہیں۔ پھلکے مویشی نہایت رغبت سے کھاتے ہیں۔

**طریق کاشت۔** عمدہ تربوز ریتی زمین میں پیدا ہوتے ہیں جس میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ پڑی ہو۔ کیاریوں میں پانچ پانچ فٹ کے چوگرد فاصلہ پر ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ مربع اور تین تین فٹ عمیق گڑھے کھود لینے چاہئیں اور انھیں مٹی کے ساتھ کھاد مجموعہ ملا کر بھر دینا چاہیئے۔ ان گڑھوں کے وسط میں تربوز کے چار چار پانچ پانچ بیج بودیں۔ جب وہ اچھی طرح سے پھوٹ آویں تو کمزور اکھاڑ کر پھینک دیں باقی طاقتور پودے رہنے دیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بیلین چلنے لگ جاویں گی۔ شروع میں دو چار مرتبہ نلائی ضرور کرا دینی چاہیئے۔

برسات کی فصل کی بیلوں کے نیچے درختوں کی خشک شاخیں یا بانس کی جھڑیاں دیدینی چاہئیں۔ ورنہ بیلوں کو نمی کے سبب نقصان پہنچے گا۔ پہلی فصل جو پھاگن چیت میں بوئی جاتی ہے اسکے تربوز تمام گریوں بلکہ



برسات تک ملتے رہتے ہیں اور برسات میں جو فصل بوٹی جاتی ہے اُسکے پھل آدھے کنوار میں بازاروں میں آجاتے ہیں اور کاتنگ میں تو اُنکی کثرت ہوتی ہے۔ اگر بیلوں پر پھول حد اعتدال سے زیادہ آجاویں تو انھیں کم کر دینا عین مناسب ہے۔

عام کیفیت۔ ولایتی تخم فروشوں کی فرستوں میں ولایتی تربوزوں کی کئی قسمیں نظر آتی ہیں اگر ان کے بیج اخیر اگست میں بوئے جاویں تو کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے \*

## اندراین

*Cucumis, Colocynthis*  
(*Colocynth gourd*)

(ہندوستانی نام)

(انگریزی یا لاطینی نام)

(کولوسنتھ گورڈ) کوکیوس۔ کولوسین ٹھس

اندراین۔ حنظل

(پھاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع جولائی سے وسط ستمبر تک

شروع جولائی سے اخیر اگست تک

## بیان و استعمال

در اصل اندراین کی کاشت کہیں نہیں کی جاتی۔ یہ قریب قریب ہر جگہ کم و بیش کھیتوں۔ میدانوں۔ ٹیلوں پر خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ باگر۔ راجپوتانہ۔ اور بیکانیر کی جانب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اندراین کی شکل صورت



خام اور پختہ دونوں حالتوں میں چھوٹے خرپڑوں کی مانند ہوتی ہے جب یہ  
 پک کر زرد ہو جاتی ہے تو کام میں لائی جاتی ہے۔ بالعموم اسے توڑ کر  
 اور اس میں نمک اور اجواین بھر کر اور ہار پرو کر کھونٹیوں پر ٹانگ  
 دینے ہیں اور اس طرح سے باہستگی یہ سایہ میں خشک ہوتی رہتی ہے موٹیل  
 کے علاج میں اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں اندراین سے ایک انگریزی دوا  
 "گولوسنٹ" نامی تیار کی جاتی ہے اندراین کو تازہ توڑ کر بیلوں کو بھی کھلا دیتے  
 ہیں۔ مگر چارہ کے طور پر نہیں۔ محض بطور دوا۔ اندراین کی اجواین  
 انسانوں کے لئے بھی بعض حالتوں میں بطور ادویہ بخور کی جاتی ہے۔ بعض  
 اشخاص ان کے ٹکڑے کر کے اور نمک لگا کر دو تین دن دھوپ میں  
 رکھ دیتے ہیں۔ بعد ازاں مصالکے وغیرہ لگا کر اپنی پسند کے مطابق ترکاری  
 بنا لیتے ہیں۔ اندراین کے بیج بھی دواؤں میں برتے جاتے ہیں۔ اسکی  
 تازہ جڑ بہت عمدہ مسواک (دانت) سمجھی جاتی ہے اور اس مطلب کے  
 لئے اسے فرایشوں سے منگواتے ہیں۔ نیز اسکی جڑ کو خشک کر کے اور  
 سفوف بنا کر ادویات میں کام میں لاتے ہیں +

**طریق کاشت۔** اگر کبھی اسکی کاشت کی ضرورت ہو تو طریق کاشت  
 بجنہ وہی ہے جو پھنٹوں کی نسبت لکھا گیا ہے +

**عام کیفیت** اسکی ترکاری بالعموم وہ اشخاص زیادہ استعمال کرتے ہیں  
 جنہیں اس سے طبی فائدہ حاصل کرنا مد نظر ہوتا ہے۔ مثلاً ڈنڈا مٹھو  
 کا رائتہ ترکیب کے ساتھ ایسا بنتا ہے کہ لوکی اور اسکے رائتہ میں مشکل



سے تمیز ہو سکتی ہے مگر تھور کا رائیہ بھی دوا سمجھا جاتا ہے +

## کچرے

(Botanical name not exactly known)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

(ٹھیک تحقیق نہیں ہوا)

کچرے۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

شروع جولائی سے اگست تک

وسط جولائی سے اخیر اگست تک

بیان و استعمال

کچروں کی قسم تحقیقات سے بالکل علیحدہ ثابت ہوئی ہے۔ یہ ضلع گورگانوں  
باگڑ۔ اور راجپوتانہ کے ریگستانی علاقوں میں کثرت سے خود رو پیدا ہوتے  
ہیں۔ پچھنے کچروں کا وزن پاؤ پاؤ بھر تک ہوتا ہے پک کر ان میں کسی قدر  
سٹھاس آ جاتی ہے۔ پکے ہوئے کچروں کو تراش کر سکھا لیتے ہیں اور  
دھ چھوڑتے ہیں اور حسب ضرورت تھوڑی دیر پانی میں بھگو کر ترکاری  
بنا لیتے ہیں۔ ترکاری لذیذ ہوتی ہے +

طریق کاشت۔ اگر کچروں کو بونا چاہیں تو طریق کاشت بجسہ وہی ہے  
جو پھونٹوں کے بارہ میں لکھا گیا ہے +

عام کیفیت۔ ریلی زمینوں میں یہ آسانی سے پیدا ہو جاتے ہیں غالب



ہے کہ باقاعدہ کاشت سے انکی حیثیت میں ترقی ہو جاوے گی \*

## کچریاں

(Cucumis ; Pubescens)

### موسم کاشت

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کوکبوس - پیو بی سنس -

کچری - کچریاں

(پھاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط جولائی سے اخیر اگست تک شروع جولائی سے وسط اگست تک

### بیان و استعمال

کچری بظاہر کچروں کی چھوٹی قسم معلوم ہوتی ہے۔ کچریاں بھی باگڑ، بیکانیر ضلع گورگانوں، راجپوتانہ، اور پنجاب کے بعض خشک علاقوں میں پیدا ہوتی ہیں انھیں خشک کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور بالعموم انھیں تل کر بطور ترکاری استعمال کرتے ہیں۔ مگر زیادہ تر یہ اچھور اور کھٹائی کا کام دیتی ہیں۔ دال میں ڈالی جاتی ہیں اور سبز ترکاریوں میں کھٹائی کی جگہ پڑتی ہیں خشک کچریاں دور دور تک دسار کو جاتی ہیں اور پسناری انھیں خرید کر فروخت کرتے ہیں۔ ایک قسم کی خوش ذائقہ چٹنی میں جسے ”سونٹھ سانگر“ کہتے ہیں۔ کچریاں زیادہ ڈالی جاتی ہیں۔

طریق کاشت۔ اگر کچریوں کی کاشت منظور ہو تو طریق کاشت بجنسہ وہی



ہے جو پھونٹوں کے ضمن میں بیان ہوا ہے +  
 عام کیفیت۔ خشک ریتلے علاقوں میں کھجریاں آسانی سے پیدا  
 ہو جاتی ہیں۔ یہ تجارت کی چیز ہے اگر اسکی پیداوار پر توجہ کی جاوے  
 تو بہت فائدہ ہو سکتا ہے +

## کڑی

*Cucumis Melo; Var. Utilissimus.*

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کوکیوس میلو۔

کڑی۔

### موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط فروری سے اخیر اپریل تک وسط پانچ سے اخیر اپریل تک

### بیان و استعمال

کڑیوں کو یا تو کچھ کھاتے ہیں۔ یا ترکاری بنا کر۔ جب یہ بہت  
 بڑی ہو جاتی ہیں تو انھیں مونیٹیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اسکے تخم خشک  
 کر کے پنساری فروخت کیا کرتے ہیں کیونکہ گرمی کے موسم میں یہ گھوٹ کر  
 بطور ٹھنڈائی پیئے جاتے ہیں +

طریق کاشت کی قدر ریلی زمین پر جسمیں اچھی طرح سے کھاد مجموعہ پڑی ہو  
 کڑیاں خوب پیدا ہوتی ہیں۔ طریق کاشت معمولی ہے۔ چاروں طرف سے



ایک ایک گز کے فاصلہ پر تین تین چار چار بیج بو دیئے جاتے ہیں۔ پھوٹ آنے پر زرد اور کمزور نکال دیئے جاتے ہیں باقی پودے رہنے دیئے جاتے ہیں۔ تھوڑے ہی دنوں میں بیلین پھیلنے لگتی ہیں۔ خشک موسم میں ہفتہ میں دو تین مرتبہ پانی دینا چاہئے۔ شروع میں نلائی کرنی ضروری ہے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سوائے ریلی زمین کے اور زمین میں گکڑیاں نہ بولی جاویں۔ جن زمینوں میں کدو کھیر وغیرہ جاتے ہیں ان میں گکڑیاں بھی آسانی سے پیدا ہو جاتی ہیں۔

عام کیفیت۔ گکڑیوں کی کٹی قسمیں ہوتی ہیں۔ کچی کھانے کے قابل وہ گکڑیاں سمجھی جاتی ہیں جو ماتھ کے انگوٹھے کے برابر پتلی ہوں۔ ترکاری کے لیے ذرہ مونی گکڑیاں لیجاتی ہیں۔ اور بہت مونی اور لمبی گکڑیاں موشیوں کو کھلائی جاتی ہیں۔

لار

کھیرا

(Cucumis Sativus - Cucumber)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کھیرا (کوکبوس) (شانی دس)

کھیرا۔ سکا سہ۔

موسم کا وقت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع مئی سے لیکر وسط جولائی تک

شروع اکتوبر سے اخیر دسمبر تک  
شروع مارچ سے اخیر جولائی تک



## بیان و استعمال

کھیرے زیادہ تر کچے کھائے جاتے ہیں انکا رایتہ بہت اچھا بنتا ہے بہت سے خوش خور خاص ترکیب اور خاص مصالحوں سے اسکی ترکیبی بھی بناتے ہیں۔ اسکے تخم ادویات میں زیادہ کام آتے ہیں اور خربزہ تربوز۔ ککڑی۔ اور کدو کے بچوں کی طرح گرمی میں ٹھنڈائی میں ڈالکر پیئے جاتے ہیں۔ یورپ میں کھیروں سے کئی قیمتی چیزیں طیار کی جاتی ہیں + طریق کاشت۔ کھیرے اگر باغیچوں یا کھیتوں کی عمدہ زمین میں بوئے جاویں تو انھیں کھاد کی چنداں ضرورت نہیں ہوتی۔ تاہم اگر بیج بوئے وقت تھوڑی سی کھاد جہاں جہاں بیج بوئے ہوں دے دی جاوے تو فصل بہت اچھی ہوتی ہے مگر کھاد بوسیدہ گوبر اور پتوں کی ہوتی چاہیئے۔ زیادہ تیز اور طاقتور کھاد نہو۔ کبھی کبھی رقیق کھاد بھی بیلوں کی جڑوں میں دیدنی چاہیئے۔ کیاریوں میں پانچ پانچ فٹ کے فاصلہ پر دو دو تین تین بیج بوئے جاویں اور جب وہ پھوٹ آویں تو نکسے اور کمزور اکھاڑ کر پھینک دیے جاویں۔ جب پودے کچھ اونچے بڑے ہو جاویں تو یا تو انھیں مٹر کی طرح کھڑی ٹیکیں دیدیں یا زمین پر درختوں کی شاخوں یا بالنس کا ڈھلنج بنا کر انپر پھیلنے دیں۔ کھیروں کو بہت دیر تک بیلوں پر نہیں رہنے دینا چاہیئے ورنہ پیداوار میں کمی واقع ہو جاوے گی۔ تیز زیادہ دیر بیلوں پر رہنے سے کھیرے پک جاتے ہیں۔ اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر نہایت عمدہ کھیرے مطلوب ہوں تو بیلوں پر سے پھول کم کر دیں تاکہ ان کا



زور نہ مارا جائے گرم تر اضلاع میں اگست میں بھی کھیرے بو دیئے جاتے ہیں۔ موسم گرما کی فصل کو (یعنی پانچ سے وسط جون تک جو فصل بوئی جاوے) تیسرے چوتھے پانی دیدینا چاہیئے البتہ برسات کی فصل کو پانی دینے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھی نلانی کر دینی چاہیئے تاکہ خار و خس زیادہ بڑھنے نہ پاوے †

عام کیفیت۔ یورپ میں کھیروں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بعض چھوٹے ہوتے ہیں۔ بعض بہت لمبے۔ بعض میانہ قامت کے۔ رنگتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ذائقہ میں بھی کھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ یورپ میں کھیروں کا بہت چرخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھیروں کی کاشت سے وہاں لوگ ہر سال لاکھوں روپیہ پیدا کر لیتے ہیں †

گوئن صاحب کی رائے ہے کہ شمالی ہند میں کھیروں کے ولایتی بیجوں کی جگہ ویسی بیجوں کو ترجیح دینی چاہیئے۔ گو ویسی کھیروں کی اقسام دو تین سے زیادہ نہیں ہے مگر یہ باآسانی تمام پیدا ہو جاتی ہیں ولایتی کھیروں کی گو بہت سی قسمیں ہیں مگر وہ نازک ہوتی ہیں اور میدانوں میں اچھی طرح سے پیدا نہیں ہوتیں۔ مگر ایک صاحب لکھتے ہیں کہ کھیرے میدانوں میں اکتوبر سے یکر دسمبر تک بو سکتے ہیں۔ غالباً اس موسم میں کھیروں کے اگر ولایتی بیج بوئے جاویں تو کامیابی کی توقع کی جا سکتی ہے †



# گول کھیرا

Cucumis Sativas Gherkin

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

گھرکن

گول کھیرا

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع مارچ سے آخر ستمبر تک شروع اپریل سے وسط جون تک

## بیان و استعمال

گول کھیرا دراصل جزائر غرب الہند میں اچھا پیدا ہوتا ہے مگر ہندوستان کی آب و ہوا بھی اسے خوب موافق ہے۔ یہاں عام طور پر جو گول کھیرا بویا جاتا ہے وہ دراصل دیسی کھیرے کی ایک قسم ہے۔ جزائر غرب الہند کا گول کھیرا اور چیز ہے۔ اسکا آچار پڑا ہوا ہندوستان میں فروخت کے لیے بہت آتا ہے۔ انگریز اس کھیرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔

**طریق کاشت**۔ یہ ہر ایک زمین میں جہاں اور ترکاریاں بولی جاسکتی ہیں پیدا ہو سکتا ہے مگر دیسی کھیرے کی نسبت اسے کھاد زیادہ درکار ہے۔ پہلے کیاریوں میں کھاد مجموعہ ڈال کر انہیں اچھی طرح سے درست کر لینا چاہیئے۔ پھر پندرہ پندرہ انچ کے فاصلہ پر چھ چھ انچ اونچی قطاریں بنا کر



اُنپر تین تین یا چار چار انچہ کی دُوری پر دو دو تین تین بیج بوتے جاوے  
 مگر ایک سیدھ میں نہیں بلکہ لہریہ دار روش پر گویا قطار کے دونوں  
 پہلوؤں پر چار چار انچہ کے فاصلہ پر بیج بو دیئے جاویں۔ تیسرے چوتھے  
 دن پانی دیتے رہیں جب بیج پھوٹ آویں تو ناکارہ پودے نکال کر  
 پھینک دیں باقی خود بخود نشو و نما ہوتے رہیں گے۔ دسویں بارھویں  
 نلانی ضرور ہونی چاہیئے۔ اور اگر مُتواتر کھیرے لینے مطلوب ہوں تو شروع  
 پانچ سے آخر مئی تک میدانوں میں بیج بونے چاہئیں \*  
 عام کیفیت۔ گول کھیرے موسم برسات میں پیدا نہیں ہوتے \*

کدو

*Cucurbita moschata*

*Pumpkin. Red gourd. Red pumpkin*

ہندوستانی نام  
 انگریزی یا لاطینی نام  
 کدو۔ میٹھا کدو۔ حلوا کدو۔ ریبتا پھل۔ پیپ کن۔ رُگورڈ۔ رُڈ پیپ کن۔  
 کوٹھڑا۔ کاشی پھل۔ (کوکیوس۔ ماس چے ٹا۔)

موسم کاشت

(میدانوں میں) (پہاڑوں میں)  
 شروع فروری سے وسط جولائی تک  
 کٹر بلندی پر۔ شروع فروری سے اخیر پانچ تک  
 زیادہ بلندی پر۔ وسط پانچ سے اخیر مئی تک  
 بیان و استعمال

بالعموم ترکاری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آبی اچار بھی پڑتا ہے



پتے ہوئے کدو کا لذیذ حلو بھی بنتا ہے۔ اکثر اشخاص اسکا راستہ بھی  
 بناتے ہیں اسکے تخم دیسی ادویات میں بہت استعمال کیئے جاتے ہیں \*  
**طریق کاشت**۔ اسے بونے سے پہلے کھیتوں اور کیاریوں میں عمدہ  
 طرح سے کھا دینی چاہئے۔ کدو بونے کے دو طریق ہیں ایک یہ کہ کیاریوں  
 میں تخم بو دیے جاویں جب وہ اُگ آویں اور دو تین ابتدائی پتیاں بدل  
 لیں تو اچھے اچھے پودے اکھاڑ کر کھیتوں یا بڑی بڑی کیاریوں میں پانچ  
 پانچ یا چھ چھ فٹ کے فاصلہ پر بو دیں۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ پانچ پانچ چھ فٹ  
 کے فاصلہ پر گڑھے دو دو فٹ عمیق کھود کر پہلے خوب کھا ڈالیں پھر کھا د آمیز  
 مٹی سے بھر کر اور کیاریوں کو ہموار کر کے انپر دو دو تین تین بیج بو دیں  
 جب وہ پھوٹ آویں تو کمزور اکھاڑ کر پھینک دیں باقی رہنے دیں۔ بہت  
 جلد بیلین تمام سطح پر پھیل جاوینگی۔ جو فصل پانچ میں بوئی جاتی ہے وہ  
 گرمی کی فصل کہلاتی ہے اور اُسکی بیلین اگر زمین پر پڑی رہیں تو کچھ  
 مضائقہ نہیں۔ مگر برسات کی فصل جو پچھیتی ہوئی جاتی ہے اُسکی بیلین  
 اگر بلندی پر نہ چڑھائی جاویں تو پانی اور زمین کی تری کے سبب جلد  
 سڑنے لگ جاتی ہیں۔ پہاڑوں میں بانس کی پتلی شاخوں یا دختوں کی ٹہنیوں  
 کی ٹیکیں ضرور بیلوں کے نیچے دینی چاہئیں \*  
**عام کیفیت**۔ پختہ کدو سال سال بھر کوٹھوں میں بند پڑا رہتا ہے اور خراب  
 نہیں ہوتا۔ پہاڑوں میں سطح سمندر سے چھ ہزار فٹ کی بلندی تک کدو کی کاشت  
 ہو سکتی ہے شملہ میں اسے شروع فروری سے اخیر مارچ تک بونے میں \*  
 \*



# ولایتی کدو

Cucurbite Pepo .

(Squash) Vegetable marrow.

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

سکویٹ (ویجی ٹی بل میرو)

سفید گھٹرا۔ ولایتی کدو

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط فروری سے وسط اپریل  
کمتر بلندی پر شروع فروری سے اخیر مارچ تک  
زیادہ بلندی پر۔ وسط مارچ سے وسط جون تک

## بیان و استعمال

اسکی ترکاری نہایت لذیذ بنتی ہے اور اسکا رایہ اور آبی اچار بھی بنا سکتے ہیں \*  
طریق کاشت۔ بجنہ وہی ہے جو کدو کے بارہ میں لکھا گیا ہے۔ بوسیدہ  
کھاد مجموعہ کسی قدر ویسی کدو کی نسبت اسے زیادہ درکار ہے پہاڑوں میں یہ  
لچھا پیدا ہوتا ہے کیونکہ سرچی اسے زیادہ مطلوب ہے \*  
عام کیفیت اسکی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور یورپ میں اسے لوگ نہایت  
شوق سے کھاتے ہیں۔ ہندوستان میں انگریز اسکی نہایت قدر کرتے ہیں۔  
ہندوستان کے ہر حصہ میں اسکی کاشت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ البتہ  
ہر سال نئے بیج تخم فروش کارخانوں سے منگوا لینے چاہئیں جو آسانی



سے اور سستے مل جاتے ہیں۔ شملہ میں اسے شروع فروری سے آخر  
 مارچ تک بوتے ہیں۔ زیادہ بلندی پر اسے بارش سے ایسا گزند نہیں پہنچتا  
 جیسا کہ میدانوں میں پہنچتا ہے۔ میدانوں میں اسکی بیلوں کو زمین پر  
 بغیر ٹیکوں کے چلنے دینے میں کوئی ہرج مٹصوّر نہیں ہے۔ مگر ایک  
 تجربہ کار صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ اگر جگہ کی کفایت نہ نظر ہو تو اسکی  
 بیلوں کو دیواروں چھپروں یا جھڑیوں پر چڑھا دینا چاہیئے۔

## لوکی

*Lagenaria Vulgaris*  
 Bottle gourd

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

باٹل گورڈ۔

لوکی۔ ال۔ کدو۔

(میدانوں میں) موسم کاشت (پہاڑوں میں)

شروع مارچ سے وسط جولائی تک | شروع اپریل سے آخر مئی تک

بیان و استعمال

لوکی کی بالعموم ترکاری بنتی ہے۔ اسکا رائیہ بھی بہت بنایا جاتا ہے۔ آبی اچھا  
 پڑتا ہے۔ پیٹھے کی طرح کدو کش کر کے اسکی مٹھایاں تیار کیجاتی ہیں۔  
 اور۔ اکثر موسم گرما میں بخار والوں کے سر اور تلووں پر بھی اسے ملتے ہیں  
 طریق کاشت لوکیوں کی شکل مختلف قسم کی ہوتی ہے کوئی گول۔



کوئی لمبی۔ اور کوئی چھٹی۔ اسکی کاشت کے دو طریق ہیں۔ یا تو ایک  
کیاری میں بیج بو کر پنیری لگا لیں۔ جب پودے دو تین پتیاں بدل لیں  
تو انھیں اکھاڑ کر بڑی کیاریوں یا کھیتوں میں پانچ پانچ یا چھ چھ فٹ  
کے فاصلہ پر بو دیں۔ یا اسی قدر فاصلہ سے دو دو تین تین بیج اکٹھے  
بو دیں جب وہ اگ آویں تو نچتے اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اچھے رہنے دیں  
کیاریوں میں بونے سے پہلے خوب کھاو دینی چاہیئے۔ شروع میں دسویں  
بارھویں نکلائی کرنی ضروری ہے۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں  
دو مرتبہ پانی دینا چاہیئے۔ برسات کی فصل قطاروں پر بوویں اور بیلوں  
کے نیچے کسی قسم کی ٹیک دے دیں تاکہ وہ سڑنے نہ پاویں۔ بہت سے  
کسان برسات میں لوکی کی بیلوں کو اپنے چھپڑوں پر چڑھا دیتے ہیں  
اور اس طرح سے دیر تک لوکیں اترتی رہتی ہیں +  
عام کیفیت سخت زمین میں لوکیاں کم پیدا ہوتی ہیں پہاڑوں میں جہاں  
انھیں بوویں وہاں یہ خیال رہے کہ سوبج کی حرارت انھیں ضرور پہنچتی رہے

## گھٹیا توری

*Luffa Aegyptiaca*  
(Cylindric-shaped. Sponge gourd)

انگریزی یا لاطینی نام

لُفّا اے جپ ٹیگا۔

ہندوستانی نام

گھٹیا توری۔ ڈھنڈھل



## موسم کاشت

(میدانوں میں)

(پہاڑوں میں)

شروع مارچ سے وسط جولائی تک وسط فروری سے اخیر مارچ تک

## بیان و استعمال

بطور ترکاری استعمال کی جاتی ہے \*

**طریق کاشت**۔ بونے سے پہلے کیاریوں میں خوب کھاد دینی چاہیئے۔ اگیتی یعنی گرمی کی فصل کے لیئے ہیلوں کو زمین پر پھیلنے دینے میں کچھ برج نہیں ہے مگر پھیتی فصل جو برسات کی فصل کہلاتی ہے اسکی ہیلوں کو ٹیکیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ زمین پر پڑے رہنے سے بیلین سڑ جاتی ہیں۔ بیج دو دو تین تین اکٹھے لیکر چار چار فٹ کے فاصلہ پر بو دیں جب وہ دو تین ابتدائی پتیاں بدل لیں تو ناقص اکھاڑ کر پھینک دیں اور اچھے پودے رہنے دیں۔ یہ بہت جلد بڑھکر تمام کیاری میں پھیل جاوینگے۔ برسات کی فصل کیاریوں میں قطاریں بنا کر بونی چاہیئے تاکہ پودوں کی جڑیں دیر تک غرقاب نہ رہیں شروع میں دسویں بارھویں ٹلائی ہونی چاہیئے۔ اور اگر موسم خشک ہو تو پانچویں چھٹے دن پانی دیدینا چاہیئے ورنہ بیلین خشک ہو جاوینگی \*

**عام کیفیت**۔ تورییاں جب بہت بڑی ہو کر خشک ہو جاتی ہیں تو انکے اندر سے بوتل نما نہایت خوبصورت جال دار بیٹے کے گھونسلے کی مانند ایک چیز برآمد ہوتی ہے جسکے اندر تخم ہوتے ہیں توریوں کو پکنے سے پہلے توڑ لینا چاہیئے۔ ورنہ پھر وہ کھانے کے کام کی نہیں رہتیں بلکہ میں



انہیں وسط فروری سے اخیر پانچ تک بوئے ہیں۔ میدانوں کی نسبت کسی حالت میں پہاڑوں میں یہ کمزور نہیں ہوتیں۔ بیلوں کو ٹیکیں ضرور دینی چاہئیں ورنہ وہ زمین پڑ پڑی ہوئیں ماری جاتی ہیں †

## کالی توری

*Luffa Acutangula*

Sponge gourd

انگریزی یا لاطینی نام

سینج گورڈ۔ لقا۔ اک یوٹنگیولا۔

ہندوستانی نام

کالی توری۔ ست پتیا۔

### موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پانچ سے وسط جولائی تک شروع پانچ سے اخیر اپریل تک۔

### بیان و استعمال

بالعموم ترکاری بنی ہے۔ مگر گھیتا توری کی نسبت یہ ذائقہ میں اچھی نہیں ہوتی۔ البتہ اگر اچھی طرح بنائی جاوے اور درستی سے چھیلی جاوے تو خاصی ترکاری بنجاتی ہے †

طریق کاشت۔ طریق کاشت بجنہ وہی ہے جو گھیتا توری کے بارہ میں لکھا گیا ہے †

عام کیفیت۔ کالی توری جب ذرا اعتدال سے بڑھ جاتی ہے تو فی الفور



سخت اور کڑوی ہو جاتی ہے۔ اس لئے اسے نرم حالت میں توڑ لینا چاہیئے۔ پہاڑوں میں ٹیکس ضرور دینی چاہئیں یا چھتروں وغیرہ پر چڑھا دیں +

کریمہ  
کریملا

(*Momordica Charantia*)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

مو مور ٹریکا۔ چے رشیا۔

کریملا۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے وسط جولائی تک شروع فزوری سے اخیر پاج تک۔

بیان و استعمال

اسکی بہت اچھی ترکاری بنتی ہے اور عرق لیموں یا آموں کے ساتھ اسکا آچار بھی ڈالتے ہیں۔ خشک کر کے رکھ چھوڑتے ہیں۔ ہرے کرلیوں کا جب موسم نکلتا ہے تو رات کو پانی میں بھگو کر صبح انکی ترکاری بنا لیتے ہیں۔ +

ایک تجربہ کار صاحب اخبار انڈین گارڈنگ میں لکھتے ہیں کہ کریملا خون کے صاف کرنے میں مغربی عشبہ سے کسی حالت میں کم نہیں ہے۔ اگر کچے کرلیوں کا عرق نکال کر پیا جاوے تو صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ ”برابر سارسا پریملا (Sarsaparilla) مغربی عشبہ کا کام دیتا ہے۔

یہ تو اکثر سننے میں آیا ہے کہ لوگ بعض امراض میں کچے کریمے ہمارے



کھاتے ہیں +

ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ پنجاب کے سلسلہ کوہ نمک میں ایک قسم کا جنگلی کرپلا پیدا ہوتا ہے جسے وہاں کے باشندے ”دھار کرپلا“ کہتے ہیں مگر یہ تحقیق نہیں کہ اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں + طریق کاشت - بجنہ وہی ہے جو گھیتا توری کے لیے لکھا گیا ہے۔ گرمی کی فصل کو ٹیکیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیلیں بلا تکلف زمین پر پھیلنے دیں۔ مگر برسات کی فصل کو قطاروں پر بوویں اور جب بیلیں پھیلنے لگیں تو یا تو انھیں دیواروں اور چھتروں وغیرہ پر چڑھاویں یا نیچے جعفریاں سی بنا کر لگا دیں تاکہ وہ پانی اور زمین کی سیل سے گل سٹر نہ جاویں +

عام کیفیت - برسات میں چھوٹے کرپلوں کی فصل بھی ہوتی ہے جنھیں کرپلے یا گکوڑے کہتے ہیں۔ بعض انھیں بن کرپلے کہتے ہیں۔ جسامت میں یہ کرپلوں کی نسبت بہت چھوٹے۔ اور اُن کا پیٹ پھولا ہوا اور سرے دونوں طرف سے گاؤ دُم ہوتے ہیں اور انکی ترکاری نہایت لذیذ بنتی ہے۔ پہاڑوں میں کرپلے کی گرمی اور برسات دونوں فصلوں کو ٹیکیں دینی چاہئیں۔ پہاڑوں میں کرپلے میدانوں سے کسی حالت میں کمتر نہیں ہوتے۔ شملہ میں کرپلے شروع فروری سے اخیر اپریل تک بوٹے جاتے ہیں +



# بڑی سیم

*Canavalia Ensisiformis (Sword bean)*

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کنارے یا ان سی فارمس

بڑی سیم - کٹار سیم -

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اپریل سے وسط مئی تک

وسط اپریل سے آخر جون تک

بیان و استعمال

اس کی پھلیوں اور بیجوں کی بہت عمدہ ترکاری بنتی ہے +  
 طریق کاشت - باغیچہ میں چند قطاریں پانچ پانچ فٹ کے فاصلہ پر  
 بنا لیں ان پر ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر تخم تین تین انچ گہرے  
 بویں - اگرچہ زیادہ کھاد کی ضرورت نہیں ہے تاہم بونے وقت اگر  
 بوسیدہ کھاد اس جگہ دیدی جاوے جہاں تخم بونے منظور ہیں تو اچھا  
 ہے۔ جب پودے پانچ چار انچ اونچے ہو جاویں اسوقت کمزور نکال کر  
 پھینک دیں اور پس ماندوں کے نیچے مضبوط اور اونچی اونچی ٹیکیں لگا دیں  
 جن پر بیلین اچھی طرح سے پھیل سکیں۔ شروع میں آٹھویں دسویں نلائی  
 کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ساتویں آٹھویں پانی دیدیا کریں +  
 عام کیفیت سیم کے بیج خشک کر کے بھی دیر تک استعمال میں آ سکتے



ہیں اس سیم کی ولایت میں بیسیوں قسمیں ہیں جن کا مفصل حال  
تخم فروشوں کے اشتہارات اور فرستوں سے معلوم ہو سکتا ہے :

## پھولی سیم

*Dolichos Lablab. (Country French Bear)*

انگریزی نام

ہندوستانی نام

سیم۔ سیمی۔ گھیا سیم۔ مکھن سیم۔ چھوٹی سیم کنٹری فروج بین۔ ڈولی جس۔ لب لب  
موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع مئی سے اخیر جون تک

شروع مئی سے اخیر جون تک

بیان و استعمال

بہت عمدہ ترکاری بنتی ہے۔ اور ترکاریوں کے ساتھ بھی اسے ملا کر  
بناتے ہیں۔ آبی اچار بھی پڑتا ہے :

طریق کاشت۔ باغیچوں میں اسے قطاروں پر بونا چاہیئے جن کا  
آپس میں چھ چھ فٹ کے قریب فاصلہ ہو۔ تخم قریب آٹھ آٹھ انچ کے  
فاصلہ سے بونے چاہئیں۔ گو کھاد دینے کی زیادہ ضرورت نہیں مگر تاہم جہاں  
جہاں بوج بونے ہوں اُن سوراخوں میں تھوڑی سی کھاد دیدینے سے  
پودے خوب بڑھتے ہیں جب پودے ۵ و ۶ انچ اونچے ہو جاویں تو مشروب  
کی طرح فوراً دھتوں کی خشک چھڑیوں کی ٹیکیں لگا دینی چاہئیں۔ برسات



میں پودے خوب بڑھتے ہیں اور تھوڑے ہی عرصہ میں پھلیاں اترنی شروع ہو جاتی ہیں۔ شروع میں آٹھویں ساتویں نلای کرتے ہیں اور اگر موسم خشک ہو تو پانچویں چھٹے پانی دیدینا چاہیے +

## اودی سیم

*Mucuna capitata.*

*Mucuna Nivea.*

انگریزی یا لاطینی نام  
میو کیونا - کے پے پے ٹائیو کیونانی ویا۔

ہندوستانی نام

اودی سیم - تھور سیم - کھلج۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

اپریل -

وسط اپریل سے وسط جون تک

## بیان و استعمال

پھلیاں اور بیج ترکاری کے کام آتے ہیں۔

طریق کاشت - کیاری میں پانچ پانچ پاچھ چھ فٹ کے فاصلہ پر قطاریں بنا کر چھ چھ انچ کے فرق سے بیج بویں جب وہ اچھی طرح سے پھوٹ آویں تو ناقص اکھاڑ کر پھینک دیں۔ اچھے رہنے دیں جب پودے چھ چھ انچ کے قریب اُونچے ہو جاویں تو درختوں کی خشک شاخوں کی ٹیکیں لگا دیں تاکہ بیلین اُن پر چڑھ بیلین۔ جب تک موسم خشک رہے تب تک



کم از کم ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دیں۔ برسات میں زیادہ ترود کی ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ نلای حسب موقعہ ضرور کرتے رہیں۔ ان بیلوں سے وسط دسمبر سے پھلیاں اترنی شروع ہو جاتی ہیں اور اخیر نومبر تک بلکہ اگر زیادہ ٹھنڈ نہو تو وسط دسمبر تک اترتی رہتی ہیں۔ عام کیفیت۔ ان دونوں اقسام کی سیموں کی جلد پر نرم اور سیاہ مٹل کی مانند رُواں ہوتا ہے اگر رُواں ہاتھ سے کل دیا جاوے تو جلد چکنی نکل آتی ہے۔ اگر نرم نرم پھلیاں پکائی جاویں تو ذائقہ بجنسہ فرح (ولایتی سیم) جیسا ہوتا ہے۔ دونوں اقسام کی پھلیاں بہت کچھ ہم شکل ہوتی ہیں مگر خشک ہو جانے پر ادوی سیم کی ایک پھلی سے پانچ چھ سیاہ بیج نکلتے ہیں اور کھلچ کی ایک پھلی سے اتنے ہی خاکی رنگ کے تخم برآمد ہوتے ہیں †

## چار کوئی سیم

*Psophocarpus Tetragonolobus.*  
Goa Bean.

انگریزی یا لاطینی نام  
گو آبین۔

(پہاڑوں میں)

شروع مئی سے وسط جون تک

ہندوستانی نام

چار کوئی سیم

(میدانوں میں)

شروع مئی سے اخیر جون تک



## بیان و استعمال

بطور ترکاری استعمال کی جاتی ہے +  
 طریق کاشت بجنہ وہی ہے جو مکھن سیم کے بارہ میں لکھا گیا ہے  
 عام کیفیت - اور سیموں کی نسبت اس میں پھلیاں کم لگتی ہیں - مگر  
 احتیاط سے اگر کاشت کیجاوے تو ترکاری اچھی ہے +

## پچینڈے

*Trichosanthes Anguina.*

*Snake gourd.*

انگریزی یا لاطینی نام  
 سینگ گورڈ -

(پھاڑوں میں)

ہندوستانی نام  
 پچینڈے -

(میدانوں میں)

وسط اپریل سے وسط جولائی تک | اپریل -

## بیان و استعمال

پچینڈوں کی بالعموم ترکاری بنتی ہے عام طور پر لوگ انہیں پسند نہیں کرتے  
 البتہ مصاحوں اور خاص حکمت سے انہیں خوش ذائقہ بنا سکتے ہیں -  
 اہل یورپ انہیں سیموں کی طرح پکوا کر کھاتے ہیں +

طریق کاشت - کیاریوں کو خوب درست کر کے اُن میں قریب چھ چھ  
 فٹ کے فاصلہ پر قطاریں بنا لیں - اُن پر چھ چھ انچہ کے تفاوت سے تخم



بونے چاہئیں۔ جب وہ ذرہ بڑے ہو جاویں تو ناقص اُکھاڑ کر پھینک دیں  
اور نیچے بانس یا خشک درختوں کی شاخوں کی ٹکیں دیدیں شروع میں  
دسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو آٹھویں دسویں  
پانی دیدیا کریں \*

عام کیفیت۔ چچینڈوں کو جو اعتدال سے نہ بڑھنے دیں ورنہ وہ ترکاری  
کے کام کے نہیں رہیں گے \*

لوبیا  
راز ماہ

*Vigna Catrang Var Asparagus bean*  
*Cuba Bean.*

انگریزی یا لاطینی نام

اس پے رے کس بین۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

ماہ جون۔

بیان و استعمال

ہندوستانی نام

لوبیا۔ لوبیئے کی پھلی۔

(میدانوں میں)

شروع جون سے اخیر جولائی تک

لوبیئے کی پھلیوں کی ترکاری بنتی ہے کچھ بھی کھائی جاتی ہیں پک جانے  
پر اسکے بیج بطور دال استعمال کیئے جاتے ہیں \*

طریق کاشت کیاریوں میں چار چار پانچ پانچ فٹ کے فاصلے پر آمنے



سامنے قطاریں بنا کر ان پر چھ چھ انچہ کی دُوری پر بیج بو دیں جب پودے  
کسی قدر اونچی ہو جاویں تو کمزور دیکھ کر چھانٹ دیں اور ساتھ ہی قطاروں  
کو دختوں کی خشک اور پتلی پتلی شاخوں کی ٹیکیں دیدینی چاہئیں تاکہ  
بیلیں آسانی چڑھنے لگیں۔ شروع میں آٹھویں دسویں نکالی کرتے ہیں  
اور اگر موسم خشک ہو تو ابتداء میں چوتھے پانچویں دن پانی دیتے ہیں  
بعد ازاں دسویں گیارھویں ایک مرتبہ کیاریوں کو تر کر دینا کافی ہے؛  
عام کیفیت ۵۰ گز ہی قطار پر لوبیا بونے کے لئے ڈیڑھ کوارٹ حکم کافی ہیں۔ شملہ  
میں اسے ماہ جون میں بوتے ہیں اور ستمبر میں پھلیاں اترنے لگتی ہیں۔ پہاڑوں  
میں اسے ایسی جگہ بونا چاہئے جہاں اسے دھوپ لگتی رہے +

## رتالو

*Dioscorea Sativa.*

yam.

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

ڈایو سکوریا سے ٹرایو

رتالو

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

شروع پلج سے اخیر مئی تک

شروع فروری سے اخیر مئی تک

بیان و استعمال

رتالو کو انگریزی میں یام کہتے ہیں مگر یام کی سر زمین ہند میں قریب



تین قسموں کے پائی جاتی ہیں۔ اور سب کم و بیش مختلف ترکیبوں کے ساتھ کھانے کے قابل شمار کی جاتی ہیں۔ چند اقسام کی کاشت کی جاتی ہے۔ باقی جنگلوں اور پہاڑوں میں خود رو پیدا ہوتی ہیں۔ اقسام ”یام“ میں رتالو بہت عمدہ گنا جاتا ہے۔ روزیں قند بھی ”یام“ کی قسموں میں سے ایک ہے۔ رتالو کی نہایت عمدہ ترکیبی بنتی ہے۔ اور اسکا اچار بھی پڑتا ہے :

**طریق کاشت۔** پہلے دو دو فٹ چوڑے اور قریب پانچ پانچ فٹ عمیق گڑھے ایک دوسرے سے چار چار فٹ کے فاصلہ پر کھودنے چاہئیں۔ ان گڑھوں کو مٹی کے ساتھ خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ ملا کر پُر کر دینا چاہئے اور ان میں رتالو کے اوپر کے سرے (جنہیں دو دو چار چار آنکھیں ہوں) تراش کر گاڑ دیں۔ جب بیلین پھیلنے لگیں تو کسی درخت جعفری یا دیوار پر چڑھاویں۔ بعض اوقات درختوں یا جعفریوں کا سہارا نہیں دیتے اُس حالت میں اس کی بیلین زمین پر پھیلنے دیتے ہیں اور برسات میں ان کے نیچے خشک شاخوں کی ٹکیں لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات رتالو ان چھوٹی چھوٹی جڑوں سے بھی بوئے جاتے ہیں جو بڑی بڑی جڑوں میں سے پھوٹی ہیں۔ جڑیں زیادہ تر مارچ اپریل میں برآمد ہوتی ہیں تیز بیلوں میں سے جو ٹوٹے پھوٹتے ہیں اُنھیں بھی گاڑ دیتے ہیں۔ اور رتالو پیدا ہو جاتے ہیں مگر اس طریق کاشت میں دو سال کے قریب وقفہ پڑ جاتا ہے بصورت دیگر ایک سال کے اندر رتالو کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں :



عام کیفیت بتا رہا لو پہاڑوں میں سطح سمندر سے چار ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر پیدا نہیں ہوتے سب کہیں اسکی زیادہ کاشت مد نظر ہوتی ہے تو چار چار پانچ پانچ فٹ گہری نالیاں کھود کر اور کھاد مجموعہ دیکر رتالوؤں کے ٹکڑے ہو دیتے ہیں اسکی بلیں کناروں پر پھیلتی رہتی ہیں رتالو خوب ہو جاتے ہیں \*

## شکر قند

*Ipomoea. Batatas.*

*Sweet potato.*

انگریزی یا لاطینی نام	ہندوستانی نام
سویٹ پوٹے ٹو۔ آئی پومی آ۔ بیٹے ٹاز۔	شکر قند۔ شکر قندی۔

### موسم کاشت

(پہاڑوں میں)	(میدانوں میں)
شروع اپریل سے وسط جون تک	آخر اپریل سے آخر جون تک

### بیان و استعمال

شکر قند بالعموم اُبال کر یا بھون کر کھائے جاتے ہیں کسی قدر کچا بھی کھا لیتے ہیں۔ خاص ترکیب کے ساتھ اسکی ترکاری بھی بہت لذیذ بنتی ہے اور آچار بھی پڑتا ہے \*

طریق کاشت سیوں تو شکر قند ہر ایک ایسی زمین میں جہاں اور نباتات اُگ سکتی ہے پیدا ہو جاتا ہے مگر ریگ آمیز زمین میں جسمیں



کسی قدر عمدہ بوسیدہ کھاد دیدی گئی ہو نہایت عمدہ اور شیریں پیدا ہوتا ہے اُسکے بونے کی کئی ترکیبیں ہیں یا تو خاص شکر قند کو رتالو کی طرح کاٹ کر بوتے ہیں یا ان چھوٹے چھوٹے کلوں کو بوتے ہیں جو موسم بہار میں پھوٹ نکلتے ہیں یا پتلی پتلی شکر قندیوں کو لگاتے ہیں یا ان ٹونٹوں سے کاشت کی جاتی ہے جو ریت میں بطور پنیری محفوظ رکھتے ہیں اگر شکر قند کے ٹکڑے یا پتلی پتلی شکر قندیوں کو بونا ہو تو ان کا چو گرد (یعنی چاروں طرف سے) باہمی فاصلہ قریب ۱۸ انچہ کے رہنا چاہیئے اگر کٹے یا ٹونٹے بونے ہوں تو اخیر اپریل سے وسط مئی تک بونے چاہئیں اگر شکر قندیوں کے ٹکڑے بونے ہوں تو اخیر جون میں جبکہ دو ایک اچھے چھنٹے پڑ چکیں بوسکتے ہیں۔ شروع میں جب تک کہ بلیں خوب اچھی طرح سے کیاریوں کی سطح کو ڈھانپ نہ لیں دسویں بارہویں نلائی ہوئی چاہیئے اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے +

عام کیفیت۔ شکر قند دو طرح کے ہوتے ہیں ایک سرح دوسرے سفید سفید رنگ کے شکر قند اعلیٰ درجہ کے گتے جاتے ہیں۔ دکن اور بنگال کی جانب ان کو بہت بوتے ہیں۔ اگر پنجاب میں بھی انکی کاشت کیجاوے تو پوری کامیابی ہو سکتی ہے۔

اکتوبر کے مہینے میں شکر قندیاں کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں +



# پلول

*Trichosanthes, Dioica*

ہندوستانی نام  
پلول - پھول  
انگریزی یا لاطینی نام  
ٹرائچی چوسن تھس - ڈی اوٹیکا -  
موسم کاشت

(سیدانوں میں)  
شرع مئی سے وسط جولائی تک  
(پہاڑوں میں)  
وسط مئی سے وسط جون تک

## بیان و استعمال

نہایت لذیذ ترکاری بنتی ہے اسوقت یہ ترکاری پنجاب میں کبھی کبھی یورپ سے آکر نہایت گراں فروخت ہوتی ہے۔ یورپ میں پلول بالعموم پانوں کی بھیٹ میں بوئے جاتے ہیں۔

یورپ میں پلول جنگلی بھی ہوتے ہیں مگر انھیں کے مشابہ ایک اور شے ہوتی ہے جسے کندرو کہتے ہیں۔ کندرو کی ترکاری بنائی جاتی ہے اور کندرو کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جبکی کاشت کیجاتی ہے دوسرے وہ جو باہر کھیتوں کے کنارے خود رو ہو جاتے ہیں۔ خود رو کندرو تلخ ہوتے ہیں اس لیے ان کی ترکاری نہیں بناتے۔ البتہ بہت بک جانے پر کسی قدر کھائے جاتے ہیں +

طریق کاشت۔ اسے ایسی کیاریوں میں بونا چاہئے جنہیں بارش کا پانی



کھڑا نہ ہونے پاوے۔ کھاریوں کو خوب درست کر کے اور بوسیدہ کھاؤ  
مجموعہ ڈال کر تخم تین تین فٹ کے چوگرد فاصلہ پر بویں جب وہ پھوٹ  
آویں تو نکلتے اکھاڑ کر پھینک دیں اور اچھے پودے رہنے دیں یا تو انکی  
بیلیں زمین پر پھیلنے دیں یا کسی جعفری یا کسی چھوٹے سے درخت پر  
چڑھا دیں۔ شروع میں آٹھویں دسویں نلای کرتے رہیں اور اگر موسم خشک  
ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔

گوئن صاحب لکھتے ہیں کہ پلول تین ہزار فٹ کی بلندی سے اوپر  
پیدا نہیں ہوتے مگر مزید تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تین ہزار فٹ  
سے زیادہ بلندی پر بھی ہوتے ہیں۔ شملہ میں انکی کثرت ہے۔ ڈاکٹر سٹوارٹ  
صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ پلول پنجاب کے مشرقی اور وسطی حصوں میں  
خود رو پایا جاتا ہے۔ نیز صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ پنجاب میں پلول کی  
مانند پانچ چھ اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں مگر انکا نباتاتی (مراد لاطینی) نام  
تحقیق نہیں ہے (۱) "بنگا" یا "ڈنگا" یہ علاقہ جھنگ میں خود رو پایا جاتا ہے۔  
(۲) کیکڑا۔ فیروز پور کے قریب خود رو پیدا ہوتا ہے اسکا پھل بیٹھا ہوتا ہے۔  
لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں یہ بن کر بیے یا گورے کے بہت مشابہ ہے۔  
(۳) کچا۔ یہ بھی فیروز پور کے ریگستانی علاقہ میں خود رو ہوتا ہے۔ اسکا  
پھل ٹرش ہوتا ہے اور مصالحہ کا کام دیتا ہے۔ سنار اس سے زیور صاف  
کرتے ہیں (۴) ترہڑی۔ اسکا پھل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ ضلع ہزارہ میں  
خود رو آگتی ہے۔ لوگ اسے خوب کھاتے ہیں (۵) دریائے جہلم کے کنارے



ایک بیضاوی شکل کا چھوٹا سا پھل ہوتا ہے جو کچری سے کیقہ مشابہت رکھتا ہے۔ اسے بھی لوگ کھاتے ہیں۔ غرضکہ یہ سب پھل ترکاری کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور پھول کے اقسام میں سے شمار کیے جاتے ہیں +

## بینگن

وانگن

*Solanum Melongena. Eggplant.*  
*Brinjal. Aubergine.*

ہندوستانی نام  
بینگن۔ بھاٹا۔  
انگریزی یا لاطینی نام  
برنجال آگ ہلینٹ آبرجین۔

موسم کاشت

(دہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

(۱) اکتوبر (۲) اخیر فروری سے پانچ کے شروع اپریل سے وسط مئی تک  
(۳) وسط جون سے اخیر جولائی تک

بیان و استعمال

اس کی ترکاری بہت لذیذ بنتی ہے۔ بھرتہ اور رائتہ بھی بنتا ہے اور آبی اچار بھی ڈالا جاتا ہے +

طریق کاشت بینگن سال میں تین مرتبہ بوئے جا سکتے ہیں۔ پہلی فصل اکتوبر میں اس طرح سے بو سکتے ہیں کہ ایک بڑی کیاری میں



چھڑکواں بیج بو دیں اور کیاری سے ۲۰ انچہ اونچا ایک چٹائیوں یا پھوس کا ہلکا سا چھپر چھادیں تاکہ پودوں کو پالا نہ مار جاوے۔ جب جائے پالے کا خطرہ دور ہو جاوے اور بہار کا آغاز ہو اُسوقت پودوں کو اور کیاریوں میں قطاروں پر جو ایک دوسرے سے ۱۸ و ۱۸ انچہ کے فاصلہ پر آئے سامنے ہوں ۱۵ و ۱۵ انچہ کے فاصلہ پر بو دیں دسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں دو ایک مرتبہ پانی دیدینا چاہیئے۔ اس فصل سے شروع پاج سے بینگن اُترنے شروع ہو جاتے ہیں اور شروع برسات تک اُترتے رہتے ہیں۔ دوسری فصل وسط فروری سے اخیر پاج تک اُسی طرح بوئی جاتی ہے جس طرح کہ پہلی فصل۔ مگر اس فصل کو چھپر وغیرہ سے ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب پنیری ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو فوراً کیاریوں میں لگا دیتے ہیں۔ اس فصل سے اخیر مٹی میں بینگن اُترنے شروع ہو جاتے ہیں اور برسات کے وسط تک برابر اُترتے رہتے ہیں۔ تیسری فصل شروع برسات میں اُسی طرح بوئے ہیں جس طرح کہ دوسری فصل۔ اس سے موسم خزاں میں بینگن اُترتے رہتے ہیں +

ایک تجربہ کار صاحب کی رائے ہے کہ بینگن "دابہ" کے ذریعہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں مگر دابہ کے بینگن کسی قدر چھوٹے ہوتے ہیں لیکن بہت اگیتے ہو جاتے ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ بچوں سے اُگ کر جتنی دیر پودوں کو بڑے ہونے میں لگتی ہے اُس سے پہلے دابہ کے پودوں میں پھل آ جاتا ہے۔ دابہ کا مفصل بیان پھلوں کی کتاب میں کیا جاوے گا



مگر کسی قدر تشریح اس موقعہ پر بھی خالی از لطف نہوگی :-

دابہ کے دراصل معنی یہ ہیں کہ کسی شاخ درخت یا پودے کے مضبوط اور پختہ حصہ کو (جو بالخصوص وسط کا ہوتا ہے) شکاف دے کر کھاد آمیز مٹی میں داب دیا جاوے تاکہ اُس میں جڑیں پھوٹ آویں اور وہ ایک پودا بن جاوے۔ اس عمل کو زبان انگریزی میں (Layering) کہتے ہیں۔ جب کوئی شاخ درخت یا کسی پودے کی ٹہنی استقدر نہیں جھک سکتی کہ وہ زمین میں دابی جاوے تو گٹلوں وغیرہ میں مٹی بھر کر شاخ تک پہنچاتے ہیں اور نیچے پٹائیاں وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور پانی کی روز مرہ خیرلیستے رہتے ہیں۔ مثلاً بینگن کا اگر دابہ کرنا منظور ہے تو اسکی کسی پختہ شاخ کے وسطی حصہ میں تیر چاقو سے عین درمیان میں قریب ایک انچ لंबا شکاف دیں اس چرے ہوئے حصہ میں ایک چھوٹی سی کنکری رکھ دیں تاکہ یہ حصہ کسی قدر کھلا رہے۔ پہلے سے زمین کو کسیتھ کوٹلوں کا چورا اور پتی کی کھاد دیکر طیار کر رکھیں اور پھر اُس شاخ کو جھکا کر اس طرح سے قریب ایک انچ کے دباویں کہ چرا ہوا حصہ مٹی کے نیچے آ جاوے۔ اوپر سے ایک ہلکا سا روڑا یا اینٹ کا ٹکڑا رکھ دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دبائی ہوئی شاخ زمین سے ابھر نہ جاوے۔ روز مرہ تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں تاکہ زمین تر رہے اور خشک نہ ہونے پاوے۔ دو تین ہفتوں میں اس شاخ میں جڑیں پھوٹ آتی ہیں اُسوقت اصل درخت یا پودے سے اُسے احتیاط کے ساتھ جدا کر لیتے ہیں اور بطور جڑ دار پودے کے اُسے جہاں لگانا



مطلوب ہوتا ہے لگا دیتے ہیں۔ پھلوں کی کاشت میں واہ سے اکثر کام لیا جاتا ہے مگر سبزی ترکاری کی کاشت میں غالباً بینگن ہی ایسا پودا ہے کہ جسکا واہ کر سکتے ہیں۔

عام کیفیت۔ بینگن کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ مارو بینگن بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ تر بھرتا بنتا ہے۔ چھوٹے بینگنوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ادوی اور ایک سفید۔ سفید بینگن زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ بینگن کی ترکاری کو انگریزی اطبا بہت مفید بتاتے ہیں۔

گولن صاحب لکھتے ہیں کہ بینگن تین ہزار فٹ کی بلندی سے آگے نہیں ہوتے مگر تحقیقات سے معلوم ہوا کہ زیادہ بلندی پر بھی ہوتے ہیں چنانچہ شملہ میں بکثرت کاشت کیے جاتے ہیں۔ اور اُن کی پیداوار میدانوں کے اکثر حصوں کی نسبت بہت اچھی ہوتی ہے۔ شملہ کی بلندی سطح سمندر سے ۷۲۴۴ فٹ ہے۔ حال میں گولن صاحب نے سہارنپور کے سرکاری باغ میں بینگنوں کی کاشت پر خاص توجہ فرمائی ہے۔ چنانچہ ممالک غیر اور ہندوستان کے تمام حصوں سے مشہور اور اعلیٰ درجہ کے بینگنوں کے بیج منگوا کر لگائے گئے۔ بعد تجربہ صاحب موصوف نے مفصل کیفیت شائع کی ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کے بینگنوں میں آگرہ کی اقسام "مارو" اور "بریلی" کی اقسام "بارہ ماسی" افضل ہیں اور ممالک غیر کے بینگنوں میں پیرس (دارالخلافہ ملک فرانس) کی اقسام "راؤنڈ ولوٹ" (Round velvet) اور "ٹرس گروس" (Tres grosse) بہت بڑھکر ہیں۔ دیگر اقسام کی



نسبت لکھا ہے کہ وہ بھی بہت عمدہ ہیں لیکن ان قسموں سے کسی قدر کمتر ہیں۔ ان بینگنوں کے بیج سرکاری باغ سہارنپور اور دیگر تخم فروشوں سے فرمایش کرنے پر مل سکتے ہیں۔

لکھنؤ کے سرکاری باغ کے سپرنٹنڈنٹ ریڈلی صاحب نے بھی اعلیٰ اقسام کے بینگنوں کی کاشت کے حال میں متواتر تجربات کیے ہیں۔ انکی رپورٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ انھوں نے پہلے موسم گرما کی فصل کے طور پر مختلف اقسام کے بینگنوں کے بیجوں کو بویا۔ ان میں سے بعض میں پوری پوری کامیابی ہوئی اور بعض میں ناکامی۔ پھر انھوں نے ان تمام اقسام کو بطور فصل سرا بویا۔ اس فصل میں وہ قسمیں جو موسم گرما کی فصل میں رہ گئیں تھیں پورے طور پر بار آور ہوئیں لہذا انھوں نے اعلیٰ اقسام کے بینگنوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک موسم گرما کے بینگن۔ دوسرے موسم سرما کے بینگن۔ انھوں نے افضل اقسام کے بینگن موسم گرما کی کاشت کے لیے مندرجہ ذیل قرار دیئے ہیں :-

بتیٹا اگرہ (انکے ڈیل ڈول اور رنگ مختلف وضع کے تھے) یہ بینگن بہت افراط سے اترتے ہیں۔ مارو اگرہ (رنگ بینگنی یعنی نیلگوں سرخ) مارو میرٹھ (اگرہ کے مارو سے ملتا ہے) لنڈن کے بینگنوں کی ایک قسم اگرہ اور میرٹھ کے مارو کی قسم سے بہت ملتی ہے مگر لنڈن کے مارو ان سے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ لکھنؤ کے بینگنوں کی اقسام اور بریلی کے بینگنوں کی اقسام مارو بارہ ماسی۔ بتیٹا اور سفیدے میں بہت ہی کم فرق ہے۔ میرٹھ کے بینگنوں



کی اقسام "بستی" اور "اڈونا" اعلیٰ درجہ کی ہیں اور انکی پیداوار بھی بہت ہوتی ہے۔ گرمی کی پچھیتی فصل کے لیے گورکھ پور کی قسم نمبر بہت اچھی ہے پیرس کی قسم (*Blanchelougue de chine*) کی بھی رپورٹ میں بہت تعریف لکھی ہے۔ اس قسم <sup>Paris</sup> کے بینگن سفید رنگ کے سات اچھے لنبے اور ڈھائی اچھے چوڑے ہوتے ہیں۔ اقسام لنڈن کے بینگن گول بڑے اور افراط سے ہوتے ہیں۔

صاحب موصوف نے موسم سرا کی کاشت کے لیے مندرجہ ذیل اقسام کی تعریف لکھی ہے :-  
گورکھ پور نمبر اسکے بینگن بہت عمدہ ۱۰ اچھے لنبے اور چار اچھے چوڑے ہوتے ہیں۔

پمپل لنڈن (*Purple London*) اس قسم کے بینگن  $\frac{1}{4}$  اچھے لنبے اور ۳ اچھے چوڑے ہوتے ہیں۔

ٹرس گروس (پیرس) (*Tres grosse Paris*) کے بینگن بہت بڑے ہوتے ہیں چنانچہ اسکے ایک بینگن کا وزن لکھنؤ کے سرکاری بلغ میں ساڑھے تین سیر پختہ اُترا۔ اقسام نیویارک (*New York*) اور ٹرس گروس ایک ہی معلوم ہوتی ہیں۔ انکے رنگ سیاہ ہوتے ہیں مندرجہ ذیل اقسام جاڑے اور گرمی دونوں فصلوں میں خوب نشو و نما ہوتی ہیں :-

پمپل لنڈن۔ بیتا آگرہ۔ بستی آگرہ۔ وغیرہ وغیرہ۔



اب تک بینگنوں کو اہل یورپ بہت ہی کم استعمال کرتے تھے۔  
 مگر اب روز بروز انکی جانب زیادہ توجہ ہوتی جاتی ہے چنانچہ حال میں  
 انگلستان کی رائل ہارٹی کل چہرل سوسائٹی ایک رسالہ (جلد ۲۲ حصہ اول)  
 میں ڈاکٹر بونے ویا کا ایک مضمون سبز ترکاریوں کے پکانے کے بارہ میں  
 شائع ہوا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے بینگنوں کو درجہ اول پر رکھا ہے  
 ان کے پکانے کی مختلف ترکیبیں لکھی ہیں اور انکے ذائقہ اور فوائد  
 کی بہت تعریف کی ہے۔

سوداگران تخم کی فرستوں میں اور بھی بہت سی عمدہ بینگنوں کی اقسام  
 پائی جاتی ہیں جنکا مفصل بیان کرنا طوالت میں داخل ہوگا +

## پوئی

*Basella Rubra*

*Indian spinach*

*Malabar Nightshade*

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

انڈین - سی - تلج -

پوئی - کوئی -

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

اپریل

ماہ جون میں بڑھ سکتے ہیں۔  
 وسط جولائی سے اوسط اگست تک قلیں لگا سکتے ہیں۔



## بیان و استعمال

بالعموم اسکے پتوں کا ساگ بناتے ہیں۔ اہل بنگال اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ساگ بہت خوش ذائقہ ہوتا ہے \*  
 طریق کاشت طریق کاشت کیا ہے۔ جہاں اسکے چند بیج بو دیئے یا قلم یا جڑ گاڑ دی وہیں یہ بڑھنے لگجاتی ہے۔ بیل بہت پھیلتی ہے۔ جب بڑھے لگے تو کسی چھتر۔ جھفری یا دیوار وغیرہ پر چڑھا دینی چاہیئے۔ پھر یہ اپنا رستہ آپ نکال لیتی ہے۔ زیادہ ترڈو کی کچھ ضرورت نہیں ہے اس کی جڑ میں سال میں دو مرتبہ بوسیدہ گوبر کی کھاد دیدینی چاہئے۔ اور جب موسم خشک ہو تو پانی دیتے رہیں۔ پھر یہ اسقدر پھیلتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں رہتا۔ عام کیفیت اسکی یوں تو کئی قسمیں ہیں مگر عام طور پر وہی استعمال کیجاتی ہیں جسکی شاخیں سفید ہوتی ہیں اسکی گھنڈیوں کو دبانے سے نہایت شوخ رنگ برآمد ہوتا ہے

## جولائی

*Amarantus Blitum var.oleraceus.*

*Da-Dangeticus*

انگریزی یا لاطینی نام

ایسے رن رن بلانی ٹم

ہندوستانی نام

جولائی۔ مرسا۔ لال ساگ۔

موسم کاشت

(بہاروں میں)

(میدانوں میں)

شروع جولائی سے اخیر جولائی تک

شروع فروری سے اخیر جولائی تک



## بیان و استعمال

بالعموم ساگ بناتے ہیں۔ خود رو چولائی کا ساگ بہت لذیذ ہوتا ہے +  
 طریق کاشت۔ معمولی ہے۔ یا تو کیاریوں میں تخم چھڑکواں بو دیں اور  
 جب پودے پھوٹ آویں اسوقت جہاں بہت گھنے ہوں وہاں سے چھٹ  
 دیں یا کیاریوں میں انگلی سے آدھ اچھ گہری قطاریں بنا کر جن کا فاصلہ  
 آٹھ سانسے ۱۸ اچھ کے قریب ہو تخم بو دیں اوپر سے ہلکا مٹی کا غلاف دیدیں  
 شروع میں دسویں بارھویں دو تین مرتبہ نلائی کر دیں اور اگر موسم خشک  
 ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔ زیادہ ترود کی کچھ ضرورت  
 نہیں۔ اگر دیر تک ساگ یستے کی ضرورت ہو تو لگاتار پندرھویں دن  
 تخمیزی کرنی چاہیئے +

عام کیفیت۔ چولائی کی بہت سی قسمیں ہیں مگر طریق کاشت سب کا  
 یہی ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے +

### خرفہ

نہ سر

(Portulaca Oleracea)

(Purslane)

انگریزی یا لاطینی نام

پرسلین۔

ہندوستانی نام

کلفا۔ کلفے کا ساگ۔ خرفہ۔



## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اپریل سے وسط دسمبر تک

وسط مارچ سے آخر جون تک

## بیان و استعمال

ساگ بہت اچھا بنتا ہے یہ ترشی مائل ہونے کی وجہ سے نہایت خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ اسکے بیجوں کو پساری ادویات کے لیئے فروخت کرتے ہیں +  
**طریق کاشت**۔ بونے کا طریق بجنسہ وہی ہے جو چولائی کے بارہ میں لکھا گیا ہے +  
**عام کیفیت**۔ موسم گرا میں یہ ساگ زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اسکی تاثیر سرد بیان کی جاتی ہے +

مرثہ دانگس

## لال مرچ

*Capsicum Frutescens* (Common chilli)

*Capsicum Grossum* (Bell pepper)

*Capsicum minimum* (Bird's eye chilli)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

چلی - رکیپ - سی - کم

سرخ یا لال مرچ - ہری مرچ

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اپریل سے آخر مئی تک

شروع اپریل سے وسط جون تک



## بیان و استعمال

مرچوں کا استعمال زیادہ تر بطور مصالحو ہوتا ہے خشک کر کے ہزاروں  
سَن مرچیں فروخت کیجاتی ہیں۔ ہری مرچیں کھائی جاتی ہیں اور آچار میں  
بھی پڑتی ہیں۔ بعض خوش خور ہری مرچوں کی ترکاری بھی بناتے ہیں  
اور وہ خوب لذیذ اور چٹ پٹی ہوتی ہے +

طریق کاشت پہلے کسی کیاری میں تخم چھڑکواں بوکر پھیری لگا لیں۔  
جب پودے کچھ بڑے ہو جاویں تو کیاریوں میں قطاروں پر جو ایک  
دوسرے سے آٹھ سائے قریب دو دو فٹ کے فاصلہ پر ہوں ایک  
ایک فٹ کے فرق سے پود لگاویں۔ بونے سے پہلے کیاریوں میں خوب  
بوسیدہ کھاد مجموعہ دینی چاہیئے تاکہ پودے خوب تناور ہوں۔ شروع میں  
دسویں بارھویں نلای کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو چھٹے ساتویں  
پانی دیدینا کافی ہے +

عام کیفیت۔ مرچیں محض آرائش کے لیئے بھی گمکوں میں لگائی جاتی  
ہیں اور ان کی بیسیوں قسمیں ہیں۔ جب پودے پھیلنے لگیں اُسوقت  
ان کی جڑوں میں کسی قدر باریک نمک دیدینا نہایت مفید ثابت ہوگا  
اگر ولایتی بیجوں سے مرچیں بونی ہوں تو ماہ اکتوبر میں بونی چاہئیں گرمی  
میں ہرگز نہ بویں ورنہ ناکامی ہوگی ولایتی مرچوں کے بیجوں کو ہمیشہ گمکوں یا  
نائدوں میں چھڑکواں بوکر پھیری لگا دیں۔ جب گمکوں میں پودے دو تین انچہ  
اوپر ہو جاویں تو قطاروں پر یا جہاں چاہیں لگا سکتے ہیں +



# اروی

(Colocasia Antiquorum)

انگریزی یا لاطینی نام

کولو کے شیا۔ انٹی کورم۔

ہندوستانی نام

اروی۔ گھوٹیا۔ کچالو۔

موسم کاشت

(بہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع اپریل سے وسط جون تک

اخیر اپریل سے اخیر مئی تک

بیان و استعمال

اروی کی عام طور پر تین قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ماٹھ کے انگوٹھے کے برابر لمبی اور موٹی ہوتی ہے اور اسکی زیادہ تر ترکاری بنائی جاتی ہے جن دنوں آلو کم اور گراں ہو جاتے ہیں ان دنوں انکا چرخ بہت بڑھ جاتا ہے۔ بڑے شہروں کے حلوائی اسکو ایسا قیمتی بناتے ہیں کہ روپیہ سیر تک بچتی ہے + دوسری قسم کچالو ہے جو گیند کے مانند گول ہوتی ہے۔ انھیں زیادہ تر خاچہ والے بطور چاٹ کے بیچتے ہیں + تیسری قسم موٹھے یا بندھے کہلاتی ہے۔ موٹھے قریب ایک ایک فٹ لمبے اور ماٹھ کی کلامی کے برابر موٹے ہوتے ہیں یہ بھی بطور ترکاری استعمال کیے جاتے ہیں۔ اروی کے پتے بھین اور پٹھی وغیرہ میں پیٹ کر اکثر لھائے جاتے ہیں۔ اروی کے پودے کے تنہ کو چھیل کر اور ٹکڑے کر کے آبی اچار



ڈالتے ہیں۔ اور ترکاری بھی بناتے ہیں +  
 طریق کاشت۔ پہلے زمین کو خوب جوت کر اور مٹی کو باریک کر کے  
 کھاو مجموعہ ڈالتی چاہیئے۔ بعد ازاں قطاریں دو دو فٹ کے فاصلہ پر  
 بناویں جنکی گہرائی چار انچ ہو۔ پھر صحیح و سالم ارویاں ایک ایک فٹ  
 کے فاصلہ پر بو کر مٹی کا غلاف چڑھاویں۔ جب موسم خشک ہو تو  
 جوتھے دن پانی دیتے رہیں اور پندرھویں بیویں نلانی کر دینی چاہیئے +  
 عام کیفیت۔ آروی کا چونکہ عام طور پر خرچ زیادہ ہے اسلئے اسکی  
 حیثیت میں ضرور ترقی ہونی چاہیئے۔ اسوقت جو آرویاں بازاروں میں  
 بکتی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بونے والوں کو مقدار کا  
 خیال رہتا ہے انکے اچھے برے ہونے کی وہ بہت کم پرواہ کرتے ہیں +

## زمین قند

(*Amorphophallus conopsea*)

نام	ہندوستانی نام
انگریزی یا لاطینی نام	زمین قند
اسوفوفے مس۔ کم پے نیولے مٹ۔	
موسم کاشت	

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

یہ شروع مارچ سے وسط اپریل تک نیز جولائی و اگست میں بالعموم  
 ان اضلاع میں بویا جاتا ہے جو دامن کوہ میں واقع ہیں +  
 شروع جولائی سے وسط ستمبر تک۔



## بیان و استعمال

زمین قند کی اقسام قریب تیس کے بیان کی جاتی ہیں جنہیں سے ہر ایک کی خاص ترکیب سے ترکاری بنائی جاسکتی ہے بالخصوص زمیں قند کی ترکاری نہایت عمدہ اور لذیذ ہوتی ہے۔ عام لوگ اسے نہایت گرم خیال کرتے ہیں اور اسی سبب سے موسم سرما میں اسکا زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ بڑی وقت اسکے بنانے میں یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص آسانی سے اسے بنا نہیں سکتا۔ خاص خاص ترکیبوں سے یہ بنایا جاتا ہے اور اسپر لاگت بھی زیادہ آتی ہے۔ ہر جگہ یہ دستیاب نہیں ہوتا اور قیمت میں گراں ملتا ہے۔ اس میں کچھ عرق ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ فوہ بھی باقی رہ جاوے تو سارے ذائقہ میں فتور ڈال دیتا ہے۔ زمیں قند کا آچار بھی پڑتا ہے۔ زمیں قند کے پتے اگر کاٹ کر کیاریوں میں داب دیئے جاویں تو سبز کھاؤ کا کام دیتے ہیں +

**طریق کاشت**۔ زمیں قند کی فصل بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام لوگ اسکے بونے کی مجرات نہیں کرتے۔ مگر جب فصل طیار ہو جاتی ہے تو ساری کسر نکال دیتی ہے۔ اور سب محنت اور لاگت وصول ہو جاتی ہے۔ زیادہ گرم اور خشک آب و ہوا اسے نا موافق ہے۔ اسی لیے اسے ایسے اضلاع میں بولتے ہیں جو پہاڑوں کے نیچے واقع ہوتے ہیں زمیں قند در اصل ایک پودے کی جڑ ہے۔ بڑی جڑ کے اوپر اور چھوٹی چھوٹی گٹھیاں پھوٹتی ہیں ان چھوٹی چھوٹی گٹھیوں کو موسم بہار کے شروع میں بولتے ہیں۔ یوں تو زمیں قند ۳ سال کے اندر کھودنے کے قابل ہوتا ہے



مگر لوگ نفع کے لالچ سے جلدی کر دیتے ہیں۔ یہ ہر ایک ایسی زمین میں  
 جہاں اور نبات پیدا ہو سکتی ہے نشو و نما ہو جاتا ہے مگر بونے سے  
 پہلے زمین میں خوب بوسیدہ گوہر اور زیادہ تر لکڑی اور اُپلوں کی راکھ اور پتوں  
 کی کھاد دینی چاہیئے اگر توجہ اور غور و پرداخت سے اسکی کاشت کی جاوے  
 تو زمین قند بہت بڑے سڈول اور عمدہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس وقت  
 بازاروں میں جیسے زمین قند عام طور پر ملتے ہیں وہ قابل تعریف نہیں  
 ہیں۔ انکی کاشت سے پہلے زمین کی جوتائی بہت گہری ہونی چاہیئے۔ بجائے  
 جوتائی کے اگر پھاڑہ سے قریب ۶ فٹ گہرے ۲ فٹ چوڑے گڑھے کھودے  
 جاویں اور پھر مٹی کو باریک کر کے اور خوب کھاد دے کر گڑھوں کو اسطرح  
 سے پُر کر دیں کہ سطح زمین سے عمق صرف آدھ گز باقی رہ جاوے اسوقت  
 زمین قند یا زمین قند کی گٹھیاں یا ٹونٹے ہو دیں جوں جوں پودے بڑے  
 ہوتے جاویں گڑھوں میں مٹی ڈالتے جاویں یہاں تک کہ جب پودے سطح  
 زمین سے فٹ دو فٹ اونچے ہو جاویں اسوقت گڑھوں کو بالکل سطح کے ہموار  
 کر دیں گٹھیوں سے مراد وہ گٹھیاں ہیں جو بڑے بڑے زمین قندوں پر چھوٹے  
 چھوٹے آلو کی مانند اوپر آتی ہیں انھیں چاقو سے نکال کر بو دیتے ہیں۔ ان  
 میں سے زمین قند پیدا ہو جاتے ہیں۔

بعض اشخاص زمین میں چھوٹے چھوٹے زمین قند بھی گاڑ دیتے ہیں وہ بہت  
 جلد اُگ آتے ہیں اور ان سے بافراط زمین قند پیدا ہو جاتے ہیں \*  
 عام کیفیت۔ بہت چھوٹے زمین قند اُکھاڑنے نہیں چاہئیں۔ ضلع کانگرہ



میں نہیں قند ہوتا ہے چنانچہ سجانپور کے قُرب و جوار میں بہت بویا جاتا ہے

باتھو کنہ

(Chenopodium Album)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

اچی نو پوڈی ام - البم -

باتھو - بتھوا -

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

اپریل

شروع فروری سے وسط مارچ تک

شروع نومبر سے وسط دسمبر تک

بیان و استعمال

کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جب جولائی اور پالک کا ذکر کیا گیا ہے تو باتھو کا کیوں نہ کیا جاوے۔ دراصل باتھو کی قدر و منزلت جولائی سے بہت زیادہ ہے۔ باتھو کی بھجیا اچھی بنتی ہے وال میں بھی ڈالا جاتا ہے مگر سب سے عمدہ چیز جو اس سے بنتی ہے وہ باتھو کا رائے ہے۔ باتھو کی کاشت جہانتک دریافت ہوا ہے کہیں نہیں کی جاتی۔ یہ کھیتوں۔ میدانوں اور باغیچوں میں خود رو گھاس پھاس کی طرح پیدا ہو جاتا ہے اور قریب قریب سارے سال اچھی یا بُری حالت میں کھڑا رہتا ہے۔ البتہ گیہوں کا یہ خوب ساتھ دیتا ہے جب وہ برآمد ہوتے ہیں یہ بھی برآمد ہو جاتا ہے جب وہ ہرے ہوتے ہیں



تو یہ بھی ہل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کٹ جاتے ہیں تو یہ بھی اُنکے ساتھ کٹ جاتا ہے۔ چونکہ اسکی باقاعدہ کاشت نہیں کیجاتی اسلیئے عام لوگوں کو سوائے خاص ترؤد یا خاص فرمایش کے بہت کم دستیاب ہوتا ہے۔ اگر اسکی توجہ کے ساتھ کاشت کیجاوے تو اسکی موجودہ حیثیت اور ذائقہ میں نمایاں فرق ہو سکتا ہے۔ پھولوں یا سہری ترکاری کی کیاریوں میں جہاں یہ کبھی کبھی خورو پیدا ہو جاتا ہے وہاں اسپر بہ نسبت کھیتوں یا افتادہ زمین کی پیداوار کے زیادہ رونق ہوتی ہے۔ اگر یہ بازاروں میں اور ساگوں کی طرح آنے لگے اور حسب ضرورت لوگوں کو آسانی سے مل سکے تو ضرور یہ بہت جلد مٹھی پالک اور سونے کے برابر شمار ہونے لگے گا۔

طریق کاشت۔ کسی کیاری کو درست کر کے اور اُس میں بوسیدہ کھاد مجموعہ ویکر ہاتھو کے بیج چھڑکواں بو دیں۔ جب پودے نکل آویں تو جہاں گھنے ہوں وہاں سے اسطرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا چوگرد فاصلہ قریب پانچ انچ کے رہ جاوے شروع میں چوتھے پانچویں پانی دیدینا چاہیئے۔ جب پودے بڑے ہو جاویں اور موسم خشک ہو تو دسویں بارھویں پانی دیدینا کافی ہے۔ شروع میں دو تین مرتبہ نلانی بھی ہو جانی چاہیئے ورنہ فصل خاطر خواہ نہیں ہوگی۔ ہاتھو کے صرف پتے استعمال کیئے جاتے ہیں۔ پتوں کو روزمرہ حسب ضرورت پھونک سکتے ہیں۔ پودے کے شاخوں پر اور بہت جلد نکل آویں گے۔ اگر ہاتھو کو موسم گریا کے اخیر میں کاٹ دیا جاوے اور ذرہ سی بھی جڑہ باقی رہ جاوے تو وہ پھر کھوڑے ہی دنوں میں خود بخود پھوٹ آتی ہے۔

عام کیفیت۔ پہاڑوں میں ہاتھو سطح سمندر سے ساڑھے تیرہ ہزار فٹ کی



بلندی تک پایا جاتا ہے :

# گوار کی پھلیاں

(*Gyamposis psoraloides*)

ہندوستانی نام	انگریزی یا لاطینی نام
گوار۔ گوار کی پھلی۔	سی ام پوس پورے لائڈس

## موسم کاشت

(میدانوں میں)	(پہاڑوں میں)
وسط جولائی سے آخر اگست تک	اپریل
وسط ستمبر سے وسط نومبر تک	

## بیان و استعمال

عام طور پر گوار کی پھلیوں کی کاشت توجہ کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ گوار کو یا تو کھیتوں کے کنارے بوتے ہیں یا خریف کی فصل کے کسی اناج کے ساتھ ملا جلا کر کاشت کی جاتی ہے۔ پنجاب میں بالعموم موٹا اور سخت قسم کا گوار بوتے ہیں اور وہ قریب قریب سب نموشیوں کے چارے کے کام آتا ہے۔ درحقیقت یہ ایک پُر غذائیت اور مقوی چارہ ہے لیکن جو گوار ترکاری کے کام آتا ہے وہ نہایت نرم ہوتا ہے اور اسکی پھلیاں لنبی ہوتی ہیں۔ اسکی ترکاری بہت لذیذ بنتی ہے اور کئی قسم کی سبزیوں سے ڈالنے میں کم نہیں ہوتی۔ بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ اسکے



بچوں کی دال بھی بنائی جاتی ہے مگر زیادہ تر اس کی پھلیوں کی  
 ترکاری بنتی ہے۔ راجپوتانہ۔ اور بیکانیر کی جانب گوار کی پھلیاں لوگوں کی  
 خوراک کا جزو اعظم ہیں۔ باگڑ اور بیکانیر کے لوگ گوار کی پھلیاں بطور تحفہ  
 پیش کیا کرتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں اسے سوغات سمجھ کر لیجاتے ہیں۔  
 اسمین ذرہ شجہ نہیں ہے کہ گوار اُس علاقہ کا تحفہ ہے۔ جو بات اس میں پائی  
 جاتی ہے وہ اور علاقوں کے گوار میں نہیں پائی جاتی خشک کر کے اسے  
 مدتوں رکھ چھوڑتے ہیں اور جب اُسے بنانے کی ضرورت ہوتی ہے تھوڑی  
 دیر پانی میں بھگو کر بنا لیتے ہیں نہایت نرم اور خوش ذائقہ ترکاری بنتی ہے  
 طبلق کاشت۔ اگرچہ گوار ہر ایک ایسی نہیں میں جس میں اور سبز ترکاریاں  
 پیدا ہو سکتی ہیں آسانی ہو جاتا ہے مگر ریشلی زمین میں جس میں خوب طرح  
 سے کھاد مجموعہ دیدی گئی ہو بہت عمدہ ہوتا ہے۔ چار چار فٹ کے فاصلہ  
 پر قطاریں بنا کر انپر تخم چھڑکواں بو دیں۔ جب پودے اُگ آویں تو انھیں اس  
 طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا باہمی فاصلہ قریب ایک فٹ کے  
 رہ جاوے۔ اگر موسم خشک ہو تو تیسرے چوتھے پانی دیتے رہیں۔ جب پودے  
 بڑے ہو جاویں تو چھٹے ساتویں پانی دیدینا کافی ہے۔ شروع میں دسویں بارہویں  
 نلانی کرتے رہیں تاکہ زمین سخت نہ پڑ جاوے اگر چاہیں تو قطاروں کے وسط  
 میں پالک یا بستھی وغیرہ بوسکتے ہیں +  
 عام کیفیت۔ اگر ممکن ہو تو علاقہ بیکانیر سے گوار کے تخم حاصل کر کے  
 بونے چاہئیں۔ پھلیاں بہت عمدہ پیدا ہونگی +



# باب سوم

موسم گرما کے ہرے مصالحے

ادرک

(Zingiber Officinalis)

(Ginger)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

ادرک۔

جن جر۔ (زین جی بر۔ آئی سی نے بس۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع فروری سے وسط پانچ تک اخیر جون سے وسط اگست تک

بیان و استعمال

ادرک درحقیقت ایک مصالحہ ہے مگر زیادہ تر اسے اچاروں میں ڈالتے ہیں اورک کا مرتبہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے مگر اسکا عمدہ مرتبہ اسوقت بنتا ہے جبکہ ریشہ پڑنے سے پہلے اسے اکھڑوا لیا جاوے۔ اسکی چٹنی بھی بناتے ہیں وال ترکاریوں میں بھی ڈالتے ہیں اور خاص ترکیب سے خشک کر کے اس سے سونٹھ بناتے ہیں۔ صوبہ بمبئی میں سونٹھ بنانے کے کئی بڑے بڑے کارخانے ہیں کیونکہ سونٹھ تجارت کی شے ہے۔ ادرک اور سونٹھ دونوں بطور ادویات بھی استعمال کیجاتی ہیں۔ ادرک کی ترکاری بھی نہایت عمدہ بنتی ہے۔



طریق کاشت۔ اورک کی کاشت کے لئے جہاں تک ہو سکے ایسی زمین انتخاب کرنی چاہیئے جس میں بالوریت کا جزو معقول ہو۔ چکنی مٹی میں اورک اچھی نہیں ہوتی۔ اگر ایسی زمین میں جس میں چکنی مٹی اعتدال سے زیادہ ہو اورک کی کاشت منظور ہے تو پہلے اُس میں دریا کا ریت ڈلوا کر گہری کھدائی کرانی چاہیئے بعد ازاں کھاد مجموعہ اور پتوں کی کھاد مٹی کے ساتھ اس طرح سے آمیز کر دیں کہ وہ نہایت باریک ہو کر مٹی کے ساتھ ملجاوے۔ بعد ازاں کیا بیاں بنا کر انہیں ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کے فاصلہ پر نالیاں کھود لیں جن کا عرض پانچ انچ اور عمق چار انچ ہو۔ ان نالیوں میں سے جو مٹی برآمد ہو اُسکا نالیوں کے ہی دونوں جانب پشتہ باندھتے چلے جاویں اس کے بعد نالیوں میں کسی قدر کھاد مجموعہ آمیز مٹی کی تہ بچھا کر اورک کی گٹھیاں ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر دبا دینی چاہئیں اور اوپر سے مٹی کا غلاف چڑھا دینا چاہیئے۔ جب پودے پھوٹ کر کسی قدر بلند ہو جاویں تو پشتہ کے دونوں طرف سے کسی قدر مٹی پودوں کی جڑوں میں دیدیوں جب وہ اور بلند ہو جاویں تو اور پشتہ کی مٹی جڑوں میں ڈالیں اسی طرح رفتہ رفتہ نالیوں کو کیاریوں کی سطح کے برابر کر دیں۔ ابتداء میں جبکہ موسم خشک ہو تو پانچویں چھٹے کیاریوں کو معتدل طور پر تر کرتے رہیں۔ جب پودے بڑے ہو جاویں تو دسویں بارھویں پانی دیدینا کافی ہے۔ شروع میں دو دو ہفتہ بعد نلائی کر کے کیاریوں کو خس و خاشاک سے پاک کر دینا ضروری ہے \* عام کیفیت۔ اورک کی کاشت کے لئے حتی الامکان صحیح و سالم گٹھیاں

لے مگر ہر حالت میں شروع میں کھدائی یا جوتائی قریب ۲ فٹ گہری ہو جانی چاہیئے \*



انتخاب کرنی چاہئیں ورنہ فصل خاطر خواہ نہیں ہوگی۔ جنگلوں اور پہاڑوں کی نو توڑ اراضیات میں اورک بہت عمدہ پیدا ہوتی ہے کاشت سے پہلے خوب گہری کھدائی کر کے زمین کو اچھی طرح درست کر لینا چاہیئے۔

## ہلدی

لیدر

(Curcuma longa)

(Turmeric)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

|| اڑمک - (کرکیوما لانگا)

ہلدی۔

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع فروری سے وسط مارچ تک || شروع جولائی سے وسط اگست تک

## بیان و استعمال

ہلدی کا زیادہ تر استعمال بطور مصالکھ ہوتا ہے۔ شاید ہی ہندوستان میں کوئی گھر ایسا ہو گا جس میں روز مرہ ہلدی کا خرچ نہ ہو۔ ہدی کو رنگنے کے کام میں بھی لاتے ہیں اور کچی اور پکی ہلدی کو ادویات کے طور پر بھی برتتے ہیں۔ اکتوبر کے اخیر اور نومبر کے شروع میں ہلدی کو اکھاڑا جاتا ہے اور اسے پانی میں کسی قدر جوش دیکر دھوپ میں خشک کر لینے ہیں۔ جس ہلدی کو بغیر اہالے سکھا لیتے ہیں اسی میں تیزبو بانی بجاتی ہے طریق کاشت۔ طریق کاشت بجنسہ وہی ہے جو اورک کے ضمن میں بیان ہوا ہے۔



عام کیفیت۔ ہلدی کو باصوم اورک کے ساتھ بوتے ہیں۔ ہلدی کے  
 مشابہ دو تین اور چیزیں بھی ہوتی ہیں مثلاً کچور (Hiadychium spicatum)  
 وٹیکا کچور و زکچور (Curcuma Zerumbet) و بن ہلدی (Roscoea Purpurea)  
 وغیرہ ان سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ یہ چیزیں ادویات اور گھوڑے و مویشیوں  
 وغیرہ کے معالجہ میں کام آتی ہیں اور انکی جڑیں اور پتے بھی کئی کام  
 دیتے ہیں مگر انسانی خوراک کے لیے بطور مصالحو انکا کبھی استعمال نہیں  
 ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اہل یورپ نے کچور کو جنگلی اورک سمجھ کر مرتبہ  
 اور چٹنی وغیرہ کے مصرف میں لانے کی کوشش کی تھی مگر نا کامی ہوئی۔ لہذا  
 انکے پتوں سے سونے بیٹھنے کے لیے چٹائیاں خاصی طیار کر لیجاتی ہیں \*

## باب چہارم

### موسم سرما کی ترکاریاں

### ولایتی بینگن

(Cycopersicum Esculentum)  
 (Tomato)

انگریزی یا لاطینی نام  
 ٹومٹے

ہندوستانی نام  
 ولایتی بینگن

موسم کاشت

(پہاروں میں)

(میدانوں میں)

وسط پاج سے اخیر مئی تک

اخیر جولائی سے اخیر اکتوبر تک



## بیان و استعمال

ترکاری بہت اچھی بنتی ہے۔ اہل یورپ اسے بیسیں مختلف ترکیبوں سے استعمال کرتے ہیں۔ عمدہ بچوں کی پیداوار نہایت لذیذ ہوتی ہے ۛ

اجمار مدراس میل میں ایک صاحب تعجب ظاہر کرتے ہیں کہ کیوں ہندوستان میں ولایتی بینگن کم بوٹے جاتے ہیں اور کم استعمال کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نہایت خوش ذائقہ اور مفید ترکاری ہے۔ نیز ڈاکٹروں کے حوالوں سے وہ لکھتے ہیں کہ ولایتی بینگن انتہا درجہ کے مصفی خون ہیں جن اصحاب کو جگر کے متعلق شکایتیں رہتی ہیں انکے لئے یہ بہت ہی فائدہ بخش ہیں۔ ہزار دواؤں کی گولیاں ایک طرف اور یہ اکیلے ایک طرف۔ چھوٹے بچوں کے حق میں جنھیں پھوڑے بہت ستاتے ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں ۛ ایک اور تجربہ کار صاحب اجمار انڈین گارڈنگ کلکتہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ولایتی بینگن معدہ کی شکایتوں کے دور کرنے کے لئے نہایت مفید ہیں نیز جن سیوہ دار درختوں کی شاخوں پر کیڑے لگ جاتے ہیں ان شاخوں پر اگر ولایتی بینگن کے پتے اور ڈنٹھل کل دیئے جاویں تو کیڑے مکوڑے فی الفور دفع ہو جاتے ہیں اور دوبارہ نمودار ہوں تو پھر یہی عمل کیا جاوے بالکل صاف ہو جاویں گے۔ بہر حال یہ امر قابل آزمائش ہے اگر پتے یا ڈنٹھل ملنے میں وقت ہو تو عرق نکال کر چھڑکیں یا پتوں اور ڈنٹھلوں کو پانی میں بھگو کر اور خیساندہ کر کے گرم آمود شینیوں یا تنہ پر ملیں ۛ

طریق کاشت ولایتی بینگن کئی قسم کے ہوتے ہیں مگر انہیں آپس میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ کسی قدر رنگ اور کسی قدر ذائقہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اس ملک میں یہ بہت عمدگی کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں اور انکے بچوں سے پھر دوسری فصل ہو سکتے ہیں مگر تین سال سے زیادہ



ان بیجوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر تازہ ولایتی بیج ہر سال تخم فروشوں سے خرید کر بوئے جاویں تو بہتر ہے۔ پہلے کسی کیاری میں تخم چھڑکواں بو کر پھیری لگا لیں۔ جب پودے تین چار انچہ اوپٹے ہو جاویں تب اکھاڑ اکھاڑ کر کیاریوں میں باقاعدہ لگا دیں۔ قطاروں کا باہمی تین تین فٹ فاصلہ کھنوازی رہے اور پودے دو دو فٹ کے فرق سے لگانے چاہئیں۔ جب موسم زیادہ سرد ہو اور کوہر اور دھند پڑتی ہو تو بہتر ہے کہ پودوں کے اوپر شام سے پھوس کے ہلکے چھتر یا چٹائیاں ڈال دی جاویں۔ چٹائیاں ڈالنے کا سہل طریق یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بانس کے ٹکڑوں یا درختوں کی شاخوں کا ٹھاٹھ باندھ کر اسپر چٹائیاں پھیلا دیں اس طرح سے سب پودے ڈھک جاویں گے اگر موسم خشک ہو تو دسویں دن پانی دیں۔ تا کارہ خار و خس کو کیاریوں سے ہمیشہ احتیاط سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہیئے۔ اگر اگستی فصل جولائی میں بوئی جاوے اور پچھیتی سمبر یا اکتوبر میں بوویں تو شروع جولائی تک اترتے رہتے ہیں۔ زیادہ خیال یہ رہے کہ کیاریاں ایسی ڈھلوان بنائی جاویں کہ بارش کا فالتو پانی ان میں دیر تک کھڑا نہ رہے۔ ایک تجربہ کار صاحب ولایتی بینگنوں کی کاشت کے متعلق اپنا ذاتی تجربہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں :-

ولایتی بینگنوں کے بیج میدانوں میں اخیر جون سے اخیر نومبر تک بو سکتے ہیں اور ہماروں میں شروع مارچ سے اخیر مئی تک زمین اچھی طاقتور ہونی چاہیئے جہاں تک ممکن ہو سکے عمدہ اور تازہ بیج حاصل کر کے گملوں



یا کسی کیاری میں پنیری لگاویں۔ جس کیاری میں پنیری لگانی سے اسکی مٹی میں کیتھ بوسیدہ گوبر اور پتی کی کھاد ملا دینی چاہیئے۔ اور پھر مٹی اور کھاد کو اسطرح سے ملاویں کہ کہیں ڈھیلوں یا مٹی کی ڈلیوں کا نام باقی نہ رہ جاوے۔ جب بیج پھوٹ کر تین اچھ کے قریب اوپٹے ہو جاویں اسوقت انھیں ہتگی کے ساتھ اکھاڑ کر باقاعدہ کیاریوں میں قطاروں پر لگاویں۔ کیاریوں میں کھاد مجموعہ پہلے ہی دیدنی چاہیئے۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ تین تین فٹ کافی ہے اور پودے دو دو فٹ کی دوری لگائے جاویں۔ جب وہ بڑھیں تو درختوں کی شاخوں کی ٹیکیں دیدیں یا خوبصورت بانس کی جھڑیوں پر بیلیں چڑھا دیں۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ جب تک بینگن لگنے شروع نہو جاویں تب تک خشک موسم میں دوسرے تیسرے پانی دیں مگر تھوڑا۔ جب بینگن لگنے لگیں تو حسب ضرورت اچھی طرح سے پانی دینا شروع کر دیں۔ آٹھویں دہائی پودوں کی جڑوں میں ریت کھاد کا دیدنا نہایت مفید ثابت ہو گا (ریت کھاد کی تشریح باب اول میں کھادوں کے ضمن میں لکھی گئی ہے)۔ بینگن کم اترنے کا اصل باعث یہ ہوتا ہے کہ بینگن لگنے سے پہلے پودوں کو پانی زیادہ دیدیا جاتا ہے۔ بیج بونے کے دن سے تین چار مہینہ میں بینگن اترنے لگ جاتے ہیں۔ بینگنوں کو ہاتھ سے توڑنا نہیں چاہیئے۔ تینچی سے کاٹ لینا چاہیئے۔ ورنہ نرم کونپلوں کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جعفری پر جب بیلیں بہت گنجان ہو جاویں تو کمزور



شاخوں کو مقراض سے کاٹ دینا چاہیئے تاکہ بار بار ہلکا ہو جاوے اور پودوں کو ہوا اور روشنی اچھی طرح سے مل سکے۔  
 بڑی بڑی شاخوں پر فضول کلمے پھوٹ آتے ہیں انھیں فی الفور دور کر دینا چاہیئے ورنہ وہ پودوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔  
 عام کیفیت ولایتی بینگنوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں ہر ایک کو جدا جدا کیاریوں میں بونا چاہیئے۔ اگر ایک مرتبہ ہر ایک قسم کے تازہ ولایتی بیج منگوا کر بو دیئے جاویں اور انکی فصلوں سے عمدہ بیج حاصل کر کے احتیاط سے رکھ چھوڑیں تو کئی برسوں تک یکے بعد دیگرے فصلوں کے بیجوں سے عمدہ فصلیں پیدا ہو سکتی ہیں اور ہر سال تازہ بیجوں کے منگوانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

## ہاتھی چک (عنجنہ دار)

(Synara Scolymus)

(Artichoke Globe)

انگریزی بالاطینی نام  
 آر لی ٹوچ (گلوب)

ہندوستانی نام  
 ہاتھی چک - کنجور

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے آخر مئی تک

وسط اگست سے اخیر اکتوبر تک

بیان و استعمال

اس کے عنجنے بطور ترکاری استعمال کیئے جاتے ہیں ان کا آچار



بھی پڑ سکتا ہے +

طریق کاشت اسکے بونے کے لئے ایسا قطعہ ارضی منتخب کرنا چاہیئے  
جہاں فالتو پانی بارش کا ذرا نہ بھٹیر سکے۔ سطح خوب ڈھلوان ہو  
بالعموم اسے تخم سے بولتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات پودوں کے نئے  
توتوں سے بھی کاشت کرتے ہیں۔ پہلے بیجوں کو چھڑکواں ہو کر کسی  
کیاری میں پنیری لگا لیں بعد ازاں جب پودے دو تین ابتدائی پتیاں  
بدل لیں تو انھیں اکھاڑ اکھاڑ کر کیاریوں کی قطاروں پر جن کا فاصلہ  
ایک دوسرے سے چار چار فٹ ہو اتنے ہی فرق سے لگاویں۔ بونے کے  
پہلے کیاریوں میں کھاد مجموعہ خوب طرح سے ڈال کر سٹی کو اچھی طرح سے  
آئیز کر دیں۔ اگر زیادہ کھاد نہ مل سکے تو کم از کم اسجگہ ہو خوب ڈالیں جہاں  
جہاں پود لگانی ہے۔ سوراخ نکال کر پہلے کھاد اور مٹی ایک جان کر  
دیں پھر پنیری بویں آٹھویں ساتویں نکالی کرتے رہیں اور جب موسم  
خشک ہو تو دسویں بارھویں پانی دیتے رہیں۔ پنیری کو پانی فوارہ سے دینا  
چاہیئے۔ جب اسے باقاعدہ قطاروں پر بویں اسوقت فوارہ سے پانی  
دینے کی کچھ ضرورت نہیں +

جب پودے قریب ڈیڑھ فٹ اونچے ہو جاویں تو انکی جڑوں میں تھوڑا  
تھوڑا شورہ ڈال دینا چاہیئے۔ شورہ کے ڈالنے سے پودے خوب نشوونما ہوتا  
ہے اور ہاتھی چک بھی نہایت لذیذ پیدا ہوتے ہیں +  
عام کیفیت۔ گو اس ہاتھی چک کی قسمیں تخم فروشوں کی فہرستوں میں بہت



ہیں مگر ان میں تفاوت بظاہر کم نظر آتا ہے۔ پچاس گز لمبی قطار کے  
لیٹے ڈیڑھ اونس تکم کافی ہیں۔ اگر عمدہ بیجوں سے ایک مرتبہ فصل ہو کر  
اُسکے بیج احتیاط سے رکھ چھوڑیں تو دوسری فصل کے لیٹے نئے بیج کسی سے  
سنگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کئی سال تک متواتر ایک فصل کے  
بیجوں سے دوسری فصل ہو سکتے ہیں۔ اگر زمین دوسرے سال تبدیل کر دیا  
نہیں تو بہت بہتر ہے۔

## ماٹھی چک (گانٹھ دار) فرنگی گوگی

(Helianthus Tuberosus)

(Artichoke Jerusalem)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

آر ٹی چوک۔ جیوروسلم

ماٹھی رنج۔ ماٹھی چک رگانٹھ دار

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط فروری سے وسط اپریل تک

شروع پرج سے آخر سہی تک

بیان و استعمال

مکی ترکاری بنتی ہے۔ آلو کی طرح زمین کے نیچے اس کی گانٹھیں بہت کثرت سے  
پیدا ہو جاتی ہیں انکو نکال کر ترکاری بناتے ہیں اہل یورپ اسے کئی طرح  
سے استعمال کرتے ہیں +



عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اہل ہند ہاتھی چک کو سیٹھی اور بد مزہ  
 ترکاری سمجھ کر بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں اسکی اصل وجہ یہ ہے کہ  
 اسوقت ہمارے بازاروں میں جس قسم کے ہاتھی چک ملتے ہیں یا باغیچوں  
 میں جیسے بوٹے جاتے ہیں وہ درحقیقت چھونے کے قابل بھی نہیں  
 ہوتے اگر معزز کارخانوں سے ایک مرتبہ دونوں قسم کے ہاتھی چک کے  
 بیج یا گانٹھیں خرید کر ٹھیک طور پر کاشت کر دی جاوے تو خود بخود  
 معلوم ہو جاوے گا کہ یہ ترکاری کیسی خوش ذائقہ ہے۔ گانٹھ دار ہاتھی چک  
 کی گانٹھیں اگر احتیاط سے بیج کے لئے رکھی جاویں تو ہر سال نئی گانٹھیں  
 تخم فروشوں سے خریدنے کی ہرگز ضرورت باقی نہیں رہتی۔ سالہا سال  
 تک اس ترکاری کی حیثیت میں فرق نہیں آتا +

طریق کاشت۔ اسکی گانٹھیں یا ٹونٹے بوٹے جاتے ہیں۔ کیاریوں میں قطاریں  
 بنانی چاہئیں جو ایک دوسرے سے ڈھائی ڈھائی فٹ متوازی ہوں گانٹھیں  
 یا ٹونٹے ایک ایک فٹ کے فاصلہ سے بوویں۔ جب پودے ایک ایک  
 فٹ اونچے ہو جاویں تب انکی جڑوں میں پودوں کی تقویت کے لئے  
 مٹی چڑھا دینی چاہئے تاکہ وہ بہت جھک نہ جاویں۔ شروع میں دسویں  
 بارھویں نلانی کرتے رہیں اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک  
 مرتبہ پانی دینا ضروری ہے +

عام کیفیت۔ ہاتھی چک زمین سے کھود کر بہتر ہے کہ خشک ریت  
 میں داب رکھیں اور حسب ضرورت استعمال میں لاویں یا فروخت کر دیں۔



اس طرح سے وہ بگڑتے نہیں۔ بعض باغیچوں میں کیاریوں کے اندر ہی رہنے دیتے ہیں۔ حسب ضرورت نکال لیتے ہیں۔ زمین کے اندر دیمک اور کیڑے مکوڑے بھی گانٹھوں پر حملہ کرتے ہیں اُن سے بہر حال خبردار رہنا چاہیئے :

## مارچوبا

(*Asparagus officinalis*)

*Asparagus*

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

مارچوبا

ایس۔ پیرے گس۔

موسم کاشت

(بہاروں میں)

(سیدانوں میں)

اخیر فروری سے اخیر مئی تک

شروع ستمبر سے اخیر نومبر تک

شروع فروری سے اخیر اگست تک

بیان و استعمال

اہل یورپ اس ترکاری کے نہایت شائق ہوتے ہیں چنانچہ فرانس میں بدرجہ غایت غور و پروخت سے اسکی کاشت کیجاتی ہے۔ ہزاروں آدمیوں کی صرف اسی کی کاشت پر بسر اوقات ہوتی ہے۔ بنگال میں بھی اسے بہت استعمال کرتے ہیں۔ ایک تجربہ کار صاحب کی رائے ہے کہ چھ برس سے پہلے یہ درجہ کمالیت کو نہیں پہنچتی۔ بعضوں کی رائے ہے کہ ہندوستان میں یہ



ترکاری کہیں ویں عمدہ نظر نہیں آتی جیسی کہ یورپ میں دیکھی جاتی ہے۔ مگر  
 اس میں شبہ نہیں ہے کہ اگر توجہ کے ساتھ اسکی کاشت کی جاوے  
 تو ہمارے پہاڑوں اور میدانوں میں یہ کمایت کو پہنچ سکتی ہے ۔  
 اسکی کاشت کے لیے زمین ہلکی۔ طاقتور۔ اور ایسی انتخاب کرنی چاہیئے  
 جس میں اعتدال کے مطابق ریت کا بھی جزو ہو۔ پہلے کسی کیاری میں  
 تخم چھڑکواں بو کر پنیری لگا لیں۔ جب بیج پھوٹ نکلیں اور پودے قریب  
 ایک فٹ کے اونچے ہو جاویں تو اچھے اچھے پودے اکھاڑ اکھاڑ کر کیاریوں  
 میں لگاویں۔ جن کیاریوں میں یہ ترکاری ہونی ہو اول اسکی جوتائی قریب  
 ۲ فٹ گہری ہونی چاہیئے۔ پھر تمام سطح پر خوب کھاد مجموعہ ڈالکر مٹی کے  
 ساتھ پھاوڑہ سے آمیز کراویں۔ ایک یا دو ہفتہ تک کیاریوں کو اسی حالت  
 میں چھوڑ دیں تاکہ مٹی اور کھاد ایک جان ہو جاوے۔ ہر ایک کیاری کا  
 عرض ۵ فٹ ہونا چاہیئے اور طول جسقدر چاہیں۔ ان کیاریوں میں قطاریں  
 بنانی چاہئیں جنکا باہمی فاصلہ قریب پندرہ انچہ کے رہے۔ ہر ایک پودے کا  
 فاصلہ آپس میں ایک ایک فٹ ہونا چاہیئے۔ جب پنیری ان قطاروں میں  
 لگائی جاوے تو یہ خیال رہے کہ جڑیں نہ کٹنے پاویں۔ سوراخ چوڑے کھودے  
 جاویں تاکہ جڑیں آسانی سے داخل ہو سکیں۔ ان پودوں کو لگاتے وقت  
 پرانی کھاد مجموعہ تھوڑی تھوڑی جڑوں میں ضرور ڈال دینی چاہیئے۔  
 پنیری اکھاڑتے وقت پوری احتیاط رکھیں کہ جڑیں زخمی نہونے پاویں۔  
 پودوں کے تنبیہ میں فرق آجاوے گا۔ جب پنیری سوراخوں میں لگانے



لگیں تو جڑوں کو چاروں طرف خوب طرح سے پھیلا دیں اور اوپر تین انچہ کھا آمیز مٹی ڈالیں پنیری لگانے کے بعد فی الفور ہلکا پانی دیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دینا چاہیئے۔ دو سال تک پودوں کو چھیڑنا نہیں چاہیئے۔ جسقدر اُن میں نئی شاخیں نکلیں نکلتے دیں کیونکہ اسکے معنی یہ ہیں کہ اندر بھی جڑیں طاقتور ہو رہی ہیں۔ ہر سال جڑوں کے ارد گرد مٹی باہستگی گوڑ کر کیقدر نمک اور خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ دیدنی چاہیئے۔ ایفر دسمبر یا ماہ جنوری میں یہ عمل کرنا بہت سفید ہے۔ بعد ازاں حسب ضرورت پانی دیتے رہیں۔ اگر زمین عمدہ اور پودوں کے مزاج کے موافق ہوگی اور ساتھ ہی اُنکی پوری طرح سے غور و پروا رکھی جاوے گی تو چھ سات سال تک خاطر خواہ فصل حاصل ہو سکتی ہے۔ بہاروں میں صرف یہ عمل اور زیادہ کرنا چاہیئے کہ پنیری کو ایک سال تک نہ اُکھاڑیں یعنی جس کیاری میں بیج بوئے گئے تھے اُسی میں ایک سال تک رہنے دیں۔ دوسرے سال موسم بہار میں جبکہ کوہر اور پالے کا خطرہ دور ہو جاوے اُسے اُکھاڑ اُکھاڑ کر کھلی کیاریوں میں لگا دیں۔

ایک تجربہ کار صاحب مارچوے کی کاشت کی نسبت اپنا سالہا سال کا تجربہ یوں بیان فرماتے ہیں :-

اگر مارچوے کے بیج اگست کے اخیر ہفتہ میں بوئے جاویں تو وہ دو ہفتوں کے اندر اُگ آتے ہیں۔ انہیں شروع اکتوبر تک بالکل چھیڑنا



نہیں چاہیئے البتہ انہیں فوارہ سے آہستگی کے ساتھ پانی دیتے رہیں اور  
 سخت بارش سے بچاویں۔ پنیری اگر بڑی بڑی ناندوں کھلے ہوئے صندوق  
 یا چوڑے چوڑے گملوں میں بوئی جاوے تو بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بارش  
 کے وقت سہولیت کے ساتھ انہیں اٹھا کر سایہ میں رکھ سکتے ہیں۔  
 بعض اصحاب کو یہ خیال ہے کہ مار چوبے (اس پے رے گس) اور  
 (سلیری) کی کاشت یکساں طریق پر ہوتی ہے مگر یہ خیال صحیح نہیں ہے  
 ان دونوں کا طریق کاشت بالکل مختلف ہے۔ جس کیاری میں پنیری بوئی  
 ہو اس میں دو دو فٹ کے چوگرد فاصلہ پر گرھے کھودنے چاہئیں جنکا  
 قطر ایک فٹ اور گہرائی دو فٹ ہو۔ کھدی ہوئی مٹی کا کسی گوشہ میں  
 ڈھیر لگوا دیں کیونکہ اس سے رفتہ رفتہ کام لینا ہے۔ بعد ازاں خوب بوسیدہ  
 گوبر کی کھاد اور پتوں کی کھاد کو ہموار کر اس میں ایک حصہ کھدی ہوئی  
 مٹی کو ملا دیں۔ پھر اسی شورہ ملانا چاہیئے۔ اس انداز سے کہ ایک من کھاد  
 میں پانچ سیر شورہ پڑ جاوے۔ اس مرکب سے تمام گرھے جن میں مار چوبا  
 لگانا منظور ہے آدھے آدھے بھر دیں۔ اب ان گرھوں میں ایک ایک پنیری  
 کا پودا لگادیں مگر جڑوں کو اچھی طرح سے پھیلا دیں تاکہ وہ سُکڑی ہستی  
 نہ رہیں۔ نیز پنیری لگاتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیئے کہ جڑیں مخرج  
 نہ ہو جاویں۔ پنیری لگاتے ہی ہلکا سا پانی دیدیجئے اور ایک دن انہیں  
 بالکل ماتھ نہ لگائیے اور نہ پانی دیکھیئے۔ بعد ازاں روز مرہ دن میں ایک  
 مرتبہ ہلکا سا پانی دیدینا چاہیئے۔ اس طرح سے پودے خوب نشوونما ہونے لگیں گے



جوں جوں پودے بڑھتے جاویں وہی شورہ آمیز مرکب کھاد جسکا اوپر بیان  
ہوا ہے تھوڑی تھوڑی جرّوں میں چھوڑتے جاویں یہاں تک کہ گڑھے  
بھر کر کیاریوں کے سطح کے برابر ہو جاویں۔ جب گڑھے سطح کے ہموار ہو  
جاویں تو اور زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ سوائے اسکے کہ جب  
موسم خشک ہو تو پانچویں چھٹے پانی دلوادیا جاوے۔ ایک سال بعد شروع  
موسم بہار میں پودے پھولینگے اور موسم برسات میں نہایت عمدہ نئے  
کلمے نکلیں گے جنھیں کاٹ کر بطور ترکاری استعمال کر سکتے ہیں۔ شمالی ہند  
میں بالعموم موسم سرما میں پودے مڑھبا جاتے ہیں اس لئے انکی جانب  
سے بالکل بے خبر نہیں ہو جانا چاہیئے۔ شروع دسمبر میں تھانولے سے کھود کر  
وہی مرکب کھاد جسکا اوپر بیان ہوا ہے تھوڑی تھوڑی پودوں کی جرّوں  
میں دینی چاہیئے۔ نیز روز مرہ یا دوسرے دن ہلکا پانی بھی دینا واجب ہے۔  
تھوڑے ہی عرصہ میں نئے کلمے پھوٹ آویں گے اور تمام پودے سرسبز  
و شاداب ہو جاویں گے۔ اس ترکیب سے سالہا سال تک آپ ان پودوں کو  
محفوظ رکھ کر اسے تازہ اور لذیذ ترکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ بڑی بات  
مارچو بے کی کاشت میں یہ ہے کہ موسم سرما میں جبکہ پودے نوم کی حالت میں  
ہوتے ہیں ان کی جانب سے بخبر نہو جاویں۔ جاڑوں میں مارچو بے کی کیاریاں  
کو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا ضروری ہے اور برسات میں انکو چھڑینا  
نہیں چاہیئے۔ جتنے بڑھیں بڑھنے دیں +

عام کیفیت۔ ۵۰ گز لمبی قطار کے لئے ۴ اونس تخم کافی ہیں +



# باقلہ

(Faba Vulgaris)

(Bean Broad)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

برین براڈ

باقلہ

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع مارچ سے آخر مئی تک

وسط اکتوبر سے آخر نومبر تک

شروع مئی سے آخر جون تک

بیان و استعمال

بالعموم ترکاری بنائی جاتی ہے۔ انگریزی تخم فروشوں کی فرستوں میں اسکی بہت سی قسمیں بیج ہیں۔ ہندوستان میں جو باقلہ عام طور پر بویا جاتا ہے وہ ایک پرانی قسم کا ہے جو مدت سے یکساں چلا آتا ہے۔ اس کا رنگ سیاہی مائل سبز ہوتا ہے اور پھلی سیدھی مٹر کی پھلی کے برابر ہوتی ہے جب یہ پک جاتا ہے تو اسکے بیج بڑے بڑے مٹر کے دانوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ باقلہ کی پھلیاں جب تک کچی اور نرم رہتی ہیں اسی وقت تک انھیں استعمال کرتے ہیں بعد ازاں یہ ترکاری کے کام کی نہیں رہتیں \*  
طریق کاشت باقلہ ہر قسم کی زمین میں باسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر ایسی زمین جس میں اعتدال کے مطابق ریت کا جزو بھی ہو اسکے لیے



نہایت موڑوں ثابت ہو گی۔ پہلے بوسیدہ کھاد مجموعہ زمین کی سطح پر پھیلا  
 کر دو تین روز چھوڑ دیں۔ پھر بل چلا کر یا پھاوڑے سے ایسا درست  
 کریں کہ مٹی اور کھاد ایک جان ہو جاوے۔ یا تو باقلہ قطاروں پر بونا چارے  
 یا گڑھوں میں اگر قطاروں پر بونا ہو تو ہر ایک قطار کا باہمی تین تین  
 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیئے اور ہر ایک قطار دو دو فٹ چوڑی اور تین تین  
 انچ گہری ہو اور اگر گڑھوں میں بیج بونے ہوں تو ہر ایک گڑھے کا  
 باہمی فاصلہ چاروں طرف سے پانچ پانچ فٹ رہنا چاہیئے۔ ان گڑھوں کا قطر  
 ڈھائی فٹ ہو اور گہرائی ڈیڑھ فٹ۔ کھدی ہوئی مٹی کو خوب باریک کر کے  
 اور بوسیدہ کھاد مجموعہ گڑھوں میں بھر دیں اور ہموار کر دیں۔ ان گڑھوں  
 میں انگلی سے دو قطاریں بنائیں جنکا آمنے سامنے کا فاصلہ ایک فٹ سے زیادہ  
 نہ ہو ان میں چار چار پانچ پانچ بیج بویں۔ جب وہ پھوٹ آویں تو اس طرح  
 سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا باہمی فاصلہ قریب چھ انچ کے رہے  
 بعض تجربہ کار اصحاب کی رائے ہے کہ بیج بونے سے پہلے گھنٹہ دو گھنٹہ  
 انھیں شیر گرم پانی میں بھگو دینا چاہیئے۔ مگر یہ امر ضروری نہیں ہے  
 اگر بیج بونے ہی کیاریوں کو پانی سے تر کر دیا جاوے تو وہ اور یہ ایک  
 ہی بات ہے۔ جب باقلے کے پودے قریب ۱۵ انچ کے بڑے ہو جاویں  
 تو انکے نیچے جڑوں میں کسی قدر مٹی چڑھا دینی چاہیئے تاکہ وہ زیادہ نہ جھک  
 جاویں۔ حسب ضرورت پانی دیتے رہیں اور دسویں بارھویں نلانی کر دینی چاہیئے  
 عام کیفیت۔ لنبی پھلیوں کے باقلہ کے بیٹے ہر سال نئے تخم خریدنے کی



ضرورت نہیں ہوتی۔ البتہ باقلہ کی بعض ولایتی اقسام ایسی ہیں کہ جنکے بیج اگریکے بعد دیگرے فصلوں سے بوئے جاویں تو بہت جلد اُن کی حیثیت میں فرق آ جاتا ہے اسلئے بہتر ہے کہ ہر دوسرے سال انکے نئے بیج منگوائے جایا کریں۔ لبنی پھلیوں کا باقلہ بہ نسبت چھوٹی پھلیوں کے باقلہ کے خوب پھیلتا ہے +

## سیم ولایتی

(Phaseolus Vulgaris)

(Bean. French or Kidney)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

بین۔ فرنچ یا کڈنی۔

ولایتی سیم۔ سیم

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اگست سے وسط اکتوبر تک شروع اپریل سے وسط جون تک

بیان و استعمال

اسکی ترکاری بہت اچھی بنتی ہے +

طریق کاشت اسے کھیتوں میں بونا ٹھیک نہیں ہے بہتر ہے کہ اسے باغیچوں میں جنکے گرد چار دیواری ہو بویا جاوے یا جہاں ارد گرد بڑے بڑے درختوں کا سایہ ہو۔ لیکن بالکل سایہ کے اندر بھی بونا نہیں چاہیئے



در اصل مراد یہ ہے کہ احاطہ ہو اور کسی قدر سایہ رہے۔ زمین ایسی ڈھلوان ہو کہ جہاں دیر تک بارش کا فالتو پانی نہ ٹھیر سکے۔ کیاریوں میں ایک انچہ گہری قطاریں بنا کر جنکا باہمی فاصلہ قریب ۱۰-۱۵ انچہ کے ہو بیج تین تین انچہ کے فاصلہ سے بو دیئے جاویں۔ اگر برسات کے پہلے تخم بونے ہوں تو اونچی قطاروں پر بو دیں اور اگر اکتوبر میں بونے نہ نظر ہوں تو کیاریوں میں ایک ایک انچہ گہری قطاروں میں بو دیں۔ قطاروں میں پہلے سے خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ دیدنی چاہیئے۔ آٹھویں دسویں ملائی کرا دیا کریں۔ اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دینا واجب ہے۔ اگر اسے پنیری کے ذریعہ لگانا منظور ہو تو مٹی سمیت جڑیں اکھاڑنی چاہیں اور مٹی سمیت دوسری جگہ لگانی چاہئیں +

عام کیفیت۔ چونکہ موسم سرما میں یہ ترکاری لذیذ ہوتی ہے اسلئے اسے زیادہ کاشت کرنا چاہیئے۔ ہر گز لمبی قطار کے لیئے ڈیڑھ کوارٹ تخم کافی ہیں پھاڑوں میں یہ سیم میدانوں کی نسبت بدجما عہہ ہوتی ہے۔ تخم فروش سوداگروں کی فرستوں میں اس کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ سب کو تھوڑا تھوڑا بونا چاہیئے +



سیم

(Phaseolus Multiflorus)

(Bean. Scarlet Runner)

ہندوستانی نام انگریزی یا لاطینی نام

بین - سکارلٹ - رنر

سیم -

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اگست سے وسط اکتوبر تک شروع اپریل سے آخر جون تک

بیان و استعمال

نہایت عمدہ ترکاری بنتی ہے +

طریق کاشت قریب قریب وہی ہے جو ولایتی سیم کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے اس کے لئے زمین بھی ویسی ہی منتخب کرنی چاہیئے۔ مگر بجاک قطاروں میں بونے کے انھیں ایک اچھے گہری قطاروں میں اکری۔ یا دوسری طرز پر بونا چاہیئے اور پنج میں خشک درختوں کی شاخیں خوبصورتی سے گاڑنی چاہئیں تاکہ مٹر کی طرح بیلیں اُپر چڑھ سکیں۔ دوسری طرز یہ ہے کہ پنج میں خشک شاخیں ہوں۔ اور ادھر ادھر پنج بوئے جاویں تاکہ دونوں طرف سے بیلیں شاخوں پر چڑھ جاویں +

اس سیم کی نسبت ایک تجربہ کار صاحب یوں رٹمطراز ہیں :-

”میدانوں میں یہ بہت ہی کم پھولتی اور پھلتی ہے مگر پہاڑوں میں بالخصوص



کوہ ہمالیہ میں یہ خوب پھلیاں دیتی ہے جب پھلیاں ختم ہو جاویں تو اس  
 جڑ کو نکال کر ریت میں داب رکھیں دوسرے سال اسے لگاویں۔ بہ نسبت  
 پیپیری کے یہ اس طرح بہت جلد بڑھتی ہے اور اپنے موسم سے ایک مہینہ پہلے پھلیاں  
 دینے لگتی ہیں۔ میدانوں میں اسے بونے کا بہترین طریق یہ ہے کہ اسکی  
 بیلین نہ چلنے دیں۔ صرف اسے جھاڑی کی صورت میں ڈھال دیں۔ یہ اس  
 طرح سے کر سکتے ہیں کہ جسوقت بیلوں میں نئی شاخیں نکلیں انھیں نوج  
 دیں۔ دو چار مرتبہ یہ عمل دوہرانے سے پودے جھاڑ دار ہو جاویں گے اگر یہ  
 طریق اختیار کرنا ہو تو طریق کاشت یہ ہے کہ کیاریوں کو درست کر کے تین  
 تین انچہ کے فاصلہ پر قطاریں بنادیں۔ ان قطاروں پر بارہ بارہ انچہ کے  
 فاصلہ پر ایک ایک بیج دو دو انچہ کی گہرائی پر بوتے چلے جاویں۔ اگر  
 بیلین رکھنی منظور ہوں تو جب پودے کچھ بڑے ہو جاویں تو انھیں  
 جھریوں پر چڑھا دیں یا درختوں کی خشک شاخوں کی ٹکیوں سے دیں مگر  
 اس حالت میں قطاروں پر بیج تین تین انچہ کی دوری پر بونے چاہئیں۔  
 پانی حسب ضرورت ہلکا دینا چاہیے۔ زیادہ پانی کی اسے برداشت نہیں ہوتی +  
 عام کیفیت۔ اس سیم کی بہت سی قسمیں ہیں مگر یہ قسم (مُراد سکارلٹ رن)  
 لذیذ شمار کیجاتی ہے۔ اسکے بونے کے لئے زیادہ جگہ درکار نہیں ہوتی۔ تھوٹی  
 سی جگہ میں بہت سی ترکاری پیدا ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں میں بھی یہ بہت  
 آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ پچاس گز لمبی قطار کے لئے ڈیڑھ پنٹ تخم کافی ہیں



# چقندر

(Beta Vulgaris)

(Beet)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

چقندر

بیٹ

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پانچ سے دسمبر تک

وسط اگست سے اخیر اکتوبر تک

ماہ دسمبر

## بیان و استعمال

بالعموم ترکاری بنائی جاتی ہے۔ انگریزوں کو اس کی ترکاری زیادہ مرغوب ہے ولایت میں چقندر سے شکر بنائی جاتی ہے اس لئے وہاں بکثرت کاشت کی جاتی ہے +

طریق کاشت پہلے کیاریوں کو خوب گہرا کھود کر یاہل چلا کر سطح ہموار کرو پھر کھاد مجموعہ ڈال کر دو تین دن زمین کو پٹری رہنے دو۔ بعد ازاں اس طرح سے کیاریوں کو درست کرو کہ کھاد اور مٹی بالکل آمیز ہو جاوے اسکے بعد سطح کو ہموار کر کے ۱۵ و ۱۵ انچہ کے فاصلہ پر آٹنے سامنے قطاریں بناؤ۔ ان قطاروں پر ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر بیج بو دو جب پودے اُگ آویں اور دو انچہ اونچے ہو جاویں تو کمزور اور ناقص نکال کر پھینک دو اور تناور پودے رہنے دو۔ اس طرح پر کہ ہر ایک پودے کا فاصلہ آپس میں



تین انچہ سے کم نہ ہو۔ دو تین ہفتہ بعد دو بارہ اسطرح سے چھانٹ دو کہ ہر ایک پودے کا باہمی ٹھانڈہ گیارہ انچہ سے کم نہ رہے۔ جو پودے چھانٹ جاویں انھیں دوسری جگہ جہاں ضرورت ہو لگا سکتے ہیں۔ اگر زمین اور موسم مرطوب ہو تو فی الفور پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر موسم خشک ہو تو بیج بوتے ہی زمین کو تر کر دینا چاہئے مگر اس طرح نہیں کہ بیج بہ جاویں یا عریاں ہو جاویں۔ آٹھویں دسویں نلایں کرتے رہیں۔ اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دینا واجب ہے۔ مگر برسات کے بعد چھندر بوئی جائے تو بہتر ہے کہ بیج ایک ایک انچہ گہری قطاروں میں بو دیں۔ اگر برسات کے درمیان بوئی منظور ہو تو اونچی اونچی قطاروں پر بونا مناسب ہے تاکہ پانی سے زیادہ گزند نہ پہنچے۔

ایک تجربہ کار صاحب کی رائے ہے کہ جب چھندر کسی قدر موٹی ہو جاوے تو اُسکی جڑوں میں تھوڑا تھوڑا پسا ہوا نمک چھوڑنا نہایت مفید ہے۔ گو اس عمل میں کسی قدر زائد صرف ہوتا ہے مگر فصل کی پیداوار سے ساری کسر نکل جاتی ہے +

عام کیفیت یہ ترکاری لذیذ ہوتی ہے بشرطیکہ ترکیب سے بنائی جاوے۔ اطباء اسے مصفی اور مولد خون بتاتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی یہ آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ ۵۰ گز لمبی قطار کے لئے ڈھائی اونس تخم کافی ہیں حال کے نقشہ جات تجارت کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ ہندوستان میں ہر سال ڈیڑھ لاکھ ٹن (بیالیس لاکھ من) صرف چھندر کی شکر ممالک غیر



سے آکر یہاں فروخت ہوتی ہے۔ یہ شکر زیادہ تر جزائر مارشس سے آتی ہے۔ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسوقت ہندوستان کی آبادی ۳۰۰ ملین (ایک ملین دس لاکھ کا ہوتا ہے) ہے۔ اور سالانہ شکر کی پیداوار صرف ۳ ملین ٹن ہے (ایک ٹن ۲۸ من کا ہوتا ہے) اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس ملک میں شکر کی پیداوار کو ترقی دینے کی کس قدر گنجائش ہے۔ ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب ایم۔ ڈی سابق کنسرویٹر محکمہ جنگلات پنجاب اپنی کتاب موسومہ ”پنجاب پلینٹس“ مطبوعہ ۱۹۴۹ء کے صفحہ ۱۷۷ پر اس طرح سے تحریر فرماتے ہیں کہ ”یہ امر قابل تذکرہ ہے کہ کئی سال ہوئے مہاراجہ صاحب والی جموں و کشمیر نے ایک یورپین کاریگر کو کشمیر میں آکر چقندر بونے اور اُس سے شکر نکالنے کے لیے بلایا تھا مگر پھر کچھ نتیجہ نہیں نکلا۔“

ایک تجربہ کار صاحب لکھتے ہیں کہ چقندر کے ولایتی بیج اگر بوئے جاویں تو اُسے چقندر تو نہایت عمدہ پیدا ہوتی ہے۔ مگر بالعموم اسیں بیج نہیں پڑتے جن سے دوسری فصل بوئی جاسکے۔ لیکن سہارنپور کے سرکاری باغ سے چقندر کے ایسے بیج دستیاب ہو سکتے ہیں جو دراصل خاص ترکیب سے اُن چقندروں سے حاصل کیئے گئے ہیں جنہیں ولایتی بیجوں سے بویا گیا تھا۔ ان بیجوں سے جو چقندریں بوئی جاوینگی اُن میں بیج ضرور پڑینگے جن سے دوسری فصل بہ آسانی تمام ہو سکتی ہے ولایتی چقندروں کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب قابل تعریف ہیں :



# بند گوہی

(*Brassica Oleracea, var capitata.*)

ہندوستانی نام (Cabbage) انگریزی یا لاطینی نام

کے - بیج -

بند گوہی - کرم گلہ - بند -

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اگست سے اخیر اکتوبر تک      اخیر فروری سے اخیر مئی تک

## بیان و استعمال

بالعموم ترکاری بنائی جاتی ہے۔ انگریزوں میں بھی اسکا استعمال زیادہ ہے۔  
طریق کاشت پہلے اسکی پنیری لگانا مناسب ہے جس کیاری میں پنیری  
لگانی ہو اسے خوب درست کر کے اور کھاد مجموعہ دیکر طیار کر لینا چاہیے۔ موسم  
شروع ہوتے ہی گلوں یا ناندوں میں تخم چھڑکواں بو دیں۔ اگر موسم سرد ہو تو  
فی الفور پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اچھے ٹین کے فوارے سے پانی  
دیں تاکہ زمین نمدا رہو جاوے پودے پھوٹ آنے پر جب تک وہ تناور  
نہ ہو جاویں تب تک دوپہر کے وقت انھیں سایہ دینا چاہیے مگر اتنا بھی زیادہ  
سایہ نہ دیں کہ پودوں کو ہوا اور روشنی نہ مل سکے ورنہ وہ کمزور اور ناقص  
پیدا ہونگے جب یہ پودے چار پانچ انچہ اونچے ہو جاویں تب انھیں باقاعدہ  
کیاریوں میں بو دیں۔

جن کیاریوں میں پنیری لگانی ہو انہیں پانچ چھ ہفتہ پہلے سے خوب



کھاو مجموعہ دیکر اور مٹی اور کھاو کو ایک جان کر کے سطح کو ہموار کر رکھیں  
 پیسری لگانے سے ہفتہ دو ہفتہ پہلے کیاریوں میں تین انچ گہری  
 قطاریں بنادیں جن کا باہمی فاصلہ قریب ۱۸ انچ کے ہو قطاریں  
 قریب ۴-۱۲ انچ چوڑی ہونی چاہئیں۔ پودے لگا کر فی الفور پانی دیں۔ اور  
 اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ وار پانی دیتے رہیں۔ آٹھویں دسویں پودوں کی  
 جڑوں کے ارد گرد آہستہ آہستہ مٹی کو گوڑ دینا چاہئے تاکہ زمین سخت نہ رہے  
 اور پانی کو اچھی طرح سے جذب کر سکے۔ جوں جوں پودے تناور ہوتے جاویں  
 جڑوں پر کسی قدر مٹی چڑھاتے جاویں اس طرح پودوں کو بہت تقویت ملتی  
 ہے۔ بعض کیڑے گوبھی پر حملہ آور ہوا کرتے ہیں۔ بہتر ہے کہ جسوقت وہ نظر  
 آویں آسیوت سے اُنکے وسیعہ کی فکر کی جائے۔

عام کیفیت۔ اس گوبھی کی بوڑپ میں قریب دو درجن کے مختلف قسمیں  
 ہونگی۔ یہ تمام اقسام یہاں بھی نہایت عمدگی کے ساتھ پیدا ہو سکتی ہیں پچاس  
 گز لمبی قطار کے لئے ۱۰ (نصف) اولس سٹم کافی ہیں۔  
 متواتر تجربہ سے ثابت ہو گیا ہے کہ بند گوبھی کو اگر ارڈ کی کھلی اور  
 شورہ کی کھاو دی جاوے تو پیداوار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر  
 ارڈ کی کھلی میں شورہ ملا کر بند گوبھی کی جڑوں میں دیں تو پیداوار  
 افراط سے ہوتی ہے۔



(ایک قسم کی بند گوبھی)

# کیل

(*Brassica Oleracea, var. Acephala Borecole or kale*)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کیل بور کول

ولایتی بند گوبھی

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

آخر فروری سے آخر مئی تک

شروع ستمبر سے آخر اکتوبر تک

بیان و استعمال

ترکاری بنتی ہے۔ اہل یورپ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ یہ بند گوبھی کی ایک عمدہ قسم ہے۔

طریق کاشت۔ درحقیقت یہ ترکاری میدانوں میں عمدہ نہیں پیدا ہو سکتی

کیونکہ یہ زیادہ سردی چاہتی ہے۔ باغیچوں میں اسے لگایا جاتا ہے اور یہ پیدا

ہو جاتی ہے۔ مگر اسمیں وہ لذت نہیں آتی جیسی کہ آنی چاہیئے اس لئے بہتر

ہے کہ اسکی زیادہ تر کاشت پہاڑوں پر کیجاوے۔ پہاڑوں میں یہ بہ آسانی

تمام خاطر خواہ ہو جاتی ہے۔ پہلے کسی کیاری میں بیج چھڑکواں بو کر پھیری لگا

لیں۔ جب پودے قریب چار انچ اونچے ہو جاویں تو انھیں کیاریوں میں باقاعدہ

قطاروں پر لگائیں۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ دو دو فٹ ہونا چاہیئے اور ہر ایک

پودے کا ایک دوسرے سے ہے اٹھارہ آٹھویں دسویں نلانی کرتے رہیں اور



جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا چاہیئے۔ پھیری گملوں  
 ناندوں یا گھلے صندوقوں میں لگائی چاہیئے تاکہ حسب ضرورت سایہ بھی دیکیں  
 عام کیفیت۔ پہاڑوں اور میدانوں میں بونے کا طریق یکساں ہے۔ ۵۰ گز  
 لمبی قطار کے لئے نصف اونس تخم کافی ہیں۔ اسی اندازہ کے مطابق حسب  
 ضرورت بیجوں کی مقدار کو گھٹا بڑھا لیں \*

## برسلز سپراؤلس (ولایتی گو بھی)

(*Brassica Oleracea, Var. Bullata Gemmifera*)  
 (Brussels Sprouts)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

برسلز سپراؤلس۔

ولایتی گو بھی۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

آخر فروری سے وسط مئی تک

شروع ستمبر سے آخر اکتوبر تک

بیان و استعمال

ترکاری بنائی جاتی ہے انگریز اسکے بہت شائق ہوتے ہیں \*  
 طریق کاشت اس گو بھی کا پودا لمبا ہوتا ہے اور معمولی بند گو بھی کی طرح  
 اس میں اوپر ایک سر ہوتا ہے اور تنہ پر چھوٹی چھوٹی گانٹھیں ہوتی ہیں۔ اسکے  
 بونے کا طریق یہ ہے کہ گملوں یا کیاریوں میں تخم چھڑکواں بون کر



پنیری لگالیں۔ جب پودے چار انچہ اوپٹے ہو جاویں تو انھیں اور کیاریوں میں قطاروں پر ہا قاعدہ لگادیں۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ متوازی دو دو فٹ ہونا چاہیئے اور ہر ایک پودے کا آپس میں پندرہ پندرہ انچہ۔ کیاریوں کو درست کر کے خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ ڈال کر مٹی اور کھاد کو ایک جان کر دینا چاہیئے۔ جب پودے اپنی نصف بلندی تک پہنچ جاویں تب ان کی جڑوں میں مٹی چڑھانی چاہیئے تاکہ وہ جھک نہ جاویں۔ نیچے کے خشک یا مہجائے ہوئے پتے ہمیشہ نوچتے رہیں کیونکہ یہ پودے پر فضول بار ہوتے ہیں۔ آٹھویں دسویں نلائی کرتے رہیں اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی ضرور دینا چاہیئے۔ عام کیفیت۔ پچاس گز لمبی قطار کے لیے ۱۰ نصف اونس تخم کافی ہیں۔

## گانٹھ گوبھی

(Brassica Oleracea Var Caulo-Rapa)  
(Knol Khol or Khol Rabi)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

نول۔ کھول۔ کھول۔ رابی۔

گانٹھ گوبھی۔

موسم کاشت

(بہاروں میں)

(میدانوں میں)

وسط اگست سے اخیر اکتوبر تک

اخیر فروری سے اخیر مئی تک

بیان و استعمال

جب تک اس گوبھی کی گانٹھیں اوسط درجہ کے شلجم کے برابر رہتی ہیں تب تک



اسکی اچھی ترکاری بن سکتی ہے۔ جب زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں اُس وقت  
 مویشیوں کے چارہ کے کام میں آتی ہیں۔ کیونکہ زیادہ سختی کی وجہ سے ترکاری  
 کے کام میں نہیں لائی جا سکتیں۔

**طریق کاشت**۔ طریق کاشت وہی ہے جو بند گوبھی کے ضمن میں بیان ہو  
 چکا ہے۔ پھیری کو قطاروں پر نو نو انچہ کے فاصلہ پر لگا دینا چاہیئے۔ قطاروں  
 کا باہمی فاصلہ پندرہ پندرہ انچہ کافی ہے۔

**عام کیفیت**۔ اگر اس ترکاری کی متواتر عرصہ تک ضرورت ہو تو ٹھنڈی  
 دو دو ہفتہ بعد کرنی چاہیئے۔ پہاڑوں میں بھی یہی عمل کرنا واجب ہے۔



# پھول گوہی

(*Brassica Oleracea, var. Botrytis Cauliflora*)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کالی فلاور۔

پھول گوہی۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

اگر دیسی بیج بونے ہوں تو وسط جون پہاڑوں میں صرف ولایتی بیج بونے سے اخیر اگست تک بوسکتے ہیں اگر چاہئیں۔ وجہ یہ ہے کہ سرد ممالک کے تازہ ولایتی بیج بونے ہوں تو وسط ستمبر تخم سرد پہاڑوں میں بہت عمدگی سے سے اخیر اکتوبر تک بوسکتے ہیں۔ اگتے ہیں۔ انھیں اخیر فروری سے خیر نوٹ۔ تازہ ولایتی بیج منگوا کر جو فصل اپریل تک بوسکتے ہیں۔

بولی جاوے اور اُس سے بیج حاصل کر کے موسم خزاں میں بھی پھول گوہی کے دوسری فصل بونے کے لئے رکھ چھوٹیں تو بیج پہاڑوں میں بولے جاسکتے ہیں۔ وہ بھی دیسی بیج شمار کیئے جاویں گے۔

بیان و استعمال

بہت لذیذ ترکاری بنتی ہے۔ اہل ہند پھول گوہی سے مختلف کھانے کی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ اکثر اسے خشک کر کے رکھ چھوڑتے ہیں اور موسم گرما میں استعمال کرتے ہیں۔ ولایتی گوہی کی بہت سی اقسام ہیں مگر دیسی پھول گوہی



کچھ کم قابل تعریف نہیں ہوتا بشرطیکہ انکی احتیاط سے کاشت کیجاوے +  
 طریق کاشت چونکہ گوبھی کی اقسام میں سے پھول گوبھی کی قسم بہت نازک  
 ہے اسلئے اسکی بہت غور و پرواہت سے کاشت کرنی چاہیئے ورنہ ناکامی ہوگی  
 مالیوں کی لاعلمی اور لا پرواہی کے سبب بہت سے پودوں میں بالکل پھول  
 نہیں آتا بعض کے پھول سیاہ پڑ کر بالکل ٹھٹھر جاتے ہیں کچھ پھول علیحدہ  
 علیحدہ شاخیں بنکر پھیل جاتے ہیں۔ بالخصوص تازہ ولایتی بیج جو اگست یا ستمبر  
 سے پہلے بوائے جاتے ہیں انکے پودوں میں شاذ و نادر ہی پھول آتا ہے  
 انھیں وسط ستمبر سے پہلے ہرگز نہیں بونا چاہیئے۔ اگست کے اخیر تک دسی  
 بیج بو سکتے ہیں اور انکے پودوں میں عمدہ پھول آویں گے اور اگر دسی بیجوں  
 کو وسط ستمبر یا اس کے بعد بویا جاویگا تو غالباً ناکامی ہوگی +

جو فصل برسات کے قبل یا شروع برسات میں بونی ہو اُسکی کیاریوں کی  
 سطح آس پاس کی سطح سے قریب ایک فٹ اونچی ہونی چاہیئے تاکہ برسات  
 کا پانی کیاریوں میں ٹھیرنے نہ پاوے اگر پانی ٹھیرے گا تو فصل سے ہاتھ دھو  
 لینا چاہیئے۔ جو فصل برسات بعد بونی جاوے اُسکی کیاریوں کی سطح کو زیادہ  
 اونچی کرنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ گوبھی کی کیاریوں میں خوب بوسیدہ پتی کی  
 کھاد دینی چاہیئے۔ زیادہ تیز اور طاقت ور کھاد نہ دیں۔۔ البتہ مٹی خود طاقتور  
 یعنی چاہیئے۔ کمزور اور ناقص زمین میں گوبھی کی فصل نہیں بونی چاہیئے۔ کھاد  
 کو مٹی کے ساتھ خوب طرح آمیز کر دینا چاہیئے تاکہ پودوں کو آسانی غذا ملتی رہے  
 پہلے کسی کیاری میں ختم ہو کر پھیری لگانی چاہیئے۔ اگر موسم خشک ہو تو فی الفور



ٹین کے فوارہ سے پانی دیں۔ اور اگر بارش جاری ہو تو پانی دینے کی کچھ ضرورت نہیں۔ جب زمین بہت تر اور نرم ہو اسوقت ستم ریزی نہیں کرنی چاہیئے۔ جب پنیری پھوٹ آوے تو اُسے تیز دھوپ سے بچانا چاہیئے۔ مگر صبح و شام کھلا رہنے دیں ورنہ پودے زرد اور کمزور پڑ جاویں گے۔ بعض تجربہ کاروں کی رائے ہے کہ جو فصل جون یا جولائی میں بوئی جاوے اُسے باقاعدہ کیاریوں میں لگانے سے پہلے ایک مرتبہ تبدیل مقام کرا دینا بہت مفید ہے۔ مثلاً جب پنیری چار انچہ کے قریب اُوپچی ہو جاوے تو اُسے دوسری کیاری میں دو دو انچہ کے فاصلہ پر قطاروں میں لگا دیں قطاروں کا فاصلہ تین انچہ کافی ہے۔ کچھ دنوں بعد یہاں سے پودے اکھاڑ اکھاڑ کر کیاریوں میں لگا دیں پہلے ان کیاریوں میں قطاریں بنا لینی چاہئیں۔ جن کا ایک دوسرے سے قریب ڈھائی ڈھائی فٹ کے فاصلہ ہو اور پودوں کا باہمی فاصلہ دو دو فٹ کافی ہے۔ دسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں۔ اور جڑوں کے پاس کی مٹی وقتاً فوقتاً گوڑتے رہیں تاکہ زمین سخت نہو جاوے۔ گوبھی پر کٹی قسم کے کیڑے حملہ آور ہوتے ہیں اس لیے جب یہ صوت نظر آوے تو اُسی وقت کندوں یا لکڑی کی راکھ سفوف ہلدی یا باریک پسا ہوا طوطیا پودوں پر چھڑکنا چاہیئے۔ یا فی نائل ایک انگریزی دوا بہت سے پانی میں ملا کر فوارہ سے چھڑکنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک چھہ فی نائل ایک بڑے گھڑے بھر پانی کے لیے کافی ہوگا جب پھول بندھ جاتے ہیں اُس وقت کیڑے مکوڑوں کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔



پھول گو بھی کی کاشت کو درجہ کمایت پر پہنچانے کے لئے ایک تجربہ کار صاحب مندرجہ ذیل ہدایات فرماتے ہیں :-

”پھول گو بھی کے تازہ ولایتی بیج معتبر سوداگران تخم سے منگوا کر شروع اکتوبر میں بونے چاہئیں۔ سب سے مقدم کام پنیری لگانے کا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے پنیری کیاریوں میں نہ لگاویں وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات بارش اور سردی گرمی کی کمی بیشی سے بیجوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ نیز پانی دینے میں وقت ہوتی ہے۔ پھول گو بھی کی پنیری کو اگر ذرہ زیادہ پانی دیدیا جاوے یا سطح زمین کو اعتدال کے مطابق تر نہ رکھا جاوے تو خرابی واقع ہوتی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ پنیری گملوں۔ نازوں یا کاٹھ کے کھلے ہوئے صندوقوں میں لگائی جاوے۔ اس حالت میں بارش کے وقت گملوں صندوقوں وغیرہ کو آسانی سے سایہ میں اٹھا کر رکھ سکتے ہیں۔ زیادہ سردی گرمی کے وقت انہیں اندر باہر کیا جاسکتا ہے اور پانی کو ٹھیک اندازہ کے موافق جب چاہیں دے سکتے ہیں۔

گملوں صندوقوں وغیرہ میں سب سے پہلے مرکب مٹی بھرنی چاہیئے یعنی ایک حصہ باغیچہ کی مٹی۔ ایک حصہ دریا کا موٹا ریت اور ایک حصہ بوسیدہ گوبر اور پتوں کی کھاد کو ملا کر بھر دیں اور دو چار روز گملوں میں رہنے دیں۔ بعد ازاں جس دن مطلع بالکل صاف ہو صبح کے وقت بیجوں کے پوندے کھول کر فی انفور بو دیں۔ بیج دہنے ہاتھ کی انگلیوں پر پھیلا کر انگوٹھے سے گملوں کی سطح پر چھڑکنا شروع کر دیں۔ مگر یہ احتیاط ہے



کہ بیج نہ تو بہت چھدرے ہوئے پڑیں اور نہ بہت گنے پڑیں۔۔۔  
 کیونکہ اگر بہت دور دور پنیری اُگے گی تو پودوں کے لیے بہت سے گملوں  
 صندوق وغیرہ کے علاوہ محنت اور وقت زیادہ صرف ہو گا۔ اگر پودے گنے  
 آگیاں گے تو وہ ضرور مریض اور کمزور ہو جاویں گے اور پنیری کے اُکھاڑتے وقت  
 دقت ہو گی۔ تخمیری کے چھ گھنٹہ بعد ٹین کے فوارے سے پانی دیں مگر  
 اس طرح پر کہ فوارے کی تھوٹھنی کو گملوں یا صندوقوں کے کنارے پر رکھ کر  
 آہستہ آہستہ جھکاویں تاکہ ذرہ ذرہ سا پانی نکل کر صندوقوں پر بہنے لگے  
 پھر فوارے کو ہاتھ لگی اٹھا کر گملے یا صندوق کے مقابلے کے کنارے پر رکھ دیں  
 اسی طرح چاروں طرف پھراویں تاکہ گملے یا صندوق کی تمام سطح مندار ہو جاوے  
 بعد ازاں ہر روز صرف ایک وقت صبح کو اسی طریق سے پنیری کو پانی  
 دیں۔ فوارے سے پنیری کو اوپر سے تر کرنا مضر ہے۔ اس سے ایک تو  
 پنیری کے سوت کی مانند باریک تے پانی کی بوچھاڑ کو برداشت نہیں  
 کر سکتے اس لیے جھک جاتے ہیں اور لوٹ جاتے ہیں دوسرے وہ بیج  
 جو ابھی پھوٹے نہیں ہوتے یا جو کسی قدر پھوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ  
 نمی کے سبب سڑ گل جاتے ہیں اور اُگی ہوئی پنیری بھی زیادہ تری  
 کے سبب زرد اور کمزور پڑ جاتی ہے۔ پنیری کو نہ زیادہ سایہ میں رکھنا  
 چاہیئے اور نہ دھوپ میں۔ زیادہ سایہ میں رکھا جاوے گا تو وہ مریض اور  
 ڈبلی پتلی رہے گی اور اگر زیادہ در دھوپ میں رکھا جاوے گا تو وہ کھلا  
 اور مرجھا جاوے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پنیری کے گملے بہت سویرے سایہ



سے نکال کر باہر دھوپ میں رکھ دیئے جاویں اور ۹ بجے سایہ میں کر دیئے جاویں۔ شام کے چار بجے پھر باہر رکھ دیئے جاویں اور چھ بجے پھر سایہ میں اٹھا کر دھر دیئے جاویں جب پنیری تین جوڑی یعنی ابتدائی چھ پتیاں بدل لے یا یوں کہئے کہ قریب چار۔ چار انچہ اونچی ہو جاوے تو اُسے گملوں صندوقوں وغیرہ سے اکھاڑ کر ایک کیاری میں چار چار انچہ کے چو گرد فاصلہ سے لگاویں۔ مُراد یہ ہے کہ ہر ایک پودے کا چاروں طرف سے فاصلہ چار چار انچہ رہے۔ اس کیاری کو جس میں پنیری لگائی جاوے پہلے سے خوب درست کر لینا چاہیئے یعنی اُس کی مٹی خوب باریک ہو جاوے اور ہلکی کھاد اچھی طرح سے آمیز کر دی جاوے۔ ہلکی کھاد سے کسب قدر بوسیدہ گوبر اور پتوں کی کھاد مُراد ہے۔ جب یہاں پودوں میں تین چار کامل پتے نکل آویں تو انہیں اکھاڑ اکھاڑ کر دوسری کیاری میں لگاویں جہیں پہلی کیاری کی نسبت گوبر اور پتوں کی کھاد کسی قدر زیادہ ہو۔ دوسری کیاری میں پودوں کا باہمی چو گرد فاصلہ آٹھ آٹھ انچہ ہو۔ بارہ سیرہ دن بعد انہیں اکھاڑ کر مستقل طور پر کیاریوں میں لگاویں۔ ان کیاریوں کی قطاروں کا باہمی فاصلہ ڈھائی ڈھائی فٹ اور ہر ایک پودے کا باہمی فرق دو دو فٹ کافی ہے۔ مگر ولایتی پھول گو بھی کی ایک قسم جسے دیکچر آئم جاینٹ (Veitoh's autumn giant) کہتے ہیں بہت بڑی ہوتی ہے۔ اسکے بونے کے لئے قطاروں کا آٹھ آٹھ فٹ کا فاصلہ تین تین فٹ ہونا چاہیئے۔ اور ہر ایک پودے کا باہمی فرق ڈھائی ڈھائی فٹ رہنا



مناسب ہے \*

جن کیاریوں میں مستقل طور پر پودے لگانے ہوں انہیں خوب  
درست کر لینا چاہیئے یعنی اچھی طرح سے بوسیدہ کھاد مجموعہ دیکر مٹی کو  
باریک کر دینا چاہیئے۔ جب قطاریں بنائیں تو کسی قدر اور کھاد انپر ڈالکر  
آمیز کر دیں۔ سطح زمین کی سب سے پہلے کھدائی بھی ڈھائی فٹ عمق سے  
کم نہیں ہونی چاہیئے۔ پودوں کو دو تین مرتبہ نقل مکان کرانے سے یہ  
قائدہ حاصل ہوگا کہ پتے بہت کم آویں گے اور پھول بہت بڑا ہوگا۔ بسا  
اوقات ابتداء میں گوبھی پر دو تین قسم کے موزی کیڑے کھڑے بھی حملہ  
کرتے ہیں اس لئے روزمرہ نگہداشت رکھنی چاہیئے۔ جب انکی موجودگی کا  
پتہ لگے مٹا دینیہ کی فکر کرنی چاہیئے ہاتھ سے اٹھوا کر بہت دور پھینکوا  
دیں اور پودوں پر اوپوں کی راکھ ہلکی ہلکی چھڑک دیں یا تنباکو کا پانی دیں یا  
ایک چھوٹا سا چمچہ بھر فی نائل (ایک انگریزی دوا) چار پانچ سیرسرو پانی  
میں گھول کر چھڑکیں جب پودوں میں پھول نکل آویں اور کچھ بڑے ہو جاویں  
تو آٹھویں دسویں رقیق کھاد انکی جڑوں میں دینی چاہیئے۔ صابون اور ریٹھوں  
کو سرو پانی میں گھول کر پودوں پر چھڑکنا مفید ہے۔ اس عمل سے پودوں  
کو رقیق کھاد بھی بلجادیگی۔ وہ کیڑے کھڑوں کے گزند سے بھی محفوظ رہیں گے۔  
فاصلہ درست رکھنے کے لئے عمدہ ترکیب یہ ہے کہ جقدر فاصلہ پودوں یا  
قطاروں کے مابین رکھنا منظور ہو اتنے انچہ یا اتنے فٹ کسی درخت کی شاخ  
یا لکڑی کو ناپ لیں اور اس لکڑی کو پودوں یا قطاروں کے درمیان رکھکر



کام کرتے چلے جاویں اس طرح سے ایک تو فاصلہ درست رہیگا۔ دوسرے برابر برابر پودوں کے لگنے سے کیاریوں کے تختے خوبصورت معلوم ہونگے اس قسم کی چھری کا استعمال سبز ترکاریوں کی کاشت کے لئے مفید ثابت ہوگا۔  
 عام کیفیت۔ ایک صاحب کی رائے ہے کہ تمام اقسام کی گوبھی و نیز دیگر اقسام کی سبزی ترکاری کی پنیری بونے کے وقت بہتر ہے کہ سوئے کے بھی کچھ بیج ساتھ بوندیے جاویں۔ ان کے بونے سے ہر قسم کے کیڑے مکوڑے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ سوئے کی تیز بو کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پرند بھی ان کیاریوں میں جھنپیں سوئے کے بیج ہوں نہیں اترتے کیونکہ انکے حق میں یہ سم کا اثر رکھتے ہیں۔ جب سویا ذرا بڑا ہو جاوے تو اسے اکھاڑ کر ساگ بنالیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قطاروں اور کیاریوں میں بھی تمام اقسام کی گوبھی کے ساتھ سویا تھوڑا تھوڑا بوندیا جاوے تو کچھ ہرج نہیں ہے۔ پودوں کے پاس اسکی بو سے مٹوئی کیڑے مکوڑے نہیں آنے پاویں گے۔ جب سویا بڑا ہو جاوے تو اسے اکھاڑ لیں۔ بہر حال اس امر کا اچھی طرح سے تجربہ کرنا چاہیئے۔

ایک تجربہ کار صاحب کی رائے ہے کہ جن پودوں پر کیڑے مکوڑے یا خاص اقسام کی مکھیاں نظر آویں انپر کوئلے باریک پیسکر جھڑک دینے سے امن ہو جاتا ہے۔ نیز کوئلوں کا چورا بذاتہ ایک عمدہ کھاد ہے چپاں گز لمبی قطار کے لئے یہ (چوتھائی) اونس تنم کافی ہیں۔  
 اگر پھول گوبھی کے تازہ ولایتی بیج منگوا کر بوندیے جاویں اور پھر



اس فصل سے عمدہ بیج حاصل کر کے رکھ چھوڑیں اور انہیں میدانوں میں اخیر جون سے یکراہ اگست تک بوویں تو بہت عمدہ پھول پیدا ہوں گے۔ اگر ان بیجوں کو ستمبر اکتوبر میں بویا جاویگا تو ناکامی ہوگی اور بجائے پھول بندھنے کے کٹے پھوٹ نکلیں گے۔ پھول گو بھی کے تازہ ولایتی بیج میدانوں میں زیادہ تر اخیر ستمبر اور اکتوبر میں بونے چاہئیں۔

## کرس

(*Apium graveolens*)  
(Celery)

انگریزی یا لاطینی نام  
سلیری

ہندوستانی نام

کرس سلاری۔

## موسم کاشت

(بہاروں میں)

(میدانوں میں)

وسط اگست سے اخیر اکتوبر تک اخیر فروری سے اخیر اپریل تک

## بیان و استعمال

اسکی کاشت اسکی لنبی اور نرم گندلوں کے لئے کیجاتی ہے۔ جب گندلیں بڑھی ہو جاتی ہیں تو انہیں بلائیں کر گے اہل یورپ بطور سلاو استعمال کرتے ہیں۔ نیز سبز حالت میں ان سے ہرے مصالحہ کا کام لیتے ہیں۔ اگر بنائی جاوے تو اسکی گندلوں کی عمدہ ترکاری بن سکتی ہے۔ کرس دو طرح کی ہوتی ہے ایک کے دھنسل سُرخ ہوتے ہیں اور دوسری کے سفید

لے بلائیں کرنے کی تشریح اور ترکیب "سی کیل" کے ضمن میں کر دی گئی ہے۔ بعض اوقات صرف بودوں پر سٹی چڑھانے کو ہی "بلائیں" کرنا کہتے ہیں +



تخم فروش سوداگروں کی فہرستوں میں ان دونوں کی بیسیوں قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ اگر شوق سے کاشت کیجاوے تو اسکی سب اقسام عمدہ ہیں۔ طریق کاشت۔ اسکی کاشت کے لئے اشد ضروری ہے کہ ہر سال تازہ ولایتی بیج سنگوائے جاویں۔ ویسی بیج جیسا کہ چاہیئے کام نہیں دیتے۔ البتہ ویسی بیجوں سے جو سلیری پیدا ہو جاتی ہے وہ ہرے مصالحہ کا کام ضرور دیکھتی ہے۔ اگر اگست اور شروع ستمبر میں اسکی کاشت منظور ہو تو گملوں کو سایہ میں رکھ کر پنیری کے لئے تخم چھڑکواں بودیں اور ہر روز آٹھ سات دن تک غوارہ سے ہلکا پانی دیتے رہیں۔ چند ہفتوں کے بعد جب پودے کیسے تناور ہو جاویں تو انھیں بتدریج گھنٹہ دو گھنٹہ دھوپ میں رکھ دیا کریں تاکہ وہ زیادہ مضبوط ہوئے جاویں۔ جب وہ کسی قدر کشیدہ قیامت اور تنومند ہو جاویں تو انھیں ایک کیاری میں قطاروں پر جنکا باہمی فاصلہ تین تین انچ ہو اتنے ہی اتنے فاصلہ پر لگا دیں۔ جب پودے پانچ چھ انچ اونچے ہو جاویں تو فی الفور انہیں اکھاڑ اکھاڑ کر جہاں مستقل طور پر لگانے ہوں لگا دیں۔ مستقل جگہ کو تیار کرنے کا بیان آگے کیا جاوے گا۔ پھیتی فصل برسات بعد بوئی جاتی ہے۔ اس فصل کی پنیری کیاریوں میں تخم چھڑکواں بود کر لگائی جاتی ہے اور جب پودے چار پانچ انچ اونچے ہو جاتے ہیں تو اسی وقت اکھاڑ کر مستقل مقامات میں لگا دی جاتی ہے۔ اگر موسم خشک اور گرم ہوتا ہے تو بیج دو ہفتہ جا کر پھوٹتے ہیں ورنہ چند دنوں میں ہی پھوٹ آتے ہیں \*



کرس کی کاشت کے لئے ایسی کیاریاں انتخاب کرنی چاہئیں جن میں  
 بارش کا فالتو پانی ذرہ نہ ٹھہر سکے۔ یعنی وہ کیاریاں نشیب میں واقع نہوں  
 ان کیاریوں کی مٹی سخت نہیں ہونی چاہیئے اگر سخت ہو تو اُسے خوب  
 باریک کر کے اُس میں دریا کا بالوریت اور کھاد مجموعہ ملا دیں۔ بعد ازاں  
 ان کیاریوں میں چار چار فٹ کے چو گرد فاصلہ پر گڑھے کھودیں جنکا قطر  
 ۱۸ انچہ اور گہرائی ایک فٹ ہو۔ اگر ایک فٹ گہرائی سے نیچے کی مٹی سخت  
 معلوم ہو تو ایک فٹ اور کھدائی کر دیں اور اس ایک فٹ میں نرم  
 ریت اور کھاد آمیز مٹی بھر دیں۔ یعنی کیاریوں کے سطح سے گڑھوں کی  
 گہرائی ایک فٹ رہ جاوے۔ اگر ایک فٹ کھدائی کے بعد زمین نرم ہو  
 تو زیادہ کھودنے کی کچھ ضرورت نہیں۔ اس ایک فٹ میں تین انچہ  
 کے قریب کھاد آمیز مٹی دیکر پھیری لگانی شروع کر دیں۔ ہر ایک پودے  
 کا باہمی فاصلہ ۵ انچہ کے قریب رہنا چاہیئے۔ ابتدا میں دوسرے تیسرے  
 دن پانی دیتے رہیں اور دسویں بارھویں دن نلائی کرتے رہیں نیز بڑی  
 شاخوں پر جو چھوٹے چھوٹے گلے نکل آتے ہیں اُنکو پوج دیا کریں کیونکہ یہ  
 پودے کی طاقت کو کم کر دیتے ہیں۔ جب پودے ایک فٹ کے قریب اُوپے  
 ہو جاویں تو ابتدائی چھوٹے چھوٹے پتے توڑ کر پھینک دیں اور باقی سب  
 پتیوں کو ہاتھ سے اکٹھا کر کے پودوں کی جڑ میں دو تین انچہ کھاد آمیز مٹی  
 دیدیں۔ اسی طرح ہر ہفتہ تھوڑی تھوڑی مٹی چڑھاتے چلے جاویں یہاں تک  
 کہ گڑھے سطح کے ہموار ہو جاویں اور پودوں کے سرے اوپر نکلے رہ جاویں



اب پودوں کو انکی حالت پر چھوڑ دیں۔ دو ہفتہ بعد پانی دیدیا کریں اور  
 حسب ضرورت نلائی کرتے رہیں تاکہ ناکارہ خار و خس پودوں کے قریب  
 اگنے نہ پاوے۔ آخری مرتبہ مٹی چڑھانے کے دو ہفتہ بعد یہ ترکاری  
 قابل استعمال ہو جاتی ہے †

گرس کی کاشت کی نسبت ایک تجربہ کار صاحب اپنا تجربہ یوں اظہار  
 فرماتے ہیں :-

”جہاں تک ممکن ہو سکے عمدہ تخم معتبر کار خانوں سے منگوانے  
 چاہئیں۔ ستمبر کے پہلے ہفتہ میں گٹلوں یا ناندوں میں انھیں چھڑکواں بوکر  
 پنیری لگا لینی چاہیئے۔ جب تک پنیری طیار ہو تب تک پود لگانے کے  
 لیئے جگہ طیار کرنی ضروری ہے۔ کیاریوں میں چار چار فٹ کے چوگرد فاصلہ  
 پر گڑھے کھودنے چاہئیں جنکا عمق ایک ایک فٹ اور قطر بھی ایک ایک  
 فٹ ہو۔ بعد ازاں دو حصہ خوب بوسیدہ گوبر کی کھاد۔ ایک حصہ بوسیدہ لید  
 اور ایک حصہ باغیچہ کی مٹی (جو گڑھوں سے برآمد ہوتی ہے وہی کام دے  
 سکتی ہے) ملا کر کھاد مرکب طیار کر لیں۔ اس کھاد مرکب میں فی سن پانچ  
 سیر کے حساب سے شورہ آمیز کر دینا چاہیئے۔ اسوقت اس کھاد سے نصف  
 نصف گڑھے بھر دیے جاویں۔ جب پنیری پانچ انچہ کے قریب اُپچی ہو  
 جاوے تو اُسے اکھاڑ کر ایک ایک پودا ہر ایک گڑھے میں لگا دینا مناسب ہے  
 فی الفور پانی دیں اور یہ احتیاط رکھیں کہ گڑھے خشک نہ ہونے پادیں۔

جب موسم خشک ہو تو روز مرہ ہلکا پانی دینا چاہیئے۔ اس طرح سے پودے



خوب بڑھنے لگینگے ہفتہ میں ایک مرتبہ رقیق کھاد دینے کو بر کو پانی میں گھول کر اور تین چار روز ختم میں رکھ کر (رکھ کر) تھوڑی تھوڑی پودوں کی جڑوں میں دیں۔ جب پودے خوب تنادر ہو جاویں تو ہر ہفتہ مٹی چڑھانی شروع کر دیں۔ یہاں تک کہ گڑھے کیاریوں کے سطح کے ہموار ہو جاویں۔ جب تک گڑھے پر نہو جاویں اچھی طرح سے روز مرہ پانی دیتے رہیں گڑھوں کے پر ہو جانے کے دو ہفتہ بعد کرس کو بلا تاگل استعمال کر سکتے ہیں۔

ایک اور تجربہ کار صاحب کی رائے ہے کہ پنیری کو گڑھوں میں لگانے سے پہلے انکے سرے تھوڑے تھوڑے پونچ دینے چاہئیں۔ اور جب تک پودے ۱۸ انچ اونچے نہو جاویں مٹی دینا شروع نہ کیا جاوے۔ اور جس دن مٹی چڑھانی منظور ہو وہ دن صاف اور روشن ہونا چاہیئے۔

عام گھنٹ۔ کرس کے ایک اونس بیجوں سے قریب ڈھائی ہزار کے پودے پیدا ہو جاتے ہیں۔

ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ پنجاب میں سلیری کے پودے کو ”اجود“ اسکی جڑ کو کرش یا بیج کرش اور بیجوں کو تخم کرش کہتے ہیں سلیری کی جڑ اور بیج دیسی ادویات میں استعمال کیئے جاتے ہیں نیز صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ کوہ ہمالیہ میں آٹھ ہزار فٹ سے دس ہزار فٹ کی بلندی تک اور وادی کانگرہ میں دھولا دھار پر ایک پودا خود رو پیدا ہوتا ہے اسکی خوشبودار جڑ کو کھانے کے کام میں لاتے ہیں اور اس کا ذائقہ بجنسہ سلیری کے ذائقہ کی مانند ہوتا ہے۔ اس پودے کا لاطینی



نام ( *Angelica Glauca* ) لکھا ہے اور دیسی نام چورا بیان کیا گیا ہے

# سلیریک

( *Apium Graveolens* var. *Rapaceum* )

( *Celeriac* )

ہندوستانی نام      انگریزی یا لاطینی نام

+      سلی ری اک

موسم کاشت

(میدانوں میں)      (پہاڑوں میں)

وسط اگست سے اخیر اکتوبر تک      اخیر فروری سے اخیر مئی تک

بیان و استعمال

یہ ترکاری بھی سلیری (گرس) کی ایک قسم ہے۔ اس کا تنہ گول شلجم کی مانند ہوتا ہے اسکے پتے ہرے مصاحے کا کام دیتے ہیں اور اسکے تنہ کی ترکاری بناتے ہیں۔ اور بطور سلاو بھی استعمال کرتے ہیں۔ سرو ممالک یا پہاڑوں میں یہ ترکاری درجہ کمالیت کو پہنچ جاتی ہے +

طریق کاشت۔ برسات اور برسات بعد کی فصل کے بیج بو کر پییری بجنہ اسی طرح لگانی چاہیئے جیسا کہ سلیری (گرس) کے ضمن میں لکھا گیا ہے مگر بعد ازاں بجائے گڑھوں میں بونے کے اسے کیاریوں میں قطاروں پر بونا چاہیئے۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ ایک ایک فٹ رہنا چاہیئے اور اسقدر



فاصلہ ہر ایک پودے کا رکھنا کافی ہے۔ دسویں بارھویں نکائی کرتے رہیں  
 اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدیا کریں \*  
 ایک تجربہ کار صاحب فرماتے ہیں کہ ملک جرمن میں اس کی کاشت  
 اس طرح سے کی جاتی ہے کہ تین تین چار چار فٹ کے فاصلہ پر تھاولے  
 یعنی گڑھے کھود لیتے ہیں جنکا عمق ۷ یا ۸ انچہ اور قطر ایک فٹ ہوتا  
 ہے۔ کھدی ہوئی مٹی میں خوب باریک کھاد مجموعہ ملا کر گڑھوں کو پُر کر  
 دیتے ہیں۔ مگر کیاریوں کے سطح سے ۲ انچہ گہرائی رکھ لیتے ہیں نیز گڑھوں  
 کے چاروں طرف ۲ انچہ اُونچا پُشتہ باندھ دیتے ہیں۔ ان گڑھوں کے عین  
 وسط میں ایک ایک ..... پودا لگا دیتے ہیں اور بعد ازاں  
 خوب پانی بھر دیتے ہیں۔ ان گڑھوں کو پانی سے ہمیشہ تر رکھتے ہیں۔ اس  
 طرح سے پودے بہت جلد تناور ہو جاتے ہیں \*  
 عام کیفیت۔ جرمن کا طریق کاشت اس ملک میں بھی قابل تجربہ ہے \*



# سی کیل

(Crambe Maritime)

(Sea Kale)

ہندوستانی نام

انگریزی یا لاطینی نام

گرے سی کیل

+

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع فروری سے اخیر ستمبر تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

اسکی کاشت اسکی نرم نرم گندلوں کے لیٹے کی جاتی ہے۔ اسکی گندلوں کا ذائقہ پک کر مارچوبے اور پھول گوہی سے بہت کچھ ملتا ہے۔ بعض اصحاب اسے پھول گوہی اور مارچوبے پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر عمدہ طور پر کاشت کیجاوے تو اس کی ترکاری بہت لذیذ بنتی ہے +

طریق کاشت۔ طریق کاشت بجنہ وہی جو مارچوبے کی نسبت لکھا گیا ہے جب اسکی گندلیں کچھ بڑی ہو جاویں تو ایک مٹی کا گولا اٹا کر کے اپر دھک دینا چاہیئے۔ تاکہ وہ سفیدی مائل اور نرم پڑ جاویں اس عمل کو انگریزی میں "بلاچنگ" (Blanching) کہتے ہیں +

عام کیفیت۔ سی کیل کی ایک قسم "فل ہم" نہایت عمدہ ہوتی ہے اسکے بیج تخم فروشوں سے منگوا کر ضرور بونے چاہئیں +



# مُولی

(Raphanus Sativus)

(Radish)

انگریزی یا لاطینی نام

ریڈش

ہندوستانی نام

تیر

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط اگست سے اخیر جنوری تک

اول۔ وسط اپریل سے وسط جون تک

دوم۔ شروع ستمبر سے وسط اکتوبر تک

## بیان و استعمال

مُولی کچھ کھائی جاتی ہے۔ اس کی ترکاری بھی کئی طرح سے بنتی ہے۔ آبی اچار پڑتا ہے۔ بعض حالتوں میں اسکا عرق ادویات کے کام میں لایا جاتا ہے۔ طریق کاشت۔ شمالی ہند میں مُولیاں قریب قریب بارہ مہینہ برابر ملتی ہیں۔ اگر لگا تاریخ بولتے رہیں تو مُولیاں برابر اُترتی رہتی ہیں۔ بعض مُولیاں بہت لمبی اور موٹی ہوتی ہیں۔ یہ زیادہ تر مویشیوں کو کھلائی جاتی ہیں۔ جو مُولیاں اوسط درجہ کی اور پتلی اور خوش ذائقہ ہوتی ہیں انکی ترکاری بنتی ہے اور کھائی بھی جاتی ہیں۔ ولایتی مُولیوں کی کئی قسمیں ہیں بعض بہت چھوٹی رنگدار اور کھانے میں اچھی معلوم ہوتی ہیں اور بعض گول اور موٹی ہوتی ہیں۔ اگر ولایتی تخم ایک مرتبہ بوئے جاویں اور اخیر میں اُن کے عمدہ پودوں سے



سے تخم حاصل کر کے رکھ چھوڑیں تو پھر اُن بیجوں سے فصل بوئی جاوے گی  
 اُس میں بھی وہی خواص پائے جاویں گے جو تازہ ولایتی بیجوں کی فصل میں ہوتے  
 ہیں۔ اگر اسی طرح ہر فصل کے آخر میں بیج رکھ لیئے جاویں تو کئی سال تک  
 انھیں سے عمدہ ولایتی مولیاں پیدا رکھتے ہیں، سنگے بھی مولیوں سے  
 پیدا ہوتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ترکاریوں سے عام ہے یا کچے کھائے  
 جاتے ہیں۔ سینگرے حاصل کرنے کی رسم یہ ہے کہ مولیوں کو اکھاڑ کر اور  
 اُن کے نیچے کے پتلے سرے (سے) جو تھکات کر پھر بو دیتے ہیں۔ تھوٹے ہی  
 دنوں میں تازہ پتے نکل آتے ہیں اور اُن میں سے بہت سی شاخیں  
 پھوٹ نکلتی ہیں جنہیں سفید سا پھول آکر سینگرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں +  
 مولیوں کو یا تو پنیری کے ذریعہ بونا چاہیئے یا ویسے ہی کیاریوں میں  
 تخم چھڑکواں بو دیں اور جب وہ اُگ آویں تو اس طرح سے چھانٹ دیں  
 کہ ہر ایک مولی کے پودے کے مابین قریب چھ انچ کے فاصلہ باقی رہ جاوے  
 اگر قطاروں پر بیج بولے ہوں تو قطاروں کا باہمی فاصلہ قریب ۹ انچ کے ہونا  
 چاہیئے۔ پودوں کا ایک دوسرے سے ۶ انچ فاصلہ کافی ہے۔ مولیوں کو  
 پانی کی بہت ضرورت رہتی ہے۔ لہذا جس دن سے تخم ریزی کی جاوے  
 اسی دن سے پانی کی خبر رکھیں۔ دسویں بارھویں نٹائی کرتے رہیں تاکہ  
 ناکارہ گھاسیں نہ اُبھرنے پاویں +

ایک صاحب جنھیں ولایتی مولیاں بونے میں خاص تجربہ حاصل ہے  
 اپنے سالہا سال کے تجربہ کو بوں بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر ولایتی



مُولیوں کی کاشت درجہ کمالیت کی بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر مُندرجہ ذیل طریق پر کاشت کیجاوے تو نتیجہ حسب مَمراد نکلیگا :-

ولایتی مُولیاں بونے کے لیے وہ زمین مُنتخب کرنی چاہیے جس میں دو حصہ چکنی مٹی اور ایک حصہ ریت ہو۔ اگر زمین زیادہ چکنی اور سخت ہو تو اُس میں دریا کا پلویت شامل کر دیں بعد ازاں بوسیدہ گوبر کی کھاد دیکر زمین کو خوب درست کر لیں۔ قطاریں بنانے کی کچھ ضرورت نہیں صرف مُربع کیاریاں بنا لیں۔ تخم ریزی کے ایک دن پہلے کیاریوں میں پانی دلوادیں۔ دوسرے یا تیسرے دن جب مٹی بھر بھری ہو جاوے تو بچوں کو چھڑکواں بو کر ہلکا سا مٹی کا غلاف چڑھاویں۔ دو دن بعد تھین کے فوارے سے کیاریوں کو آبپاش کر دیں اسی طرح سے حسب ضرورت پانی دیتے رہیں۔ جب بیج پھوٹ کر چھٹا پتانکل آوے تو کیاریوں کو کنوئیں سے آبپاش کرنے میں مضافیقہ نہیں ہے۔ اگر موسم خشک ہو تو دوسرے دن پانی دلوانا چاہیے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ نلانی کرائی جائے۔ پھر خود بخود معلوم ہو جاویگا کہ ولایتی مُولیاں کیسی عمدہ پیدا ہوتی ہیں۔ ولایتی مُولیوں کی پنیری ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لگانی چاہیے اور نہ انھیں کسی قسم کی قطاروں پر بونا چاہیے۔ البتہ جس جگہ بہت گہنے پودے اگ آویں اُس جگہ سے کمزور چھانٹ دیں۔ ہر ایک پودے کا چاروں طرف سے ۷ اینچ فاصلہ کافی ہے +

عام کیفیت - پچاس گز لمبی قطار کے لیے ۳ اونس تخم کافی ہیں۔



ہندوستان کے مختلف حصص میں انواع و اقسام کی ایسی مولیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان کے تخم حاصل کر کے تجربہ کرنا خالی از منفعت نہوگا۔ شملہ میں مولیوں کی دو فصلیں ہوتی ہیں۔ پہلی فصل وسط مئی سے وسط جون تک ہوتی ہے مگر اسکی پیداوار کم ہوتی ہے۔ دوسری شروع ستمبر سے وسط اکتوبر تک۔ اسکی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے کھانے کے لئے مولیوں کو جلد اکھاڑ لینا چاہیئے ورنہ وہ سخت پڑ جاتی ہیں۔

## سالمی

(*Tragopogon Porrifolius*)

(Salsify)

ہندوستانی نام | انگریزی یا لاطینی نام  
+ | سال سینی۔

## موسم کاشت

میدانوں میں | (پہاڑوں میں)  
ماہ اکتوبر میں بونی چاہیئے۔ | شروع پاج سے اخیر مئی تک

## میان و استعمال

یہ ایک انگریزی ترکاری ہے انگریز اسکی جڑوں کو پہلے چھیل ڈالتے ہیں پھر کتر کر اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے سرکہ یا عرق لیموں میں تھوڑی دیر تک بھگو دیتے ہیں۔ بعد ازاں اُبال کر استعمال کرتے ہیں۔ نیز اس کی نرم گندلوں کو مار چنبے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اس ترکاری کی شکل بعض



اقسام کی ولایتی مویلوں سے بہت کچھ ملتی ہے۔ اسے بنانے کی دوسری ترکیب یہ ہے کہ اول سالم جڑوں کو نیم جوش کر کے خوب باریک کدوکش کر دیتے ہیں۔ بعد ازاں نمک مصالحہ دے کر چوڑی چوڑی ٹیکیاں بنا لیتے ہیں اور انھیں مازہ مکھن میں تل کر کھاتے ہیں +

**طریق کاشت۔** یہ ترکاری ہندوستان میں آبائی تمام بہت اچھی پیدا ہو سکتی ہے مگر لا علمی کے سبب بہت کم نظر آتی ہے۔ سرو مقامات میں یہ درجہ کمائیت کو پہنچ جاتی ہے۔ کیاریوں میں ایک ایک فٹ کے فاصلہ متوازی پر قطاریں بنا کر ان پر بیج چھڑکواں۔ بوویں۔ جب پودے ۴ انچہ اوپنچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی ایک دوسرے سے ۶ انچہ دوری رہ جاوے۔ دسویں بارھویں نکائی کرتے رہیں اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی اسکی پنیری ہرگز نہ لگاویں ورنہ سراسر ناکامی ہوگی۔ صرف قطاروں پر کھنے پودوں کو چھانٹ دینا کافی ہے +

**عام کیفیت۔** پھاڑوں میں ساسنی مدت تک کام کی بنی رہتی ہے۔ مگر میدانوں میں جہاں گرمی شروع ہوتی اسی وقت پھولنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسکی جڑیں کھانے کے کام کی نہیں رہتیں۔ ایک ایکڑ زمین میں ساسنی کی کاشت کے لیے نصف اونس تخم کافی ہیں۔ ساسنی کے اگر ایک مرتبہ تازہ ولایتی بیج منگوا کر بو دیئے جاویں اور اس فصل سے عمدہ بیج حاصل کر کے رکھ چھوٹیں تو ان سے مدت تک یکے بعد دیگرے فصلیں بوسکتے ہیں۔



پیداوار بہت اچھی ہوگی +

# سکور زونی را

(Scorbonora Hispanica)

(Scorbonora)

ہندوستانی نام انگریزی یا لاطینی نام

سکور زونی را

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر مئی تک

ماہ اکتوبر

## بیان و استعمال

یہ ترکاری بھی بہت کچھ سانسفی سے مشابہت رکھتی ہے اور اسی طرح سے استعمال کیجاتی ہے جس طرح سے کہ سانسفی۔ اسکی جڑیں لبنی لبنی ہوتی ہیں اور اکثر اشخاص اسے سانسفی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر محض ابالکر بھی یہ کھائی جاوے تب بھی نہایت عمدہ ذائقہ ہوتا ہے۔ اسکی جڑوں میں قریب ایک سال تک ریشہ رہتا ہے بعد ازاں وہ گداز اور ملائم پڑ جاتی ہیں۔ گویا ایک سال بعد انھیں اکھاڑنا چاہیئے۔ میدانوں میں سارے سال اسکے پودے اچھی حالت میں نہیں رہ سکتے اسلئے چھ سات ماہ بعد جڑیں اکھاڑ لینیں چاہیئے۔ البتہ پہاڑوں میں یہ آسانی سے



درجہ کمالت کو پہنچ سکتی ہے +

طریق کاشت۔ اگر اسکی کاشت منظور ہو تو ہر سال تازہ ولایتی بیج منگوانے چاہیں  
 دیسی کام نہیں دیتے اسکی پنیری ہرگز نہیں لگانی چاہیئے۔ کیاریوں کو دست  
 کر کے اور ان میں ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کے فاصلہ پر قطاریں بنا کر تخم چھڑکواں  
 بویں۔ جب پودے تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اسطرح سے  
 چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا باہمی فاصلہ دس انچہ رہ جاوے  
 وسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک  
 مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے +

عام کیفیت زمین سے کھودنے کے بعد ریت میں داب کر اسے عرصہ  
 تک اصلی حالت پر رکھ سکتے ہیں +



# پارسنپ

(Pastinaca Sativa)

(Parsnip)

ہندوستانی نام | انگریزی یا لاطینی نام  
جزر | پارسنپ

## موسم کاشت

(میدانوں میں) | (پہاڑوں میں)  
وسط اکتوبر سے وسط نومبر تک | شروع پلج سے اخیر مئی تک

## بیان و استعمال

اسکی جڑیں گاجر کی مانند ہوتی ہیں اور اسکی ترکاری نہایت عمدہ بنتی ہے اہل یورپ اسے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ پارسنپ دو قسم کی ہوتی ہے ایک لمبی اور گاڑدوم گاجر کی طرح۔ دوسری گول شلجم کی مانند + طریق کاشت۔ ہندوستان میں پارسنپ کی کامیابی سے کاشت اُست تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تخم اچھے نہ ملیں۔ بہتر ہے کہ تخم فروشوں سے فرمایش کر کے وہ تخم یہاں منگوائے جاویں جو دلایت میں اگست اور ستمبر کے پودوں سے اترتے ہیں وہ اسطرح پر وہاں سے روئے کیئے جاویں کہ یہاں اکتوبر میں پہنچیں۔ آتے ہی انھیں فی الفور بویا چاہیے ورنہ ناکامی ہوگی۔ اس کے بیج زیادہ دیر نہیں کھیرتے۔ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں اگر پراے نے بیجوں سے کاشت کیجاوے گی تو کامیابی



کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیئے۔ کیاریوں کی قریب تین فٹ گہری کھدائی  
کرا کے اور خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ ڈال کر قریب ۱۸ انچ کے فاصلہ سے  
قطاریں بنانی چاہئیں۔ جب پودے کچھ اونچے ہو جاویں تو انہیں اسی طرح  
چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودا ایک دوسرے سے قریب ۱۰ انچ کے  
فاصلہ پر رہ جائے۔ وقتاً فوقتاً نلائی کرتے رہیں اور جب موسم خشک ہو  
تو ہفتہ میں دو مرتبہ ضرور پانی دینا چاہیئے +

عام کیفیت پچاس گز لمبی قطار کے لیے چھٹائی اونس تخم کافی ہیں  
کبھی کبھی اسے رقیق کھاد بھی دینی چاہیئے۔ تین چار مہینے کے اندر ترکاری  
کھانے کے قابل ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب افنوس کرتے ہیں کہ ہندوستان  
میں یہ ترکاری بہت کم بوئی جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بیج  
ٹکے ہوتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ انہیں گیلی ریت میں ملا کر بویا  
جاوے تاکہ وہ تیز ہوا میں اڑ نہ جاویں جس زمین میں پار سنپ بوئی  
ہو اس میں ریت کا جزو ہونا اشد ضروری ہے اگر کم ہو تو ملا دینا مناسب  
ہے۔ پہاڑوں میں پار سنپ کے وہ بیج بولے چاہئیں جو یورپ میں موسم  
گرمی کے اخیر میں پودوں سے حاصل کیئے گئے ہوں +



# شلجم

(Brassica Rapa)

(Turnip)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

رُٹ نپ

شلجم

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

ویسی بیج اخیر جولائی سے وسط ستمبر | اخیر فروری سے وسط جون تک -  
تک بونے چاہئیں۔ ولایتی بیج ستمبر | شروع ستمبر سے وسط اکتوبر تک  
سے اخیر نومبر تک بوسکتے ہیں +

## بیان و استعمال

شلجم کی ترکاری بنتی ہے اچار پڑتا ہے۔ مرتبہ بنایا جاتا ہے۔ اور بڑے شلجم موشیوں کو کھلائے  
جاتے ہیں۔ نیز شلجم سکھا کر ترکاری اور آبی اچار کے لیئے رکھ لیئے جاتے ہیں  
طریق کاشت۔ کیاریوں کو اچھی طرح سے درست کر کے تخم چھڑکواں  
بودیں۔ جب پودے کچھ بڑے ہو جاویں تو اس طرح چھانٹ دیں کہ ہر ایک  
پودے کا باہمی فاصلہ قریب ۹ انچہ کے رہ جاوے۔ اگر قطاروں پر شلجم  
بونے ہوں تو بھی اتنا ہی فاصلہ کافی ہے۔ البتہ قطاروں کی باہمی دوری  
قریب ۱۵ انچہ کے رکھنی چاہیئے۔ حسب ضرورت نٹائی کرتے رہیں۔ اور اگر  
موسم خشک ہو تو چوتھے پانچویں دن پانی دینا مناسب ہے زیادہ توجہ کی کچھ ضرورت



نہیں ہے۔ شلجم عمدہ پیدا کرنے کے لئے عمدہ تخم حاصل کرنے چاہئیں۔ اگر  
ولایتی شلجم بونے ہوں تو ہر سال تازہ بیج تخم فروشوں سے خریدیں +  
عام کیفیت۔ یورپ میں شلجم کی بیسیوں قسمیں ہیں مگر ملک سوڈین کے  
شلجم بہت مشہور ہیں اور بہترین خیال کیے جاتے ہیں۔ انکے تخم تخم فروشوں  
سے فرمائش کرنے پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ۵۰ گز لمبی قطار کے لئے ڈیڑھ  
اونس تخم کافی ہیں +

سفید اقسام کے ولایتی شلجموں کے اگر تازہ بیج تخم فروشوں سے منگوا کر بوئے  
جاویں اور ان کی فصل سے عمدہ بیج حاصل کر کے احتیاط سے رکھ چھوڑیں  
اور انھیں دوسرے سال موسم کاشت شروع ہونے کے دن میں دن بعد  
تک بوویں تو فصل بہت اچھی ہوگی۔ اگر یہ بیج پچھتے بوئے جاویں گے تو  
ناکامی ہوگی۔ ولایتی شلجم کی زرد اقسام کے تازہ تخم اگر منگوا کر بوئے  
جاویں اور ان کی فصل سے تخم حاصل کر کے دوسرے سال بو دیئے جاویں  
تو وہ کام نہیں دیتے۔ اس لئے زرد اقسام کے شلجم کے تخم ہر سال تازہ  
منگوانے چاہئیں +



# گاجر

(Daucus Carota)

(Carrot)

انگریزی یا لاطینی نام

کیرٹ

ہندوستانی نام

گاجر

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

آخر فروری سے آخر مئی تک

وسط اگست سے آخر نومبر تک


بیان و استعمال

گاجر سے ہندوستان میں جتنے کام لیے جاتے ہیں غالباً اُن سے اور کسی جگہ نہیں لیے جاتے ہونگے۔ اسے کچی کھاتے ہیں۔ پتے موشیوں کے چارہ میں ڈال دیتے ہیں۔ ترکاری بناتے ہیں۔ آبی آچار ڈالتے ہیں۔ مربہ پڑتا ہے اسکا حلا بناتے ہیں۔ کہو کش کر کے پچھا پتار کرتے ہیں۔ عرق نکال کر ادویات میں برتتے ہیں۔ خشک کر کے سٹو بناتے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یورپ میں بھی گاجروں کا بہت خرچ ہوتا ہے۔ وہاں دو قسم کی گاجریں کاشت کی جاتی ہیں۔ ایک موشیوں کے لیے۔ دوسری آدمیوں کے لیے۔ موخر الذکر قسم کی بیسیوں جدا گانہ قسمیں ہیں۔ یہ نرم و نازک شیریں اور خوش رنگ ہوتی ہیں۔ ولایتی گاجریں اگر ہمارے باغیچوں میں بوئی جاویں تو نہایت آسانی سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ ویسی گاجروں کی بھی بعض قسمیں



بہت شیریں ہوتی ہیں مگر وہ خاص خاص جگہ پائی جاتی ہیں \*  
**طریق کاشت**۔ اگر دیسی تخم بونے ہوں تو اگست ستمبر میں بوسکتے ہیں  
 اگر ولایتی تخم بونے ہوں تو وسط اکتوبر میں بویں۔ گاہروں کو ایسی عمدہ  
 زمین میں بونا چاہیئے جس میں ریت کا بھی خاصہ جزو ہو۔ جہاں زمین کسی  
 قدر سخت ہو وہاں بہتر ہے کہ اونچی قطاروں پر گاہریں بوئی جاویں۔ پہلے  
 کیاریوں میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ پھیلا کر دو تین دن بعد انہیں قریب  
 دو فٹ گہرائی میں یا کھودیں اور اس طرح کھاد اور مٹی کو خوب آمیز کر دیں۔  
 گہری کھدائی کا یہ فائدہ ہے کہ گاہریں صاف اور سڈول پیدا ہونگی۔ اگر  
 زمین کم گہری کھدی ہوگی تو گاہریں ناقص۔ بے ڈھنگی اور شاخدار ہونگی  
 قریب بارہ بارہ انچہ کے فاصلہ پر قطاریں بنانی چاہئیں۔ اور ان پر آٹھ  
 انچہ کی دوری پر ہنگلی سے سوراخ کر کے بچ بویں اگر موسم خشک  
 ہو۔ مگر زمین خاصی مرغوب ہو تو فی الفور پانی دینے کی ضرورت نہیں۔  
 ورنہ فی الفور آبپاشی کی جاوے لیکن اس طرح نہیں کہ کیاریاں غرقاب  
 ہو جاویں۔ اگر زمین تر ہو تو جب تک پودے ابھی طرح سے نہ پھوٹ  
 آویں پانی دینے کی ضرورت نہیں۔ جب پودے نکل آویں تو ناقص اور کمزور  
 اکھاڑ کر پھینک دیئے چاہئیں \* اگر بڑی قسم کی گاہریں بوئی ہوں تو  
 قطاریں اکھاڑ اکھاڑ انچہ کے فاصلہ سے بنانی چاہئیں اور بیج سوراخوں  
 میں قریب دس دس انچہ کے فاصلہ پر بویں۔ جب پودے نکل آویں تو  
 کمزور اور ناقص پودے دور کر دیں۔ اور اچھے پودے رہنے دیں۔ کیونکہ زیادہ







بتوں کی نسوں کو تل کر بہت شوق سے کھاتے ہیں +

**طریق کاشت** پہلے کسی کیاری میں تخم چھڑکواں بو کر پھیری لگا لیں جب پودے قریب ۴ انچ اونچے ہو جاویں تو انھیں کیاریوں میں اس طرح سے لگاویں کہ پہلے پندرہ پندرہ انچ چوڑے اور اتنے ہی گہرے گڑھے کھودیں۔ اگر اتنی گہرائی پر جا کر یہ معلوم ہو کہ نیچے سے مٹی سخت ہے تو ایک فٹ اور گہری کھدائی کریں۔ پھر اس گڑھے کی مٹی میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ اور عمدہ اور طاقتور باغیچہ کی مٹی آمیز کر کے بھر دیں۔ مگر بہر صورت گڑھا سطح سے ایک فٹ عمیق رہنا چاہیئے۔ ان گڑھوں میں پودے لگائے جاویں۔ ہر ایک گڑھے کا ایک دوسرے سے قریب ۴ فٹ کے فاصلہ رہنا چاہیئے۔ پودے لگاتے ہی پانی دیدیں۔ اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دینا چاہیئے۔ جوں جوں پودے بڑھتے جاویں تھوڑی تھوڑی مٹی گڑھے میں چھوڑتے جاویں تاکہ گڑھا پورا بھر جاوے۔ مگر یہ خیال رہے کہ مٹی سے پودا دب نہ جاوے۔ اس عمل کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ڈونٹھل گڑھے کے اندر رہ جاویں گے اور پتے سطح کیاری سے اوپر نکلے رہیں گے گڑھے کے بھر پور ہونے کے دو ہفتہ بعد کارڈون قابل استعمال ہو جاتی ہے۔  
**عام کیفیت**۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اس ترکاری کو ہندوستان میں بہت ہی کم بویا جاتا ہے اگر شوق سے کاشت کیجاوے تو پوری کامیابی حاصل ہو سکتی ہے +



# ہارس ریڈش

(Cochlearia Armoracea)

(Horse Radish)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

ہارس - ریڈش

+

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

اس کی جڑیں یا تو موسم بہار میں

ماہ نومبر/میدانوں میں یہ ترکاری

بوئی جاویں یا موسم خزاں میں \*

شاذ و نادر بوئی جاتی ہے) \*

بیان و استعمال

اسکی جڑوں کی ترکاری بہت اچھی بن سکتی ہے۔ آچار پڑتا ہے چٹنی بنتی ہے۔ انگریز

اس کی جڑوں کے ٹکڑے کر کے سرکہ میں ڈال کر کھاتے ہیں نیز ابال کر

بھی استعمال کیجاتی ہے \*

طریق کاشت میدانوں میں یہ ترکاری شاذ و نادر ہوتی ہے۔ وجہ یہ

ہے کہ اسے ٹھنڈ بہت درکار ہے۔ پہاڑوں میں یہ بہت آسانی سے

پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کی جڑیں تخم فروشوں سے منگوا کر اور ایک ایک

انچہ کے ٹکڑے کر کے ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر بوویں۔ یہ پودا ایک مرتبہ

کا لگایا ہوا مدت تک قائم رہتا ہے۔ ہر فصل میں بہت سی جڑیں کھانے



کے لیے نکال سکتے ہیں۔ چند پودے بطور پیوری رکھیں انھیں کی جڑوں کو کاٹ کر بو دیا کریں \*

اس ترکاری کو مید انوں میں کاشت کرنے کے لیے فر منجر صاحب یوں ہدایت فرماتے ہیں :-

”چند گیلے لو اور ان میں باغیچہ کی مٹی بھر دو۔ اس مٹی میں ایک حصہ بالوریت اور دو حصہ خوب بوسیدہ پتوں کی کھاد ہونی چاہیئے بعد ازاں ٹارس ریڈش کی جڑ ایسی لوجو چھن اُنکی کے برابر موٹی ہو بلکہ جمانتک ہو سکے اس سے بھی پتلی ہو۔ ان جڑوں کے دو دو اچھے لمبے ٹکڑے کرو۔ اور گملوں میں کنارے کنارے ایک ایک یا ڈیڑھ ڈیڑھ اچھے کے فاصلہ پر گاڑ دو۔ انہیں روزمرہ ٹھوڑا ٹھوڑا سا پانی دیدینا چاہیئے۔ بہت جلد ان میں جڑیں پھوٹ آئیں گی۔ دوسری طرف انکے لگانے کے لیے گڑھے اس طرح پر تیار کرنے چاہئیں کہ کیسقہ بلند قطعہ زمین پر (مراد یہ ہے کہ زمین نشیب میں واقع نہو) ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ گہرے اور ۱۰ و ۱۰۔ اچھے چوڑے سوراخ نکالیں۔ ان سوراخوں میں ۶ اچھے اونچی کھاد آمیز باغیچہ کی مٹی بھر دیں (مراد یہ ہے کہ ایک حصہ باغیچہ کی مٹی ہو اور دو حصہ خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ) بقیہ ایک فٹ گہرائی کو باغیچہ کی کھاد آمیز مٹی سے پُر کر دیں (مراد یہ ہے کہ اس مٹی میں ایک حصہ مٹی ایک حصہ بالوریت اور ایک حصہ خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ ہو) اب ہر ایک سوراخ میں ایک ایک پودا لگا دو۔ جب ان پودوں کو ان سوراخوں میں دو تین ہفتے لگے ہوئے ہو جاویں تو اُنکی جڑوں



کو آہستہ آہستہ مٹی ہٹا کر نکلی کر دو۔ اب یہ دیکھو گے کہ جڑوں کے ارد گرد نیز تنہ پر کئی چھوٹی چھوٹی باریک جڑیں پیدا ہو گئی ہیں۔ ان تمام جڑوں کو دور کر دینا چاہیئے۔ صرف ایک وسط کی بڑی جڑ چھوڑ دیں تا کہ وہ سیدھی نیچے کو چلی جاوے۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بعد تین چار مرتبہ یہی عمل دہرائیے نہیں جب بڑی جڑ سوراخ میں ایک فٹ گہرائی تک پہنچ جاوے اسوقت یہ سمجھ لینا چاہیئے کہ اب جڑ عمدہ مٹی میں پہنچ گئی اب اوپر کے ایک فٹ کی مٹی نکال کر پھینک دیں اور اس کے بجائے بالو ریت ایک فٹ گہرائی تک سوراخ میں بھریں۔ روز مرہ ہلکا پانی دینا چاہیئے یہ پانی ریت میں سے نتر نتر کر جڑ تک ہآسانی پہنچ جاوے گا۔ جہانگہ اسکی اصل ضرورت ہے۔ ریت کے بھرنے سے یہ حکمت مراد ہے کہ ماریس ریڈش کے تنہ پر چھوٹی چھوٹی جڑیں نہ پیدا ہو جاویں جس سے اسکے کمزور اور بیٹوں ہونے کا احتمال رہتا ہے یہ موٹی خود بخود ہوتی چلی جاوینگے کیونکہ خوراک اور تراوت نیچے سے برابر پہنچتی رہے گی۔ سوراخوں میں لگانے سے چارپانچ ماہ بعد انھیں نکال کر استعمال کر سکتے ہیں :

میدانوں میں اگر ماریس ریڈش کی جگہ بجنہ ویسی ہی ترکاری مطلوب ہو تو چند کناروں میں سینجے (*Morning pterygo sperma*) کے تخم بو دیں۔ اگر پانچ یا اپریل میں یہ بوج دیئے جاویں تو اگست ستمبر میں پودے اتنے بڑے ہو جاوینگے کہ ان کی جڑیں کھود کر بطور ماریس ریڈش کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ذائقہ اور صورت میں مشکل سے تیز ہو سکیگی :



عام کیفیت۔ سید انوں میں سینجے کی کاشت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اسکے تخم حاصل کرنے میں کچھ بھی مشکل نہیں پیش آ سکتی +

سکرٹ

(Sium Sisarum)

(Skirret)

انگریزی یا لاطینی نام  
سکرٹ

ہندوستانی نام  
+

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سید انوں میں)

شروع پرج سے اخیر مئی تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

اسکی جڑوں کی نہایت لذیذ ترکاری بنتی ہے اور بطور سلااد بھی استعمال کیجاتی ہے۔ اکثر اصحاب اسے "سلسفی" کا قائم مقام خیال کرتے ہیں +  
طریق کاشت۔ کیاریوں کو خوب درست کر کے دس دس انچہ کے چوگرد فاصلہ پر اسکی جڑیں چھ چھ انچہ گہری بونی چاہئیں۔ بارہویں چودہویں دن نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو چوتھے پانچویں پانی دیدنا چاہیئے۔ چونکہ اسکی جڑیں گہری جاتی ہیں اسلیئے کھدائی کیاریوں کی ڈھائی فٹ سے کم نہو۔ مٹی کے ساتھ کھاد مجموعہ خوب آمیز کر کے جڑیں لگانی چاہئیں



ورنہ جڑوں کے چھوٹے اور کمزور رہ جانے کا احتمال ہے ؛  
عام کیفیت میدانوں میں سینچنے کی کاشت آسانی سے ہو سکتی ہے  
تخم حاصل کرنے میں کچھ بھی مشکل پیش نہیں آ سکتی ؛



(*Pisum Sativum*)

ہندوستانی نام  
انگریزی یا لاطینی نام  
(Pea)  
مٹر  
پلی

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک شروع اگست سے وسط ستمبر تک

بیان و استعمال

مٹر کچی کھائی جاتی ہے اور اسکی ترکاری نہایت لذیذ بنتی ہے علاوہ ازیں یہ اور  
کئی طرح سے استعمال کی جاتی ہے۔ اہل یورپ اسکے بہت شائق ہوتے ہیں اور  
اسے بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یورپ میں مٹر کی کم از کم پچاس  
اقسام ہونگی جنہیں سے پندرہ سولہ اقسام زیادہ مشہور ہیں ہر ایک قسم  
ذائقہ رنگ قد اور جسامت میں ایک دوسرے سے نرالی وضع کی ہوتی ہے  
طریق کاشت پہلے جن کیاریوں میں مٹر بونی ہو انہیں بوسیدہ  
کھاد مجموعہ اور ہتی کی کھاد دے کر خوب درست کر لیں پھر دو دو فٹ کے



فاصلہ پر قطاریں بناویں۔ یہ قطاریں کیاریوں کی سطح کے ہموار ہوں اور انکی گہرائی قریب ۳ انچ کے ہونی چاہیئے۔ ان قطاروں پر ایک ایک انچ کے فاصلہ پر بیج بویں جب وہ پھوٹ آویں اور کچھ بڑے ہو جاویں تو نکمے اٹھا کر پھینک دیں۔ جب وہ بڑھنے لگیں تو خشک درختوں کی شاخوں کی ٹکیوں لگا دیں جن پر بیلین آسانی سے چڑھ سکیں جب پودے پانچ چھ انچ اونچے ہو جاویں تو کیاریوں میں دسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں۔ میرا اس موقعہ پر پودوں کی تقویت کے لئے جڑوں میں کسی قدر مٹی چڑھا دیں۔ جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دینا چاہیئے۔ جب پھلیاں لگ جاویں تو پندرھویں دن پانی دینا کافی ہے +

بیج بوتے ہی خوب حفاظت کرنی چاہیئے ورنہ گلہریاں چڑیاں۔ کوسے۔ طوطے وغیرہ گریہ گریہ کر بیج کھا جاویں گے۔ بہتر ہے کہ کیاریوں پر جال پھیلوا دیں یا جب تک پودے نہ پھوٹ آویں کسی لڑکے کو مقرر کر دیا جاوے کہ وہ حفاظت رکھے۔ جب پھلیوں میں دانے پڑ جاتے ہیں تب بھی پوری حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے +

**عام کیفیت** ہر قسم کی ولایتی مٹر ہندوستان کے ہر حصہ میں آسانی سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ولایتی مٹر کے بیج اگر میدانوں میں بونے ہوں تو اخیر اکتوبر میں بویں۔ یہ وقت بہت موزوں ثابت ہو گا۔ پچانش گز لمبی قطار کے لئے ڈیڑھ کوارٹ تخم کافی ہیں اسی اندازہ سے تخم ریزی کریں +

میانہ قد کی اقسام مٹر کے اگر تازہ ولایتی بیج منگوا کر بوٹے جاویں اور



اس فصل کے بیجوں سے دوسری فصل بونی جاوے تو اُسکے پودے کیسے  
 بلند قامت ہو جاتے ہیں مگر پھلیوں کے ذائقہ میں بہت کم فرق آتا ہے  
 جب پھلیوں کی ضرورت ہو تو بجائے ہاتھ سے توڑنے کے بہتر ہے کہ  
 تیر قینچی سے کام لیں۔ ہاتھ سے توڑنے سے جھٹکا لگتا ہے اور اسطرح پودوں  
 کی نرم و نازک کونپلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ ایک تجربہ کار صاحب کی رائے  
 ہے کہ پھلیاں لگنے سے پیشتر اگر بیلوں کے سروں کو احتیاط سے پونج دیا  
 جاوے تو پھلیاں بہت اُترنے لگتی ہیں۔ ایک اور صاحب فرماتے ہیں کہ اگر  
 پودوں پر کیڑے مکوڑے نظر آنے لگیں تو رات کے وقت کیاریوں کے پاس  
 ہوا کا سُخ دیکھ کر خوب الاؤ لگوا دیں جس میں آگ سُلگوا کر اوپر نیم تر لکڑیاں  
 لید اور بھوسہ وغیرہ ڈلوا دیں تاکہ دھوئیں کی بھاری بھاری گھٹائیں اٹھکر  
 سڑ کی بیلوں پر چھا جاویں۔ اس حکمت کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کیڑے مکوڑوں  
 کو پتے وغیرہ بد مزہ معلوم ہونگے اور وہ بہت جلد دفع ہو جاویں گے ۔



# شرول

(گانٹھ دار)

(Chaerophyllum Bulbosum)

(Cherphil Bulbous-Rooted)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

شرول (بلبس روٹڈ)

+

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

میدانوں میں

آخر فروری سے آخر اپریل تک

ماہ اکتوبر میں

## بیان و استعمال

اس کی جڑوں کی ترکاری بہت لذیذ بنتی ہے آچار بھی ڈال سکتے ہیں اور اُبال کر بھی کھا سکتے ہیں +

**طریق کاشت** گو یہ ترکاری ہندوستان میں شاذ و نادر ہوئی جاتی ہے مگر توجہ کیجاوے تو بہت آسانی سے پیدا ہو سکتی ہے۔ کیاریوں کو خوب درست کر کے ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر تین تین انچہ گہری قطاریں بنادیں ان میں بیج بودیں اور ان پر ہلکا سا مٹی کا غلاف چڑھا دیں۔ جب پودے پھوٹ کر چار انچہ کے قریب اونچے ہو جاویں تو اسطرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودا ایک دوسرے سے چھ چھ ۶ انچہ کی دوری پر ہو جاوے۔ دسویں بارھویں نلانی کرتے رہیں اور سب ضرورت پانی دیتے رہیں۔ فروری کے اخیر اور مارچ کے شروع میں گانٹھیں کھانے کے قابل ہو جاتی ہیں +



عام کیفیت گائے دارشول پار سنپ سے بہت مشابہ ہوتی ہے +

# شول (پتے دار)

(*Anthriscus beresfordium*)

(Chervil Garden)

ہندوستانی نام | انگریزی یا لاطینی نام

شول - گارڈن -

## موسم کاشت

(میدانوں میں)

(میدانوں میں)

آخر فروری سے آخر اگست تک

آخر ستمبر سے وسط فروری تک

## بیان و استعمال

اسکے چھوٹے چھوٹے پتے ہرے مصاکھے کا کام دیتے ہیں اور سلاو میں استعمال کئے جاتے ہیں +

**طریق کاشت** بچوں کو یا تو کیاریوں میں چھڑکواں بو دیں اور جب وہ پھوٹ آویں تو جہاں سے بہت گہنے ہوں چھانٹ دیں یا کیاریوں میں چھہ چھہ انچہ کے فاصلہ سے قطاریں بنا کر ان میں منگلی سے لکیر کھینچ کر بیج بونے چلے جاویں۔ لکیر کے اوپر بہت ہلکا مٹی کا غلاف چڑھاویں جب تخم پھوٹ کر دو تین انچہ اونچے ہو جاویں تو انہیں جہاں سے گہنے ہوں چھانٹ دیں دسویں بارھویں نلای کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک



مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے +  
 عام کیفیت چونکہ اسکے پتے اُسی وقت تک قابل استعمال رہتے ہیں  
 جب تک کہ بہت چھوٹے اور نرم رہیں اس لئے اگر متواتر اسکی ضرورت  
 ہو تو بیج پندرھویں دن بونے چاہئیں +

## لیٹوس

(Lactuca Sativa)

ہندوستانی نام (Lettuce) انگریزی یا لاطینی نام  
 کاہو لٹ میوس

### موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر جون تک

وسط اگست سے اخیر نومبر تک

### بیان و استعمال

در حقیقت یہ بھی ایک قسم کی بند گو بھی ہے مگر اس کا ذائقہ مختلف  
 ہوتا ہے اسکے پتوں کی بہت اچھی ترکاری بن سکتی ہے انگریز اسے بڑے  
 شوق سے کھاتے ہیں۔ لیٹوس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ”کے بیج“  
 دوسری ”کوس“ پہلی قسم کے سرگول ہوتے ہیں اور دوسری کے شکل مستطیل +  
 طریق کاشت اگنی فصل جو اگست سے لیکر وسط اکتوبر تک بوئی  
 جاتی ہے اُس میں بہت تھوڑے پتے آتے ہیں۔ وہ بہت جلد پھول  
 جاتی ہے اور کام کی نہیں رہتی۔ پچھیتی فصل جو اخیر اکتوبر سے لیکر



آخر نمبر تک. بوئی جاتی ہے اُس میں خاطر خواہ کامیابی ہوتی ہے۔ اس  
 لئے بہتر یہی ہے کہ اس کی پچھیتی فصل بوئی جاوے تاکہ محنت رائیگاں  
 نہ جاوے۔

اس کے تخم ایک کیاری میں چھڑکواں۔ بو کر پنیری لگا لیں۔ جب پودے  
 چار پانچ انچہ اونچے ہو جاویں تو کیاریوں میں باقاعدہ قطاروں پر لگا دیں  
 قطاروں کا باہمی فاصلہ قریب ۱۵ انچہ کے ہونا چاہیئے۔ اور پودوں کا ایک  
 دوسرے سے قریب بارہ انچہ کے۔ دسویں بارہویں نلانی کرتے رہیں اور اگر  
 موسم خشک ہو تو ہفتہ میں دو مرتبہ پانی دینا واجب ہے۔

مولیوں کے بیان میں ایک تجربہ کار صاحب کا خاص تجربہ ولایتی  
 مولیوں کی کاشت کے بارہ میں یہ کیا گیا ہے۔ وہی تجربہ کار صاحب لکھتے ہیں  
 کہ اگر لیٹوس (کاہو) کو بھی بجھنے اُس طریق پر بویا جاوے جو ولایتی مولیوں کی نسبت  
 لکھا گیا ہے تو نتیجہ فو المراد بر آمد ہو گا۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ولایتی مولیوں  
 کی پنیری لگانے کی سفارش نہیں کی گئی۔ لیٹوس کی پہلے پنیری لگانے کی  
 سفارش کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے لیٹوس کے بیج ایک کیاری میں چھڑکواں بو دیں  
 جب پودے ۶ انچہ ہو جاویں تو انھیں مستقل طور پر کیاریوں میں بو دیں مگر  
 ہر ایک پودے کا چاروں طرف سے باہمی فاصلہ چھ چھ انچہ رہے۔ باقی سب  
 باتوں کے لئے وہی عمل کرنا چاہیئے جیسا کہ ولایتی مولیوں کے لئے لکھا گیا ہے  
 لیٹوس کی (کوس) اور (کے بیج) دونوں قسموں کی کاشت کے لئے یہی طریق  
 موزوں ہے۔



عام کیفیت ایک مرتبہ اگر اسکی ولایتی بیجوں سے کاشت کیجاوے اور پچھیتی فصل کے عمدہ پودوں سے تخم حاصل کر کے احتیاط سے رکھ چھوڑیں تو انھیں اگلی فصل میں ولایتی بیجوں کی جگہ بوسکتے ہیں۔ اسطرح سلسلہ وار تین چار سال تک اسی قسم کے بیج کام دیکھتے ہیں مگر تاہم تازہ بیج جو تخم فروشوں سے ہر سال خریدے جاتے ہیں زیادہ عمدہ ہوتے ہیں +

آلو

(Solanum Tuberosum)

(Potato)

انگریزی یا لاطینی نام  
پوٹے۔ پوٹے۔

ہندوستانی نام  
آلو

موسم کاشت

(بہاروں میں)

(سیدانوں میں)

اخیر فروری سے وسط اپریل تک

وسط ستمبر سے وسط دسمبر تک

بیان و استعمال

آلو درحقیقت ایک اعلیٰ درجہ کی ترکاری ہے۔ اہل ہند اسے کئی طرح استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ اُبال کر اور بھون کر بھی کھائے جاتے ہیں۔ چاٹ کے طور پر بھی انھیں کھاتے ہیں۔ رائتے میں ڈالتے ہیں۔ بڑیاں توڑتے ہیں اور موسوں اور کچوریوں میں بھرے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ + انگریز انھیں بالعموم اُبال کر اور اوپر سے نمک پرچ چھڑک کر کھاتے ہیں۔



ایئر لینڈ کے باشندوں کی بڑی کرامات آلو ہی ہیں جس سال یہ کم ہوتے ہیں یا اچھے پیدا نہیں ہوتے اُس سال انھیں سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اُن کی خوراک کا جزو عظیم آلو ہیں اور ساتھ ہی یورپ میں آلو بھی بیسیوں اقسام کے پیدا ہوتے ہیں۔ اور سب قد جسامت۔ رنگ اور ذائقہ میں ایک دوسرے سے کیسب قدر مختلف ہوتے ہیں \*  
**طریق کاشت آلوں کی کاشت میں چند امور کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے جنہیں ذیل میں بیان کیا جاتا ہے \***

جس جگہ آلو بونے ہوں وہ جگہ گشادہ ہونی چاہیئے۔ نہایت تنگ اور سایہ دار نہو جس میں ہوا اور روشنی کا گزر اچھی طرح سے ہو سکے۔ زمین طاقت ور ہو اور اُس میں کسی قدر ریت کا جزو بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ ایسی زمین جو بہت ٹھوس اور سخت ہو آلو کی کاشت کے لئے ناموزوں ثابت ہوتی ہے پھر اُس میں یہ بات اچھی طرح دیکھ لینی چاہیئے کہ وہ نشیب میں نہو ورنہ بارش وغیرہ کا فالتو پانی اُس میں دیر تک کھڑا رہے گا اور یہ صورت آلو کی فصل کے حق میں سم قاتل کا اثر رکھتی ہے۔ ڈھال ایسی رکھی جاوے کہ نائڈ پانی فی الفور بہ جاوے۔ یہ بھی خیال رہے کہ ایک ہی قطعہ زمین پر مُتواتر کئی سال تک آلو نہ بوئے جاویں ورنہ آلوں کی خاصیت اور عمدگی میں بہت فرق آجاوے گا۔ اگر دو سال ایک قطعہ میں آلو بوئے جاویں تو تیسرے سال وہاں گیہوں یا کوئی اور فصل بونی چاہیئے۔ پہاڑوں میں آلو کی کاشت کے لئے کھاد کی کم ضرورت ہوتی ہے۔ مگر میدانوں میں بونے سے



پہلے زمین کو درست کر کے خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ دینی چاہیئے مگر اعتدال کے ساتھ زیادہ نہیں۔ میدانوں میں زمین خواہ کیسی ہی طاقتور ہو کھاد مجموعہ آلوؤں کی کاشت کے لئے اشد ضروری ہے ورنہ پیداوار بہت کم اور ناقص ہو گی +

آلو بونے کے لئے مختلف رائیں ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے آلوؤں کے ٹکڑے جن میں دو دو آنکھیں ہوں بونے چاہئیں بعضوں کی یہ رائے ہے کہ درمیانہ میل کے آلوؤں کے صرف دو دو ٹکڑے کر کے بونے چاہئیں۔ بعضوں کی یہ رائے ہے کہ درمیانہ میل کے آلو لیکر سالم بونے چاہئیں۔ مگر بعض اشخاص یہ کہتے ہیں کہ درمیانہ درجہ کے آلو اگر بطور بیج بوائے جاویں گے تو آلو بھی درمیانہ میل کے پیدا ہونگے کیونکہ ادنیٰ قسم کے بیجوں سے ادنیٰ قسم کے آلو پیدا ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کے بیجوں سے اعلیٰ قسم کے غالب رائے یہی ہے کہ اعلیٰ درجہ کے آلو حاصل کر کے اور انکے ٹکڑے کر کے جن میں صحیح اور کامل دو دو آنکھیں ہوں بونے چاہئیں۔ ایک تجربہ کار صاحب کی یہ رائے ہے کہ بونے وقت اگر ٹکڑوں کو ذرہ سی پی ہوئی گندھک لگا دی جائے تو وہ کیڑے مکوڑوں کے گزند سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور آلو بہت عمدہ اور بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ گندھک کو پیسکر کسی مٹی کے برتن میں رکھ لیں اور ٹکڑوں کو ذرہ ذرہ لگا کر بونے جاویں یا ٹکڑوں پر گندھک چھڑک کر بویں۔ ایک ہی بات ہے + ہمارے ہاں آلوؤں کی کاشت میں لوگ بالعموم ایک بات کا مطلق خیال نہیں



رکھتے جس کو بد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ بوتے وقت  
 آلوؤں کی چھوٹی بڑی اقسام کی کچھ تفاوت نہیں کرتے اور سب کو یکساں  
 فاصلہ پر بودیتے ہیں۔ ولایت میں اس امر کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ بڑے  
 میل کے آلوؤں کی قطاریں اُن آلوؤں کی قطاروں کی نسبت زیادہ فاصلہ  
 پر ہوتی ہیں جن پر درمیانہ قسم کے آلو بوتے ہیں۔ بڑی اقسام کے آلوؤں  
 کی قطاروں کا ولایت میں فاصلہ مستوازی قریب ۳ فٹ کے رکھتے ہیں +  
 ہندوستان کے لئے تجربہ کاروں کی یہ رائے ہے کہ درمیانہ میل کے سالم  
 آلو یا بڑے آلوؤں کے ٹکڑے بونے چاہئیں۔ اگر بڑی اقسام کے آلو ہوں تو قطاروں  
 کا فاصلہ باہمی قریب ۳ فٹ کے ہونا چاہیئے ورنہ دو فٹ فاصلہ چھوٹی  
 یا درمیانہ قسم کے لئے کافی ہے۔ اگر آلو بڑی اقسام کے بونے ہوں تو  
 اُن کا ایک دوسرے سے قریب ۱۰ انچ فاصلہ رکھنا چاہیئے۔ اگر درمیانہ یا  
 چھوٹی قسم کے آلو بونے منظور ہوں تو فاصلہ ۸ انچ کافی ہے۔ آلوؤں کو  
 چار پہلیں انچ عمیق گاڑنا چاہیئے۔ بہت گہرے وا بنے سے نقصان متصور ہے  
 جوں جوں بیلین پھیلتی جاویں اور یہ معلوم ہو کہ اب آلو ترقی پذیرہ حالت  
 میں ہیں ویسے ہی قطاروں پر باہستگی مٹی چڑھاتے جاویں۔ ابتداء میں  
 اگر موسم خشک ہو تو تیسرے چوتھے دن پانی دینا چاہیئے۔ جب وہ پختگی پر  
 آویں جس کے آثار یہ ہیں کہ پتے زردی مائل ہوتے جاتے ہیں، تب پانی  
 دینا کم کر دیں۔ اور جب پتے بالکل مرجھا جاویں تب قطعی بند کر دیں۔ جب  
 یہ دیکھا جاوے کہ بیلین اعتدال سے زیادہ پھیلتی ہیں تو اُن کے سرے



اس طرح پنج دیں کہ پودوں کے عام نشو و نما میں فرق نہ پڑے۔ مگر فضول پھیلاؤ رک جاوے۔ پتوں کی افراط سے آلوؤں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ اُن کی خوراک کا بڑا حصہ پتوں کے نذر ہو جاتا ہے۔ جب آلو اُکھاٹے جاویں تو آہستگی سے کام کراویں ورنہ زخمی ہونے سے آلو جلد بگڑ جاتے ہیں۔ آلوؤں کو دھوا کر پہلے دھوپ میں پانچ چار گھنٹہ پھیلا کر خشک کر لینا چاہیئے اور پھر کوٹھوں میں بھر دیں۔ اگر درجہ وار یہ چھانٹ لیئے جاویں تو بونے والوں کو زیادہ نفع ہو سکتا ہے۔ ورنہ ملی جلی قسم کے آلو زیادہ دام نہیں پاتے۔ آلوؤں پر کچھ کیڑے مکوڑے بھی حملہ کرتے ہیں۔ جہاں اُنکی شروعات ہو وہیں اُن کے دفعیہ کا علاج کرنا چاہیئے +

ایک صاحب جنھیں آلوؤں کی کاشت میں خاص تجربہ حاصل ہے اور جنھیں سبز ترکاریوں کی نمائشگاہوں سے عمدہ آلو پیدا کرنے کے صلہ میں تمغے اور انعام ملتے رہے ہیں اپنے تجربہ کو اس طرح قلمبند کرتے ہیں :-

آلو تمام ایسی زمینوں میں جن میں گیہوں مٹر اور گوہی وغیرہ سبز ترکاریاں پیدا ہو سکتی ہیں بخوبی پیدا ہو جاتے ہیں۔ سدرتلی زمین میں بھی خوب پائس رکھاؤ دینے سے آلو ہو جاتے ہیں اور اُن میں بہت زیادہ چمک دمک ہوتی ہے لیکن ذائقہ اور جسامت میں وہ اعلیٰ درجہ کے نہیں ہوتے۔ میدانوں میں آلو وسط ستمبر سے وسط دسمبر تک بو سکتے ہیں اگیتی فصل کے لیئے زمین ایسی منتخب کرنی چاہیئے جس میں بارش کا زائد پانی دیر تک کھڑا نہ رہے ورنہ زور کی بارشوں میں بیجوں کے سرگل جانے کا



اندیشہ رہتا ہے (یوں تو وسط سمبر میں بارشیں ختم ہو جاتی ہیں۔  
 مگر جن علاقوں میں ہوتی ہیں ان میں اس بات کا خاص خیال رکھنا  
 چاہیئے) آلو ہمیشہ کشادہ جگہ بونے چاہئیں جہاں دھوپ اور ہوا کا پورے  
 طور پر گزر ہو سکے۔ ایسی زمینیں جہاں درختوں کا سایہ رہتا ہے۔ ہرگز  
 آلو کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ جس زمین پر آلو بونے ہوں اُسپر  
 پہلے خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ یا صطبل کی ریلہ بوسیدہ۔ یا گائے بیلوں  
 کے بوسیدہ گوبر کی کھاد تین چار انچہ موٹی تمام سطح پر ہموار پھیلوا دینی  
 چاہیئے پھر ہل چلوا کر مٹی اور کھاد کو خوب آمیز کر دیں پھر بعد ازاں قطاریں  
 ڈھائی دھائی یا تین تین فٹ کے فاصلہ پر بنا کر آٹھ آٹھ یا دس دس  
 انچہ کے فاصلہ پر آلوں کے ٹکڑے جن میں کم از کم دو دو آنکھیں ہوں  
 بونے چاہیئے۔ جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی ضرور  
 دیدینا چاہیئے حسب ضرورت نلای کرتے رہیں جب بیلیں بڑھنے لگجائیں  
 تب ازندھی کی کھلی راگرل سکے چورا کر کے قطاروں پر چھڑک دینے سے  
 بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ایک تو آلو خوب نشو و نما ہوتے ہیں دوسرے وہ  
 کیڑے مکوڑوں کے گزند سے بہت کچھ محفوظ رہتے ہیں۔ تخم جھانک ممکن  
 ہو سکے اعلیٰ درجہ کے اور بے واغ سنگوا کر بونے چاہئیں بعض تخم فروش  
 اگیتی فصلوں کے لیے کسی قدر خام آلو بھیج دیتے ہیں انکا بونا فضول ہے۔  
 کیونکہ نتیجہ حسب مراد نہیں نکلیے گا ایسی حالت میں جبکہ بیجوں کی جانب سے  
 شک ہو انہیں کسی سایہ دار مگر اندھیرے مقام میں جہاں اعتدال کے



مطابق ہوا اور روشنی کا گزر ہو) زمین پر بچھا دینا چاہیئے۔ اگر وہ پھوٹ نکلیں اور بالیدگی کے آثار نمایاں ہوں تو انہیں بو دینا چاہیئے ورنہ نہیں۔  
تخم فروشوں کی فہرستوں میں بیسیوں اقسام کے آلو ہوتے ہیں انہیں سے اپنے ذاتی تجربہ یا تجربہ کاروں کی رائے کے مطابق انتخاب کرنے چاہئیں۔  
عام خیال یہ ہے کہ آلوؤں کو جس قدر کھاد دی جاوے بہتر ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ زیادہ کھاد دینے سے سراسر نقصان متصور ہے۔ کیڑے مکوڑے ہستات سے کھیتوں اور کھاریوں میں نمودار ہو جاتے ہیں اور آلو ناقص اور بد شکل نکلتے ہیں۔ نومبر میں زیادہ تر آلو بوٹے جاتے ہیں۔ یہ آلو پاج کے اخیر میں کھودنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ اندازہ رکھیئے کہ جب عالم دہالوں (Lepidium Sativum) پاک کر خشک ہو جاوے اسی وقت آلوؤں کو کھود لیں ورنہ زیادہ دیر زمین میں دبے رہنے سے انکی حیثیت میں فرق آجاوے گا۔ اگر کھودنے کے بعد آلوؤں کو صاف اور خشک کر کے کسی سایہ دار جگہ میں جہاں ہوا کا پورے طرح پر گزر ہو تا رہے چھدرا کر کے بچھا دیا جاوے اور کبھی کبھی انہیں اُلٹے پلٹے رہیں تو وہ قریب ایک سال تک اپنی اصلی حالت پر قائم رہ سکتے ہیں۔ آلو زیادہ تر اسیوجہ سے خراب ہو جاتے ہیں کہ رسیلی ہوئی جگہ پر جہاں ہوا اور روشنی کا کم گزر ہوتا ہے کولوں میں ڈھیر لگا دیئے جاتے ہیں اس طرح سے اوپر کی تہوں کے آلو کسی قدر اچھے رہتے ہیں۔ نیچے کی تہوں کے آلو سیاہ پڑ کر بد ذائقہ ہو جاتے ہیں یا سڑ جاتے ہیں۔



آلوؤں کی فصل پر بعض اقسام کے کٹے کوڑے بھی حملہ کرتے ہیں  
 پس بہتر یہ ہے کہ روز مَرّہ ورنہ دوسرے روز ضرور کھیتوں میں چکر لگانا چاہیئے  
 اور نہایت غور سے دیکھنا چاہیئے کہ بیلوں پر موذی کیڑے تو حملہ آور نہیں  
 ہوئے۔ جہاں کسی کی صورت نظر آوے فی الفور انکا ماتحتوں سے اٹھوا کر  
 دفعہ کرا دینا چاہیئے اور بیلوں پر راکھ چھڑکنی چاہیئے۔ راکھ سے البتہ نرم و  
 نازک بیلوں کے مسام بند ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک دو دن میں ہی راکھ  
 شبّہم اور ہوا سے صاف ہو جاتی ہے۔ تنباکو کے پتوں کو جوش دیکر اور سرد  
 کر کے بیلوں پر چھڑکنا مفید ہے سبز سوسوں یا رائی یا اہل اہل کے بیجوں  
 کو پسوا کر اور پانی میں گھلوا کر بیلوں پر چھڑکنا کارگر ثابت ہو گا اگر آلوؤں  
 کی فصل کو ایک سال کسی قسم کا آزار لاحق ہو جاوے تو اُس کھیت میں  
 دوسرے سال آلو ہرگز نہ بوویں۔ کوئی اور فصل بو دینی چاہیئے۔ جو وقت  
 مریض فصل ختم ہو جاوے اُسی وقت اُسکی خشک بیلوں اور تمام کھیت  
 کے خس و خاشاک کو احتیاط سے جمع کرا کے خوب جلوا دینا چاہیئے۔ اور  
 راکھ کو کھیتوں میں بچھوا کر اہل چلوا دیں۔ دوسرے سال کسی اور جگہ آلو  
 بوویں اور بیج حتی المقدور باہر سے عمدہ منگواویں۔ مریض فصل کے آلوؤں  
 کا بیج ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیئے \*

آلو کی کاشت کی نسبت ایک یورپین صاحب اپنے مدت مدید کے  
 تجربہ کی بناء پر یوں فرماتے ہیں \*

”سب سے پہلے یہ امر خوب ذہن نشین کر لینا چاہیئے کہ آلو اُن پودوں میں



سے ہے جنہیں پوٹاش کے پودے کہتے ہیں۔ آلو کی کاشت میں پوری پوری کامیابی حاصل کرنے کی کلید یہ ہے کہ اسکی کاشت اُس زمین میں کی جاوے جس میں معقول مقدار میں پوٹاش موجود ہو۔ جس زمین میں پوٹاش کم ہوگی اُس میں آلو کی بھی پیداوار کم ہوگی۔ جسوقت آلو کے کھیت میں سے پوٹاش کا جزو کم ہو جاوے گا اُسی وقت آلو کی پیداوار میں کمی آجاوے گی۔ غرضکہ بغیر پوٹاش کے کوئی شخص آلو کی کاشت میں شاد کام نہیں ہو سکتا۔ جسوقت کھاد مجموعہ کھیت میں ڈالی جاتی ہے اُسوقت یہ مفہوم ہوتا ہے کہ کھیت کو پوٹاش کا ایک جزو دیا گیا ہے مگر کھیتوں کو معقول مقدار میں پوٹاش دینے کی سہل اور نہایت عمدہ ترکیب یہ ہے کہ درختوں کے خشک پتے۔ درختوں کی خشک شاخیں۔ ہر قسم کی خشک لکڑی۔ خشک جھاڑ جھنکار۔ کھیتوں کی ناکارہ گھاسیں اور تمام جلنے کے قابل کوڑا کرکٹ جمع کرا کے کھیتوں میں ڈھیر ہاں لگوا دی جائیں۔ بعد ازاں اُن میں آگ لگوا دیں۔ جب وہ اچھی طرح سے جل کر راکھ اور کوئلوں کا ڈھیر بن جاویں تو انھیں کھیت کے سطح پر پھیلوا دیں۔ دوسری بات جو آلو کی کاشت کے لیے نہ نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جن کھیتوں میں آلو بونے ہوں اُنکی جوتائی یا کھدائی بہت گہری ہونی چاہیے اور مٹی کو خوب باریک کرایا جاوے تاکہ کہیں سنگریزے اور ڈھیلے باقی نہ رہ جاویں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جسوقت آلو بونے ہوں اُسوقت دیکھ لینا چاہیے کہ زمین بہت تر یا گیلی تو نہیں ہے۔ گیلی اور اعتدال سے زیادہ تر زمین میں ہرگز آلو بونے نہیں چاہئیں۔ آلو اُسوقت بونے مناسب ہیں



جبکہ زمین ہمدار ہو۔ آلو کی فصل کو زیادہ پانی نہیں دینا چاہیئے ورنہ نتیجہ یہ ہو گا کہ پتے اور شاخیں بہت بڑھ جاویں گی اور آلو چھوٹے چھوٹے رہ جاویں گے۔ پانی حسب ضرورت دینا چاہیئے تاکہ بیلین خشک نہو جاویں کھیتوں کو جو کھاد مجموعہ دی جاوے وہ خوب بوسیدہ ہونی چاہیئے مگر اعتدال سے زیادہ نہ دیں ورنہ نتیجہ فو المراد بر آمد نہیں ہو گا۔ آلو بہت گہنے نہیں بونے چاہئیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ گہنے آلو بونے سے فصل زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آلوں کو جگہ پھیلنے کے لیئے پوری پوری ملے گی تو وہ زیادہ بڑے اور خوش ذائقہ ہونگے۔ اگر تھوڑی سی جگہ میں اچھی طرح سے کاشت کر سکیں تو وہ بہ نسبت زیادہ رقبہ کے جس کی لا پرواہی سے کاشت کی جاوے ہزار درجہ بہتر ہے۔ اس طرح سے بسا اوقات تھوڑی سی جگہ کا نفع بہ نسبت بڑے رقبہ کے جیسے واجب ترقی نہ کیا جاوے بہت زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک خاص امر جسے ہمیشہ تہ نظر رکھنا چاہیئے یہ ہے کہ صرف گہری کھدائی پر بس نہ کریں بلکہ جس قدر کھدائی کیجاوے اُس سب کی مٹی یکساں طاقت ور ہو۔ ورنہ اگر یہ معاملہ رہیگا کہ اوپر کی مٹی خوب کھاد آمیز اور طاقت ور ہے اور نیچے کی مٹی کمزور تو نتیجہ ہرگز خاطر خواہ بر آمد نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لینا بھی بڑی بھاری غلطی ہے کہ ہر ایک آلو بیج کا کام دیکھتا ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے بیج کے لینے عمدہ اور صحیح و سالم آلو ہٹا کر نئے چاشیں اور ہمیشہ آلو کا بیج غیر ضائع سے منگوا کر بونا چاہیئے۔ اگر اپنے ضائع کا بیج بونا منظور ہے تو کھیت کی مٹی اُس کھیت کی مٹی سے

۱۔ ایک تجربہ کار صاحب فرماتے ہیں کہ بونے وقت اگر آلوں کے ٹکڑوں کو محفوظ رکھا جائے یا دیوار (دیوار) کا پور جو کٹری چرنے سے گزرتا ہے لگا دیا جاوے تو آلو کی فصل کیڑے مکوڑوں کے گزند سے محفوظ رہتی ہے اور پھر کسی قدر کھاد کا بھی کام دے جاتا ہے ۴



نرانی ہونی چاہیئے جسکا بیج لیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی کو اب قریب قریب  
 تمام آلو کے بونے والے جنھیں فن زراعت سے کچھ سس ہے بہترین  
 خیال کرنے لگے ہیں۔ مجھے یہ بات سخت نا پسند ہے کہ آلو کے ٹکڑے  
 کر کے بوویں اس میں میرے خیال میں بیج کی بہت کچھ طاقت زایل ہو  
 جاتی ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنا وطیرہ یہ رکھا ہے کہ درمیانہ میل کے آلوں  
 کو سالم بو دیا اور نتیجہ حسب دلخواہ دیکھ لیا اب میں اپنے سستوار تجربات کا عملی  
 نمونہ پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک عرصہ ہوا اسی بیج پر میں نے ایک  
 قطعہ زمین میں جس کا طول ۴۰ فٹ اور عرض ۳۰ فٹ تھا۔ آلو بوئے۔  
 اس کیلئے کی ڈھائی فٹ گہری کھدائی کرائی اور تمام نیچے اوپر کی  
 مٹی کو ایک جان اور خوب باریک کر دیا۔ باغ میں دو درخت گرے ہوئے تھے  
 اور وہ خشک پڑے تھے۔ میں نے اُنکے ٹکڑے کرا کے جس کیلئے میں آلو  
 بونے تھے وہاں آگ دلوا دی۔ بہت جلد وہ راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اور  
 اس راکھ کو میں نے تمام کیلاری کے سطح پر پھیلوا کر تہ و بالا کرا دیا۔ بعد ازاں  
 بیس اقسام کے آلو منگوا کر ہر ایک میں صرف تین تین آنکھیں رہنے دیں  
 باقی چاقو سے نکال کر پھینک دیں۔ آنکھیں نکالنے کی وجہ سے جو گڑھے پڑ گئے  
 تھے۔ اُن میں راکھ بھر دی۔ انھیں بو دیا گیا۔ جب پودے کچھ بڑے ہو گئے  
 تو اُنکی جڑوں میں مٹی جس میں خشک راکھ اور کسی قدر سوٹ (Soot)

۱۔ سوٹ زبان انگریزی میں دھوئیں یا کاہل کو کہتے ہیں ولایت میں اسکی کھاد دیکھائی  
 ہے۔ انجنوں کی چینیوں اور آتش انوں سے اسے حاصل کیا جاتا ہے +




ملا ہوا تھا چڑھا دی۔ جب پودے کچھ اور بڑے ہو گئے تو انکی جڑوں میں  
 دو بارہ اسی طرح مٹی چڑھائی گئی۔ اس ترکیب سے بیلین بجائے زمین پر پھیلنے  
 کے ایسا وہ مٹی ہو گئیں۔ اخیر میں آلو اٹھا کر ایسی نمائشگاہ میں بھیجے گئے  
 جس میں بہت دور دور سے لوگ اپنے اپنے آلو لیکر انعام حاصل کرنے کے  
 لئے آئے تھے۔ مقابلہ سخت تھا مگر خوشی کا مقام ہے کہ میرے آلوؤں نے  
 سب کے آلوؤں کو ہر طرح سے ماند کر دیا اور مجھے درجہ اول کا انعام ملا  
 میں نے اپنے کھارے سے اس قدر آلو نکالے کہ لوگ بالکل حیران رہ گئے۔ ایک  
 ایک جڑ سے بڑے بڑے ہونہی گیارہ گیارہ آلو نکلے جنہوں نے نمائشگاہ میں بڑا  
 نام پیدا کرایا۔ اس امر کے اظہار سے میری اصل مراد یہ ہے کہ اگر کسی  
 شے کی توجہ اور شوق سے کاشت کی جائے تو فائدہ کثیر حاصل ہو سکتا ہے  
 میں نے مندرجہ بالا طریق کاشت سے فی ایکڑ ڈھائی سو من سے چار سو  
 من تک آلو حاصل کیے ہیں +

عام کیفیت۔ پہاڑوں میں بھی آلوؤں کی کاشت پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے  
 کیونکہ جب میدانوں میں ایسی آلوؤں کا نام و نشان بھی نہیں ملتا آفت  
 پہاڑی آلو مل جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے  
 البتہ جب موسم خشک ہو تو شروع شروع میں کسی قدر پانی دیدینا فصل  
 کے حق میں مفید ہوتا ہے۔ ایک ایکڑ قطعہ زمین کی کاشت کے لئے  
 ۳ بشل آلو کافی ہیں +

سہارنپور میں بالاوسط فی ایکڑ نو من پختہ آلو بطور بیج بولے جاتے ہیں



چونکہ قریب دو بیگوں کا ایک ایکڑ ہوتا ہے اس لیے ایک بیگھ کے لیے  $\frac{1}{4}$  من پختہ آلوینج کے لیے مطلوب ہوتے ہیں +



(*Agaricus Compestreis*)  
(Mushroom)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

مش عروم۔

کھم۔ کھمب۔ کھمبی۔

موسم کاشت

(رہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

اپریل سے اکتوبر تک

شروع ستمبر سے اخیر مارچ تک

بیان و استعمال

در اصل کھم ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام طور پر تازہ کم دستیاب ہوتی ہے اور ہندوستان میں سوائے برسات کے اور کبھی تازہ ہاتھ نہیں آتی۔ البتہ لاہور امرتسر میں خشک کھمبیں بہت گراں جاڑوں اور گرمیوں میں بھی مل جاتی ہیں۔ مگر فی الحقیقت ان میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جیسا کہ تازہ کھمبوں میں ہوتا ہے۔ عام رائے یہ ہے کہ کھمب کی ترکاری بہت لذیذ ہوتی ہے۔ بہت سے اشخاص اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ غالباً وجہ یہ ہے کہ کھم کی عورت کے سیقدر مشابہ اور کئی قسم کی خود رو کھمبیں



بھی ہوتی ہیں۔ یہ اکثر غلیظ مقامات پر خود بخود آگ آتی ہیں۔ اور ہرگز کھانے کے کام کی نہیں ہوتیں۔ بلکہ ہاتھ لگانے سے ہاتھوں میں بد بو آ جاتی ہے۔ اصلی قسم بہت اچھی اور قابل استعمال شے ہے۔ یورپ میں انکی بہت قدر کی جاتی ہے اور یہی سبب ہے کہ وہاں خاص خاص حکمتوں سے اسکی باقاعدہ کاشت ہونے لگی ہے۔ اہل فرانس اسکے بہت شائق ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے غاروں میں اسکی بکثرت کاشت ہوتی ہے۔ ہندوستان میں بھی اکثر اصحاب اسے روپیہ سیر خرید کر کھاتے ہیں۔ تانہ کھمبیں برسات میں کھیتوں میں مل جاتی ہیں۔

علاقہ کشمیر میں ایک قسم کی خود بخود پیدا ہوتی ہے جسے گچھی کہتے ہیں۔ لاطینی زبان میں اسے (*Morchella Esculenta*) کہتے ہیں اور انگریزی میں (*Morel*) (مورل) موسم برسات میں یہ کشمیر کے پہاڑوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگست ستمبر میں۔ بنوں۔ پشاور۔ راولپنڈی۔ لاہور اور امرتسر میں آ کر فروخت ہوتی ہے۔ اس کا نرخ فی سیر ایک روپیہ سے لیکر سوا دو روپیہ تک ہوتا ہے۔ خشک کر کے اسے مدت تک رکھ چھوڑتے ہیں اور یہ ذرہ نہیں بگڑتی۔ بعض مقامات میں اسے ”کانا کچھو“ بھی کہا جاتا ہے مگر پنجاب میں عام طور پر اسے گچھیاں کہتے ہیں۔ ضلع جھنگ کے جنگلوں میں بھی اسی قسم کی گچھیاں ہوتی ہیں مگر یہ تحقیق نہیں کہ کشمیر کی گچھیاں اور جھنگ کی گچھیاں ایک ہیں۔



دوسری کھم جو پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں خشک حالت میں گراں قیمت پر دستیاب ہو سکتی ہے اسکا نام ڈھینگری ہے۔ مجھے اسکے لاطینی نام کے تحقیق کرنے میں کسی قدر وقت پیش آئی۔ آخر بوسٹ جناب گولن صاحب اکانوک رپورٹر گورنمنٹ ہند (کلکتہ) سے دریافت کیا اور ساتھ ہی سالم ڈھینگریوں کا نمونہ بھیجا۔ آخر انھوں نے اس کا نام (*Pleurotus Cretaceus*) قرار دیا۔ ڈھینگری کا نرخ فی سیر ڈیڑھ روپیہ سے ڈھائی روپیہ تک رہتا ہے۔ پشاور میں یہ عمدہ ملتی ہیں اور زیادہ تر کشمیر باجوہ اور کابل سے آتی ہیں۔ ڈھینگریاں بھی خود رو پیدا ہوتی ہیں۔ طریق کاشت (کھم) سرد مقامات اور بالخصوص پہاڑوں میں کھمبیاں بآسانی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان میں بہت کم اشخاص اسکی کاشت سے واقف ہونگے۔ ذیل میں اس کی کاشت کا طریق لکھا جاتا ہے جسکا تجربہ ہر جگہ ہو سکتا ہے +

شمالی ہند کے میدانوں میں ستمبر سے مارچ تک اسے بوسکتے ہیں۔ اور پہاڑوں میں اپریل سے اکتوبر تک اسکی کاشت کا بہترین طریق یہ ہے کہ سایہ میں کی جاوے کسی خالی کوٹھڑی میں جہاں ایک روشندان کے ذریعہ مدھم روشنی اور ہوا آ سکے اسے بونا چاہیئے۔ یا کسی درخت کے سایہ تلے پھونس کے بنگلے سے بنا کر کاشت کر سکتے ہیں تاکہ گرمی۔ سردی۔ روشنی اور ہوا اعتدال کے مطابق پہنچے۔ کم و بیش نہونے پاوے گھوٹے کی لید کو روز مرہ منگوا کر کسی سایہ دار جگہ میں زمین پر پھیلوا دیں



اور کوڑے کرکٹ کو بکھواتے جاویں۔ ریلد اچھے صطبلوں کی ہونی چاہیئے  
 جہاں گھوڑوں کی پرورش کا پورا خیال رکھا جاتا ہو۔ پھر جہاں کاشت منظور  
 ہو وہاں کیاریاں بناویں۔ ہر ایک کیاری قریب ۸ فٹ لمبی ۳ فٹ  
 چوڑی اور ۳ فٹ ہی گہری ہونی چاہیئے۔ کیاریاں تین تین فٹ عمیق کھود کر  
 مٹی کا ایک طرف ڈھیر کر دیں اور سب سے پہلے کیاریوں میں اینٹوں  
 کے روڑے۔ چھوٹی چھوٹی اینٹیں اور ٹوٹے ہوئے مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے  
 بچھاویں۔ جب ہموار کچھ جاویں تو وہ ریلد جو اسی مطلب کے لئے جمع کی  
 گئی ہے اسے اس طرح سے بچھانا چاہیئے کہ اسکا دل با وجود پاؤں سے  
 یا کسی کھری سے خوب دباؤ جائے کے ۱۰ انچہ سے کم نہ ہو۔ پھر ۲ انچہ  
 اس ریلد پر اچھی باغیچہ کی مٹی جس میں ایک حصہ بوسیدہ گوبر اور ایک  
 حصہ بھیڑ بکری کی مینگنیاں ہوں بچھا دیں اور اسے بھی خوب دباویں۔  
 پھر اس پر پہلے کی طرح دس انچہ اونچی ریلد کی تہ دیں اور پھر ۲ انچہ  
 باغیچہ کی مٹی جس میں گوبر اور مینگنیوں کی ایک ایک حصہ کھاد ملی ہو  
 بچھاویں۔ اسی طرح تیسری تہ پہلے ریلد اور پھر مٹی کی دیں مگر یہ تینوں  
 تہیں یکساں ہوں۔ البتہ تیسری تہ پر جو سب سے اوپر ہو گی بجائے  
 ۲ انچہ کھاد دار مٹی کے ایک انچہ مٹی دیں۔ دو ہفتہ بعد ایک انچہ  
 مٹی اور چڑھاویں۔ یہ خیال رہے کہ اگر کیاریوں میں ڈالتے وقت ریلد  
 بالکل خشک ہو گئی ہو تو اسے پانی سے تر کر لینا چاہیئے۔ ولایت سے  
 تخم فروشوں کے پاس کھمبوں کے دو قسم کے سپان آتے ہیں۔ ایک



فرانسیسی سپان اور ایک انگریزی سپان۔ یہ در اہل کھنوں کے تخم کھلاتے ہیں جس سپان کو بونا مطلوب ہو اسے تیسری تہ پہ بو دیں۔ بالعموم انگریزی سپان گوبر کی پانچبوں میں بند ہو کر آتا ہے اور فرانسیسی سپان لید وغیرہ کی ٹیکوں میں مل کر آتا ہے۔ اگر انگریزی سپان بونا ہو تو اسکی ایک ایک اپنے مربع ٹیکیاں کر کے چھ چھ اپنے کے فاصلہ پر ایک ایک اپنے گہری گاڑ دیں۔ اور اگر فرانسیسی سپان بونا ہو تو اسے اس طرح مٹھڑے کریں کہ دل ایک اپنے رہے اور ہر ایک لکڑہ ۳ یا ۴ اپنے مڑتے ہو۔ اسے پندرہ پندرہ اپنے کے فاصلہ پر بونا چاہیے۔ گہرائی ایک اپنے کافی ہے +

بعض اصحاب اس طرح بھی کرتے ہیں کہ ۳ فٹ گہری کیاری کے نیچے پھولٹ اینٹیں اور اینٹ کے روڑوں کی تہ بچھا کر اسپر لید جس میں باغیچہ کی مٹی اور بوسیدہ گوبر کی کھاد چھڑھ اور دیار کی لکڑی کا بوڑ اور خشک بھیڑ بکری کی مینگنیاں ملی ہوتی ہیں بھر کر اور سطح کو ہوار کر کے خوب دبا دیتے ہیں اسپر سپان حسب ترکیب مندرجہ بالا بو دیتے ہیں۔ مگر یہ خیال رہنا چاہیے کہ باغیچہ کی مٹی۔ بوسیدہ گوبر کی کھاد اور بھیڑ بکری کی مینگنیاں ہم مقدار ہوں اور یہ تینوں مل کر بید کے پانچویں حصہ کے برابر رہیں۔ لکڑی کا بوڑ دو چار ٹھکیاں بہت ہے۔ کیاریوں کے تیار ہونے کے دو ہفتے کے بعد سپان بونا چاہیے۔ لید کیاری میں ڈالتے وقت اگر خشک ہو گئی ہو تو پانی سے فرا تر کر لیں + بعض اصحاب بجائے زمین میں بونے کے کھنوں کی کاشت لنبے چوڑے اور کھلے ہونے صدقوں میں کرتے ہیں۔ صدقوں کو قریب ۲ فٹ اونچی تہاڑوں



پر رکھ دیا جاتا ہے اور ان میں مندرجہ بالا ترکیب کے مطابق عمل کرتے ہیں  
 سپان بونے کے بعد دو مہینہ تک کھٹیں توڑنے کے قابل ہو جاتی  
 ہیں۔ جب سپان بون دیا جاوے تو تین کے فوارے سے بہت تھوڑا سا پانی  
 دے دیں جب کھٹیں نکل آویں تو ہفتہ میں دو مرتبہ فوارے سے پانی دیدیا  
 کریں مگر زیادہ نہیں +

عام کیفیت اگر لگا تار کھٹیں یعنی ہوں تو بہت سی کیاریاں بنائی  
 چاہئیں اور ان میں تین تین ہفتے بعد سپان بونا چاہیئے۔ اگر کیاریاں  
 نہ کھود سکیں تو لکڑی کے کھلے صندوق نما بڑے بڑے ڈھانچ بنوالیں۔ یہ  
 تین فٹ اونچے ہونے چاہئیں ان میں بھی وہی عمل ہو سکتا ہے جو کیاریوں  
 میں ہوتا ہے +



# ولایتی کاسنی

(Achorium Endivia)  
(Endiva)

انگریزی یا لاطینی نام  
انڈائیو

ہندوستانی نام  
ولایتی کاسنی

## موسم کاشت

پہاڑوں میں

(میدانوں میں)

اوسط پرج سے اخیر مئی تک

وسط اکتوبر سے اخیر نومبر تک

## بیان و استعمال

انگریز اسے بطور سلاط استعمال کرتے ہیں۔ اس کے پتوں کے لیئے اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ ساگ اس کا بہت اچھا بن سکتا ہے۔ یوں تو ولایت میں اس کی بہت سی قسمیں ہیں مگر دو بڑی مشہور ہیں۔ ایک چوڑے پتوں کی۔ دوسری گچھے دار۔

**طریق کاشت** اس کی کاشت بہت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ پہلے بطور پنیری ایک کیاری میں تخم چھڑکواں بو دیں۔ اوپر مٹی کا ہلکا سا غلاف چڑھا دیں۔ جب موسم خشک ہو تو روز مرہ ٹین کے فوارے سے پانی دیتے رہیں اور دن میں جس وقت دھوپ کی تیزی کا وقت ہو دو تین گھنٹہ کے لیئے سایہ دے دیں۔ جو وقت پودے کیسقل جاندار ہو جاویں پھر سایہ کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ جب پتے ابتدائی تین چار پتیاں بدل لیں تو انھیں اکھاڑ کر باقاعدہ



کیاریوں میں قطاروں پر لگاویں۔ قطاروں کا فاصلہ متوازی ایک ایک فٹ ہو اور اسی قدر فرق پودوں کا ایک دوسرے سے رہنا چاہیئے۔ قطاروں پر پودے لگاتے ہی کسی قدر پانی دیں اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دینا چاہیئے۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ نلائی بھی ضرور کرانی چاہیئے تاکہ پودے مرجھا نہ جاویں اور ناکارہ گھاسیں فصل کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اکثر اصحاب جب انڈاپوکالیٹ پر بیج جاتی ہے تو اس کے پتوں کو ہاتھ سے اوپر کی طرف سمیٹ کر گھاس پھوس سے پیٹ دیتے ہیں۔ اور پتلی رسی باندھ دیتے ہیں۔ دس بارہ دن میں پتے نرم اور قابل استعمال ہو جاتے ہیں۔ دوسری ترکیب یہ ہے کہ پودوں کے پتے ہاتھ سے پھیلا کر اور پودوں کے ارد گرد ایک ایک انچہ اوپنی ٹھیکریاں یا ٹوٹی اینٹیں رکھ کر اوپر مٹی کی بڑی بڑی سینکیں بنوا کر یا خرید کر الٹی ڈھک دیں۔ اس طرح دس پندرہ دن میں انڈاٹو سفید اور کھانے کے قابل ہو جائے گی۔

**عام کیفیت۔** پچانس گز لمبی قطار کے لیے ایک ادس تختہ کافی ہیں۔ اسی اندازہ سے تختہ ریزی کریں۔ تازہ ولایتی بیجوں کی فصل سے اگر عمدہ تختہ حاصل کر کے رکھ چھوڑیں اور ان سے دوسری فصل بوویں تو وہ ولایتی بیجوں سے بوئی ہوئی فصل سے کمتر نہیں ہوگی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے فصلوں کے بیجوں سے مدت تک کاشت کر سکتے ہیں۔ پتے باندھنے یا سنیک ڈھانپنے کے عمل کو انگریزی میں "بلائیٹنگ" کہتے ہیں۔ اس عمل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پتے یا گندیں سفید نرم اور خوش ذائقہ ہو جاویں۔



# سویا

(*Peucedanum Graveolens*)

(Dill)

انگریزی یا لاطینی نام  
ڈل -

ہندوستانی نام  
سویا - سووا

## موسم کاشت

(میدانوں میں) (پہاڑوں میں)  
شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک وسط پانچ سے اخیر مئی تک

## بیان و استعمال

سوئے کا ساگ اچھا بنتا ہے۔ بالعموم یہ پالک یا اور ساگوں کے ساتھ ملا کر بنایا جاتا ہے۔ اسکے تخم ادویات کے کام میں آتے ہیں +  
طریق کاشت کیاریوں میں انگلی سے آدھ انچ گہری قطاریں بناویں جنکی دوری ایک ایک فٹ ہونی چاہیئے۔ ان پر تخم چھڑکواں بو کر مٹی سطح کے برابر کر دیں۔ جب تخم اچھی طرح سے پھوٹ آویں تو انھیں اس طرح چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا باہمی فاصلہ ۹ انچ رہ جاوے۔ سویں باہیں تلائی کرتے رہیں۔ اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔ بس زیادہ ترؤ کی کچھ ضرورت نہیں۔ سویا خود بہت اچھی طرح سے آگ آوے گا +



عام کیفیت - سویا اکثر پھولوں کے گلدستوں میں بھی بعض اوقات خوبصورتی کے لئے لگا دیا جاتا ہے۔ ولایتی بیجوں سے اگر ایک مرتبہ فصل بو کر بیج حاصل کر لئے جاویں تو اُن سے مدت تک یکے بعد دیگرے فصلیں بو سکتے ہیں۔ تازہ بیج ہر سال منگوانے کی چنداں ضرورت نہیں۔

## پالک

(*Spinacia Oleracea*. Spinach)

(*Tetragonia* *Expansa*

Spinach New Zealand)

انگریزی یا لاطینی نام

پسی ناچ

ایضاً نیوزیلینڈ

ہندوستانی نام

پالک (دیسی)

ایضاً (ولایتی)

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

شروع پانچ سے وسط جون تک

شروع پانچ سے اخیر مئی تک

میدانوں میں

دیسی پالک وسط ستمبر سے وسط نومبر تک

پالک ولایتی بہاہ اکتوبر

## بیان و استعمال

ساگ اچھا بنتا ہے۔ انگریز انھیں سلاد کے طور پر بھی

استعمال کرتے ہیں +



**طریق کاشت** دیسی پالک کی کاشت معمولی بات ہے اور بہت آسان ہے اگر اسے لگا تار بویا جاوے تو یہ بہت دیر تک اُترتا رہتا ہے +  
 کیاریوں میں قریب پندرہ پندرہ انچہ کے فاصلہ سے آٹھ انچہ گہری قطاریں بنا کر تخم بو دیں جب وہ اچھی طرح سے پھوٹ آویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا باہمی فرق قریب ۹ انچہ کے رہ جاوے۔ جب پالک پھولنے پر آوے تو فی الفور اوپر کے سرے پھنچ دیں۔ بارہویں چودھویں نلائی کرتے رہیں اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ کیاریوں کو تر کر دینا کافی ہے +

ولایتی پالک گو دیسی پالک کی طرح نرم و نازک نہیں ہوتا مگر بہت دیر تک قائم رہتا ہے اور کھانے میں اچھا ہوتا ہے۔ اسکے تخم پہلے کسی کیاری میں بطور پسیری چھڑکواں بو دینے چاہئیں۔ جب پودے ۴ انچہ کے قریب اُونچے ہو جاویں تو انھیں اکھاڑ اکھاڑ کر کیاریوں میں قطاروں پر لگا دیں۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ قریب تین تین فٹ کے ہو اور پودوں کا ایک دوسرے سے قریب دو دو فٹ کے رہنا چاہیئے۔ پودے بہت اُونچے جاتے ہیں اور خوب پھیلنے لگتے ہیں۔ خشک موسم میں ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دیدینا چاہیئے اور بارہویں چودھویں نلائی کر دینا بھی ضروری ہے +

**عام کیفیت** دیسی پالک کے بیج ۵ گز لمبی قطار کے بیٹے تین اُونس اور ولایتی پالک کے تخم ۵ گز لمبی قطار کے بیٹے ایک اُونس کافی ہیں +  
 ولایتی پالک کے بیج تیسرے سال تازہ خریدنے چاہئیں۔ کیونکہ یکے بعد دیگرے



مضلوں کے بیجوں سے جو فصلیں بولی جاتی ہیں وہ بہت جلد اپنی اصلی حالت کو تبدیل کر دیتی ہیں \*

# کھٹا پالک

Sorrel

(Rumex Acetosa)

انگریزی یا لاطینی نام  
سورل - ریو مکس - ایسی ٹو سا -

ہندوستانی نام  
کھٹا پالک - چوکا پالک

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پلج سے اخیر مئی تک

ماہ اکتوبر

## بیان و استعمال

اس پودے کی محض پتوں کے لئے کاشت کی جاتی ہے۔ انگریز اسکے پتوں کو سلاو میں ڈال لیتے ہیں۔ مگر اہل ہند اسے ویسی پالک کی طرح کٹی طرح سے بنا سکتے ہیں۔ کھٹے پالک کی کئی اقسام ہیں لیکن طریق کاشت سب کا یکساں ہے۔ طریق کاشت پہلے کیاریوں کو خوب درست کر کے ایک ایک فٹ کے چالہ پر قطاریں بنالیں۔ اگر قطاروں کی جائے وقوع ایسی ہو کہ انھیں کسی قدر سایہ ملتا رہے تو بہت ہی اچھا ہے۔ قطاروں پر چھڑکواں بیج بویں جب وہ آگ کر تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک



پودے کا باہمی فاصلہ تین چار انچہ کے قریب رہنا چاہیے۔ دسویں بارھویں سالائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے + پہاڑوں میں کھٹے پالک کے پودے میدانوں کی نسبت بہت بڑے ہوتے ہیں۔ اسلیئے پہاڑوں میں قطاروں کا باہمی فاصلہ ۱۵ انچہ ہونا چاہیئے اور پودوں کا باہمی فرق ایک ایک فٹ + عام کیفیت۔ بہتر یہ ہے کہ کئی قسم کا کھٹا پالک بویا جاوے کیونکہ ہر ایک قسم کے کھٹے پالک میں ضرور کچھ نہ کچھ ذائقہ میں فرق ہو گا +

## میتھی

(*Trigonella Faenum Graecum*)

نام	ہندوستانی نام
انگریزی یا لاطینی نام	میتھی
ٹرامٹی گو نلا۔ فے نم گرے کم۔	

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

اخیراج سے اخیڑی تک

اخیڑی سے اخیڑی تک

## بیان و استعمال

اسکا ساگ بہت لذیذ ہوتا ہے۔ دال اور آکو وغیرہ کے ساتھ بھی ملا کر اسے بناتے ہیں۔ اسکے تخم بطور مصالحہ کے کام آتے ہیں + طریق کاشت۔ یہ ساگ بہت جلد اور آسانی پیدا ہو جاتا ہے۔ کیاریوں کو



خوب درست کر کے اُن میں بڑے بڑے مربع خانے بنائیں تاکہ پانی دینے میں سہولیت رہے۔ تخم چھڑکواں بو کر اُن پر ہلکا سا مٹی کا غلاف دیں اگر موسم خشک ہو تو کیاریوں کو ترک کر دیں۔ جب پودے پھوٹ آویں تو اس طرح چھانٹ دیں کہ جہاں گھسنے ہوں وہاں کم ہو جاویں ورنہ وہ اچھی طرح سے بڑھ اور پھیل نہیں سکیں گے۔ شروع میں بارھویں چودھویں نلایں کرتے رہیں اور جب موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ ضرور پانی دیدینا چاہیئے۔

**عام کیفیت** میتھی بالعموم دو قسم کی ہوتی ہے ایک پست قامت اور چھوٹے پتوں کی۔ اس کے پتے زیادہ سبز اور بہت پتلے ہوتے ہیں دوسری قسم میتھے کہلاتی ہے۔ اس کے پودے اونچے۔ پتے چوڑے۔ سفیدی مائل سبز۔ اور قل دار ہوتے ہیں۔

بعض مقامات کی میتھی نہایت خوشبودار اور لذیذ ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے اچھے تخم حاصل کر کے بوئے چاہئیں۔ خاص خاص آچاروں میں میتھی کے تخم بطور مصالحہ استعمال کیئے جاتے ہیں۔



# کاسنی

(Cichorium Intybus)

(Chicory)

انگریزی یا لاطینی نام  
چکوری

ہندوستانی نام  
کاسنی

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط پاج سے اخیر مئی تک

وسط ستمبر سے اخیر اکتوبر تک

بیان و استعمال

کاسنی کے نرم اور چھوٹے چھوٹے پتوں کا ساگ عمدہ بنتا ہے۔ اہل یورپ اس کے پتوں کو (Blanch) (سفید کر کے) بطور سلااد استعمال کرتے ہیں۔ اس کی جڑ کو خشک کر کے بھون کر اور پیس کر قہوہ کے ساتھ ملا کر پیتے ہیں۔ اس کے ہرے پتوں اور جڑ کو دسی طبیب ادویات کے کام میں زیادہ تر لاتے ہیں۔ کاسنی اسوقت بالعموم ادویات کے لئے بوئی جاتی ہے۔

طریق کاشت یکداریوں کو درست کر کے ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر ایک ایک انچہ گہری قطاریں بناویں اور انہیں بیجوں کو چھڑکواں بو کر باریک مٹی کا غلاف چڑھا دیں۔ جب پودے قریب چار انچہ او پختے ہو جاویں تو



انہیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کا باہمی فرق قریب  
۶ انچہ کے رہ جاوے۔ اگر پتوں کو بطور سلاخ استعمال کرنا مد نظر ہے تو  
پودوں کی باہمی دوری قریب پندرہ انچہ کے ہونی چاہیئے۔ پندرہویں سولہویں  
نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے  
دینا کافی ہے +

عام کیفیت بلائچ (سفید کرنے کا) طریق پہلے بیان ہو چکا ہے۔  
کسی گملہ یا سٹی کی سینک کو الٹا کر کے دس پندرہ دن تک پودوں  
پر رکھیں پتے نہایت ملائم اور سفید ہو جاویں گے مگر دن کو گھنٹہ دو گھنٹہ  
کے لئے گملے یا سینک کو پودوں سے علیحدہ کر دینا چاہیئے۔ ایک تجربہ کار صاحب  
لکھتے ہیں کہ کاسنی کے پتے موشیوں کے لئے نہایت عمدہ اور مقوی چارہ  
ہے مگر ہندوستان میں کاسنی کی کاشت شاذ و نادر ہی کسی جگہ اس  
مطلب کے لئے کی جاتی ہوگی۔ ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ کاسنی  
کشمیر اور کوہ ہمالیہ میں ساڑھے پانچ ہزار فٹ کی بلندی تک خود رو  
پائی جاتی ہے +



# دُودل

(*Leontodon Taraxacum*)

(Dandelion)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

ڈن ڈے لی ان

دُودل - کن پھول

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر ستمبر تک

وسط ستمبر سے وسط اکتوبر تک

بیان و استعمال

اس ترکاری کی ہندوستان میں شاذ و نادر کاشت کی جاتی ہے حالانکہ اسکا استعمال اہل ہند کے لیے بلحاظ صحت نہایت مفید ہے۔ یورپین اصحاب اسکی گندلوں کو بطور سلاو کھاتے ہیں اور اکثر اشخاص اسے کاسنی کی سلاو پر ترجیح دیتے ہیں نیز اس کی جڑوں کو پہلے سکھا کر بھون لیا جاتا ہے اور پھر پیسکر بطور قہوہ یا قہوہ (Coffee) کے ساتھ ملا کر پیتے ہیں۔

ادویات میں بھی اس پودے سے کام لیا جاتا ہے +

طریق کاشت - کیاریوں کو درست کر کے ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر قطاریں بنائیں اپنریج چھڑکواں بو دیں۔ جب پودے قریب تین انچ اونچے ہو جائیں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری



ایک ایک فٹ رہ جاوے۔ شروع میں دسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔ جب پودوں میں اچھی طرح سے گندلیں نکل آویں تو انھیں کاسنی کی طرح سنیک وغیرہ ڈپک کر سفید (بلا بچ) کر لینا چاہیئے +

عام کیفیت۔ جب پودے پھولنے پر آویں تو اسی وقت شگوفے توڑ دینے چاہئیں تاکہ گندلیں سخت نہ ہو جاویں اور بیج پک کر ہوا سے اڑ نہ جاویں +

## کارن سلاڈ

(Corn Salad, Lamb Lettuce, or Feticus)

(Valerianella Olitoria or  
Fedia Olitoria)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کارن سلاڈ

+

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط پانچ سے اخیر جون تک

شروع نومبر سے اخیر نومبر تک

وسط ستمبر سے وسط اکتوبر تک

## بیان و استعمال

اہل یورپ بہت شوق سے اسے بطور سلاڈ استعمال کرتے ہیں اس کی



ترکاری بھی عمدہ بن سکتی ہے +

طریق کاشت گملوں یا چوڑے چوڑے کونڈوں میں بیج چھڑکواں و کر  
پنیری پیدا کر لیں۔ جب پودے چار انچہ کے قریب اونچے ہو جاویں تو  
انہیں اکھاڑ اکھاڑ کر کیاریوں میں قطاروں پر لگاویں۔ قطاروں کا باہمی  
فاصلہ نو نو انچہ اور پودوں کی باہمی دوری چھ چھ انچہ کافی ہے۔ بعد  
از اس حسب ضرورت نلائی کرتے رہیں اور پانی دیتے رہیں +  
عام کیفیت یورپ میں گلن سلاد کی کئی قسمیں ہیں +



# باب پنجم

موسم سرما کے ہرے مصالحو

سونف

Aniseed

(Pimpinella Anisum)

نام	انگریزی یا لاطینی نام
سونف	(اینی سیڈ) (ریچم پی نیلا۔ انی سم)
	موسم کاشت

(میدانوں میں)	(پہاڑوں میں)
وسط اکتوبر سے اخیر نومبر تک	شروع اپریل سے اخیر مئی تک
	بیان و استعمال

سونف ہندوستان میں کئی طرح سے استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ تر اسے بطور مصالحو کام میں لاتے ہیں۔ کچھی کھائی جاتی ہے۔ مصالحوں کے ساتھ پیسی جاتی ہے۔ ترکاریوں میں سالم ڈالی جاتی ہے۔ آچار وغیرہ میں پڑتی ہے۔ بعض مٹھائیوں میں ڈالی جاتی ہے۔ ادویات کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کا عرق نکال کر عرق بادیان کے نام سے فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکے ہرے خوشوں کو اہل یورپ زینت کمرہ اور میزوں کی



ترتیب کے یٹے مصرف میں لاتے ہیں +

طریق کاشت کاریوں کو ہر طرح سے درست کر کے نو نو انچہ کے فاصلہ پر انگلی یا کسی لکڑی سے قطاریں بناتے جاویں جن کی گہرائی آدھ انچہ کے قریب ہو۔ ان میں بیج چھڑکواں بودیں۔ اور جب پودے تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری قریب چار انچہ کے رہ جاوے۔ بعد ازاں جب تک پودے خوب تناور نہ ہو جاویں دسویں پندرھویں نلانی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو نو

ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے +

عام کیفیت ایک رسالہ کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ یورپ میں سفوف کا تیل بھی نکالا جاتا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ ۱۱ جولائی ۱۹۹۷ء کو لندن کی سندھی میں آدھ سیر سفوف کے تیل کا نرخ ۹ شلنگ ۶ پنس سے لے کر ۱۲ شلنگ تک تھا۔ اوسط قریب ۹ روپیہ فی سیر کے ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ تجارت کی غٹے ہے +



# سُنبل ختائی

(Archangelica Officinalis)  
(Angelica)

ہندوستانی نام

سُنبل ختائی

انگریزی یا لاطینی نام

انجلیکا (آرچن جے لیکا۔ آئی۔ بی۔ نے۔)

موسم کاشت

میدانوں میں

(پہاڑوں میں)

شروع اپریل سے آخر ستمبر تک

وسط اکتوبر سے آخر نومبر تک

بیان و استعمال

اس کے پتوں کے وسط کی نیس (سلیری) کی طرح استعمال کی جاتی ہیں۔  
نیز شکر کے قوم کے ساتھ ان کی نہایت عمدہ مٹھائی بنائی جاتی ہے۔ اور  
نسوں کا مڑبہ بھی طیار کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ (Angelica Glaucia)  
جسے ویسی زبان میں ”چھورا“ کہتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ میں دس ہزار فٹ کی  
بلندی تک خود رو پیدا ہوتا ہے۔ اور بقول ڈاکٹر کلگہارن صاحب اسکی  
جڑیں نہایت خوشبو دار ہوتی ہیں جنھیں بطور مصالحوہ خوراک کے ساتھ  
استعمال کیا جاتا ہے +

طریق کاشت کیاریوں کو درست کر کے ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر



انگلی یا لکڑی سے قطاریں بنا لیں۔ ان قطاروں میں بیج چھڑکواں بو کر اوپر  
 سے ہلکا سامٹی کا غلاف دیدیں۔ جب پودے کسی قدر اونچے ہو جاویں تو  
 جہاں سے گنجان ہوں وہاں سے چھانٹ دیں تاکہ ہر ایک پودے کا  
 باہمی فاصلہ قریب ۶ انچہ کے رہ جاوے۔ اکھاڑے ہوئے پودوں کو پینیری کے پودے  
 سمجھ کر جہاں چاہیں اسی قدر فاصلہ پر لگا دیں۔ شروع میں اگر موسم خشک  
 ہو تو پانچویں چھٹے پانی دیتے رہیں اور دسویں بارھویں نکائی کرا دیں۔  
 جب پودے تناور ہو جاویں تو دسویں بارھویں پانی دینا کافی ہے \*  
 عام کیفیت ٹھیک وقت پر فصل کاٹنے کا پورا خیال رکھنا چاہیئے  
 ورنہ کٹف جاتا رہے گا۔ پیشتر اس کے کہ پودوں پر پورے طور پر شکوفہ  
 آجاوے فصل کاٹ لینی چاہیئے۔ یہ کام ایسے دن کرنا چاہیئے جبکہ مطلع  
 خوب صاف اور دھوپ نکلی ہوئی ہو۔ جھٹ پٹ فصل کو خشک کر کے  
 ایسی بوتلوں میں بند کر دینا چاہیئے کہ ہوا کا اُن میں ذرہ بھی گزر نہو۔ اگر  
 بال کے برابر بھی ہوا کی آمد و رفت کا راستہ رہ جاوے گا تو مال کی حیثیت  
 میں فرق آ جاوے گا \*



# بد رنگ

(*Melissa Officinalis*)

[Balm]

انگریزی یا لاطینی نام	ہندوستانی نام
بام۔ (میلیسا آفی سی نے لس)	بد رنگ

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)	(میدانوں میں)
شروع اپریل سے آخر مئی تک	وسط اکتوبر سے آخر نومبر تک

بیان و استعمال

یہ بھی ایک قسم کا ہر مصالحہ ہے۔ مگر اہل یورپ اسے زیادہ تر چاء میں ڈالتے ہیں +

طریق کاشت طریق کاشت بجنہ وہی ہے جو سنبل ختائی کی نسبت لکھا گیا ہے +

عام کیفیت فصل کاٹنے کے لیے وہی مراتب مقرر رکھنے چاہئیں جو کہ سنبل ختائی کے ضمن میں بیان کیے گئے ہیں +



# ریحان

*Ocimum Basilicum* (Sweet Basil)

*Ocimum Minimum* (Bush Basil)

*Ocimum Sanctum*

انگریزی یا لاطینی نام  
سویٹ بیسل - راوسی مم بے سی لی کم  
بش بیسل - (اوسی مم می نی مم)  
(اوسی مم سنکٹم -

ہندوستانی نام  
ریحان - گلال ٹلسی -  
گلال ٹلسی -  
ٹلسی -

## موسم کاشت

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک

## بیان و استعمال

گلال ٹلسی دراصل ایک ہر خوشبو دار مصالحہ ہے۔ اسکی کاشت زیادہ تر اسکے پتوں کے لیے کی جاتی ہے جنہیں بطور مصالحہ استعمال کرتے ہیں۔ ٹلسی کے پتے بھی بجنسہ وہی کام دے سکتے ہیں جو گلال ٹلسی کے دیتے ہیں۔ طریق کاشت گملوں میں باریک مٹی اور کسی قدر باریک پتوں کی کھاؤ دیکر یا کسی کیاری میں مٹی کو خوب باریک کر کے اور پتوں کی کھاؤ دیکر تخم چھڑکواں بو دینے چاہئیں۔ جب پودے کسی قدر بڑے ہو جاویں تو انہیں اکھاڑ اکھاڑ کر یا تو کیاریوں میں لگا دیں یا گملوں میں۔ اگر گملوں



میں لگانے ہوں تو یہ اندازہ رکھنا چاہیئے کہ ۱۲ انچہ کے گیلے میں صرف پانچ پودے لگائے جاویں اور اگر کیاریوں میں لگانے ہوں تو پہلے قطاریں بنالیں جنکا باہمی فاصلہ قریب پندرہ پندرہ انچہ کے ہو۔ ان قطاروں میں ایک ایک فٹ کے فرق سے پودے لگادیں۔ جہتک پودے بہت بڑے نہو جاویں تب تک بارہویں چودھویں نلمائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے \*

عام کیفیت اگر گلال تسلی کو گملوں میں بویا جاوے تو وہ برسات کے خاتمہ تک سرسبز رہ سکتی ہے۔ اگر کیاریوں میں بولی جاوے تو برسات میں ختم ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں میں بھی طریق کاشت وہی ہے جو اوپر بیان ہوا ہے \*



# بوراج

(Borago Officinalis)  
(Borage)

انگریزی یا لاطینی نام  
بوراج

ہندوستانی نام  
+

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع اکتوبر سے اوسط نومبر تک | شروع پانچ سے آخر مئی تک  
بیان و استعمال

اسکے پتے اور پھول سجاوٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور بطور  
ہرے مصالحے بھی کام میں لائے جاتے ہیں +

طریق کاشت اسے گملوں میں بونا چاہیے یا کھلے صندوقوں اور ناندوں  
میں۔ گملوں اور ناندوں وغیرہ میں باغیچہ کی مٹی بھر کر اس میں خوب  
بوسیدہ گوبر اور پتوں کی کھاؤ شامل کر کے یکجان کر دیوں۔ بعد ازاں انہیں  
بج چھڑکواں بو کر پھیری پیدا کر لیں۔ جب پھیری چار انچہ کے قریب اُونچی  
ہو جاوے تو پودوں کو کیاریوں میں اٹھارہ اٹھارہ انچہ کے چوگرد فاصلہ پر  
لگا دیں۔ مگر پہلے کیاریوں کو ہر طرح سے درست کر لینا چاہیے۔ پندرہویں  
سولہویں نلانی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ



پانی دے دینا واجب ہے۔  
 عام کیفیت ہندوستان میں اس مصالحوہ کو شاذ و نادر بولتے ہیں۔  
 اگر بویا جاوے تو بہ آسانی تمام پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی حیثیت  
 میں ذرہ فرق نہیں آتا +

زیرہ

(Carum Carui)

(Caraway)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

کے رے رے

زیرہ۔ سیاہ زیرہ۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر اپریل تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

یہ امر ذہن نشین رکھنا چاہیئے کہ سیاہ زیرے اور سفید زیرے اور کالی  
 زیری وغیرہ میں فرق ہوتا ہے۔ سیاہ زیرہ جسے کشمیری زیرہ بھی کہتے ہیں  
 کوہ ہمالیہ میں ساڑھے چودہ ہزار فٹ کی بلندی تک خود رو پایا جاتا ہے  
 نیز علاقہ کشمیر اور بعض خشک قطعات میں جو دریائے ستلج اور چناب پر  
 واقع ہیں یہ اپنے آپ پیدا ہو جاتا ہے۔ زیرہ کے پتے سجاوٹ کے کام  
 میں آتے ہیں اور زیرہ بطور مصالحوہ استعمال کیا جاتا ہے۔ درحقیقت یہ



بہت عمدہ خوشبو دار چیز ہے۔ ادویات میں بھی اسے ڈالا جاتا ہے۔ زیرہ  
 سفید جسے لاطینی زبان میں (*Euminum Cuminum*)  
 کہتے ہیں داوئی پشاور کی شمالی پہاڑیوں میں بکثرت خود رو پایا جاتا ہے۔ نیز کوہ  
 ہمالیہ میں دس ہزار فٹ کی بلندی تک یہ اکثر مقامات پر افراط سے دیکھا  
 جاتا ہے یہاں سے اسے جمع کر کے شہروں میں لوگ فروخت کرنے کے  
 لئے لاتے ہیں۔ جنگلی زیرے کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں سے چند قسمیں  
 کوہ ہمالیہ کے اُس حصہ میں جو پنجاب میں واقع ہے ساڑھے گیارہ ہزار فٹ  
 کی بلندی تک پائی جاتی ہیں مثلاً (*Bupleurum Marginatum*)  
 یعنی کالی زیری۔ اسکی جڑ کھود کر پہاڑ کے باشندے کچی کھا جاتے ہیں اور بیج  
 بطور زیرہ شہروں میں فروخت کے لئے بھیج دیتے ہیں (*Artemisia*  
*Elegens*) اسے ویسی زبان میں "چوڑی سرج" کہتے ہیں۔ اسکے پتوں اور زنجوں کو ٹاٹھ  
 سے نلنے سے عمدہ خوشبو آتی ہے۔ برسات میں یہ پودا اکثر مقامات میں خود رو  
 پیدا ہو جاتا ہے اور مویشی اسے گھاس کے ساتھ کھا جاتے ہیں۔ اسکے  
 پتے اور بیج ادویات کے مصرف میں بھی لائے جاتے ہیں۔ کالی زیری مصالحو  
 کے طور پر کہیں استعمال نہیں ہوتی۔ یہ صرف ادویات میں کام آتی ہے۔  
 مگر اسکی بھی دو قسمیں ہیں ایک اصلی اور ایک نقلی اصلی کالی زیری کا لاطینی  
 نام (*Serratula Anthelmintica*) ہے بعض اصحاب اسے  
 (*Vernonia Anthelmintica*) بھی کہتے ہیں۔ غرضیکہ جو زیرہ بطور مصالحو  
 استعمال کیا جاتا ہے اور جس کی عام طور پر کاشت کی جاتی ہے اُس کا



لاطینی نام (Carum Carui) اور انگریزی نام (Caraway) ہے۔ کاشت کا طریق ذیل میں لکھا جاتا ہے :

طریق کاشت کیاریوں میں ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر ایک ایک انچ گہری قطاریں بنا کر ماہ اکتوبر میں تخم چھڑکواں بو دیں۔ کیاریوں میں زیادہ کھاد دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر زمین کمزور ہو تو کسی قدر کھاد مجموعہ یا پتوں کی کھاد دے دیں۔ جب پودے کسی قدر اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری نو نو انچ کے قریب رہ جاوے۔ پسند رھویں سوٹھویں نلانی کرنے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے۔ البتہ تخم ریزی کے بعد جب تک پودے بڑے نہو جاویں کیاریوں کو کسی قدر تر رکھنا چاہیئے :

عام کیفیت سفید زیرے کو بھی اسی طرح سے بو سکتے ہیں :



# چایوز

(Allium Schoenoprasum)

(Chives or Cives)

(French Ciboulette)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

چایوز

+

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پانچ سے اخیر مئی تک

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک

## بیان و استعمال

چایوز کی کاشت محض اسکے پتوں کے لیئے کی جاتی ہے۔ ہرے اور نرم پتے بطور مصاحہ ترکاریوں اور سلاد وغیرہ میں استعمال کیئے جاتے ہیں۔ ہندوستان میں اس کی بہت کم کاشت کی جاتی ہے۔ اگر کی جاوے تو پوری کامیابی ہو سکتی ہے۔ اس کے پتے اخیر تک کاٹ لینے چاہئیں دوسرے بہت جلد نکل آتے ہیں۔ اور جوں جوں کاٹتے جاویں پتے نرم سے نرم نکلتے چلے آتے ہیں :

طریق کاشت اس کی کاشت یا تو بیجوں سے کی جاتی ہے یا جڑوں کے ذریعہ لینے کسی بڑی جڑ کو لیکر اس میں سے چھوٹی چھوٹی جڑیں



علیحدہ کر کے لگا دیتے ہیں) اس کے بیج بہت کم دستیاب ہوتے ہیں  
 اور اگر ملتے ہیں تو بڑے بڑے سوداگران تخم کے کارخانوں سے گراں  
 قیمت پر ملتے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ بیج کرپودوں کی جڑوں کو آئندہ  
 کاشت کے لیے محفوظ رکھنا چاہیئے۔ پہلے گملوں کو باغیچہ کی مٹی سے پُر  
 کر دینا چاہیئے جس میں کسی قدر کھاد مجموعہ ملی ہوئی ہو۔ بعد ازاں ان  
 میں بیج بوسیدیں۔ تخم ریزی کے ڈیڑھ مہینہ بعد پودے گملوں کی سطح پر  
 خوب پھیل جاوینگے۔ اسوقت ہر ایک گملے کے چھتے کو بارہ حصوں میں تقسیم  
 کر دیں۔ اگر کیاریوں میں انھیں لگانا ہو تو چھ چھ انچہ کے چوگرد فاصلہ پر  
 لگادیں۔ اگر قطاروں پر لگانا منظور ہو تو ان کا متوازی فاصلہ قریب ایک  
 فٹ کے ہونا چاہیئے۔ اور پودوں کی باہمی دوری قریب آٹھ انچہ کے رہنی واجب  
 ہے۔ دسویں بارھویں نلائی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ  
 میں دو ایک مرتبہ کیاریوں کو تر کر دیں +  
 عام کیفیت اکثر اصحاب اس مصالحو کو پیاز کا بدل کہتے ہیں +



# پیاز

(Allium Cepa)

(Onion)

انگریزی یا لاطینی نام  
ادنی ان

ہندوستانی نام  
پیاز

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پچ سے اخیر مئی تک

وسط اکتوبر سے وسط نومبر تک

## بیان و استعمال

پیاز زیادہ تر بطور مصالحہ کے استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کا سرکہ وغیرہ میں آچار بھی ڈالا جاتا ہے۔ ترکاری اور لچھا بھی بنتا ہے۔ اس کا عرق ادویات کے کام میں آتا ہے۔ اور کچا بھی کھایا جاتا ہے۔ اکثر اصحاب اسے اس کی بو کی وجہ سے نہیں چھوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ عام طور پر جو پیاز دستیاب ہوتا ہے وہ قابل تعریف نہیں ہوتا۔ لیکن پیاز کی بیسیوں قسمیں ہیں اور ان میں سے بہت سی ایسی ہیں کہ جنکی جتنی توصیف کیجائے بجا ہے۔ پیاز کی دلائی قسمیں بہت عمدہ ہوتی ہیں مگر قباحت یہ ہے کہ ولایت سے جس قدر پیاز کے بیج آتے ہیں انکی بڑی مقدار ٹھنڈی کے بعد بالعموم پھوٹی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیاز کے بیج بہت جلد خراب



ہو جاتے ہیں اور قوت نہ تو کھودیتے ہیں۔ مگر خاص احتیاط اور تردد سے یہ وقت رفع ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں بھی پیاز کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں لیکن دو افضل قرار دی گئی ہیں ایک نقرہ یا پٹنہ کا پیاز (Silver-Skin or Patna Onion) دوسرا بڑا سرخا (Large Red Onion) پیاز کی یہ اقسام جسامت میں بھی بڑی ہوتی ہیں اور ذائقہ بھی ان کا خوشگوار ہوتا ہے \*

ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب فرماتے ہیں کہ پیاز سلسلہ کوہ ہمالیہ میں ساڑھے دس ہزار فٹ کی بلندی تک کاشت کیا جاتا ہے۔ پنجاب کے میدانوں اور پہاڑوں میں سات آٹھ قسم کے جنگلی پیاز پائے جاتے ہیں اور یہ قریب قریب سب استعمال کیے جاتے ہیں۔ بعض ان میں سے خوش ذائقہ ثابت ہوئے ہیں \*

**طریق کاشت پیاز کی کاشت** کھلی جگہ کرنی چاہیئے جہاں سایہ نہ ہو ایسی زمین جس میں دو حصہ ریت اور ایک حصہ مٹی ہو اس کی کاشت کے لئے عین موزوں ثابت ہوئی ہے۔ سطح پر چار انچہ اونچی خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ اور اوپلوں اور لکڑی کی راکھ بچھا کر گہری جوتائی یا کھدائی کرا دینی چاہیئے۔ بعد ازاں مٹی کو خوب باریک کر کے کیاریوں میں ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر آدھ آدھ انچہ گہری قطاریں بنا لیں۔ ان میں بیج چھڑکواں بو کر بہت ہلکا مٹی کا غلاف چڑھا دیں۔ اگر وسط اکتوبر سے اخیر اکتوبر تک پیاز کی تخم ریزی کی جاوے تو بہت بہتر ہے۔ جب پودے کچھ اُدھے



ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی  
 دوری قریب پانچ انچ کے رہ جاوے چھانٹے ہوئے پودوں کو خالی  
 جگہ یا اور جس جگہ ضرورت ہو لگا سکتے ہیں یا بطور پنیری فروخت  
 کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں دسویں بارھویں نکائی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم  
 خشک ہو تو ہفتہ میں دو ایک مرتبہ پانی دیدینا چاہیئے۔ بعض اوقات  
 یہ صورت نمودار ہو جاتی ہے کہ پیاز کی گٹھیاں ابھی آدھی جسامت کو  
 بھی نہیں پہنچی ہوتیں کہ پتے زرد سے پڑ کر مرجھانے لگتے ہیں۔ جب  
 پودوں کی ایسی مریضانہ حالت نظر آوے تو فی الفور قطاروں پر اوپلوں  
 اور لکڑی کی راکھ چھڑک کر پانی دینا چاہیئے۔ اس عمل کو ہفتہ میں دو مرتبہ  
 کرنے سے پودے تندرست ہو جاویں گے۔ موسم گرما کے شروع میں پتے  
 خود بخود مرجھانے لگیں گے اسوقت پانی دینا کم کر دیں اور جب پتے بالکل  
 زرد پڑ جاویں اسوقت پیاز اکھاڑ لیں جن پودوں کے پتے ہرے رہیں  
 اور زرد ہونے کے آثار ظاہر نہ کریں انکو ہاتھ سے پکڑ کر زمین پر لٹا اور بچھا دینا  
 چاہیئے اس طرح وہ جلد پہلے پڑ جاوینگے۔ پیاز اکھاڑ کر دو ایک دن خوب دھوپ  
 میں سکھانا چاہیئے۔ بعد ازاں خشک مگر ہوادار کٹھیوں میں نمین پر بچھا دیں۔ اگر پیاز  
 کے اعلیٰ درجہ کے بیج حاصل کرنے ہوں تو بہترین ترکیب یہ ہے کہ کیاریوں  
 کو درست کر کے ان میں دو دو فٹ کے فاصلہ پر قطاریں بناویں۔ ان قطاروں  
 پر پیاز کی بڑی بڑی اور عمدہ گٹھیاں چھانٹ کر اٹھارہ اٹھارہ انچ کی دوری  
 پر ماہ اکتوبر میں بو دیں مگر گٹھیوں کو بونے سے پہلے تیز چاقو سے انکا اوپر



کاٹ حصہ کاٹ دیں۔ نیچے کا جڑ دار حصہ قطاروں پر لگا دیں اس حکمت سے پیاز کے ڈنٹھل بہت طاقتور پیدا ہو گئے اور بیج بھی بہت زور دار برآمد ہو گئے ۔

ایک تجربہ کار صاحب ذاتی تجربہ سے پیاز کی کاشت کی نسبت فرماتے ہیں کہ ”مڈیرا (Madeira) پرنگال اور سپین کے پیاز کی کیا بات ہے۔ انکی جقدر تعریف کی جاوے تھوڑی ہے۔ اگر پیاز کی کاشت منظور ہے تو جتنے الامکان تازہ بیج حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے کیونکہ پرانے بیج محض نکمے ہوتے ہیں۔ پیاز کے بیجوں کو اگر ذرہ بھی ہوا اور نمی پہنچتی ہے تو وہ تھوڑے ہی عرصہ میں ناکارو ہو جاتے ہیں جس کیاری میں پیاز بونا ہو اگر اس میں ریت کا جزو کم ہو تو آپ ملا دینا چاہیئے۔ اگر کھاد مجموعہ کے ساتھ لکڑی اور اولپوں کی راکھ اور عمارات کا پُرانا چُونہ خوب باریک پسوا کر شامل کر دیا جاوے تو فصل نہایت عمدہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر چھوٹی اقسام کے پیاز بونے ہوں تو ہر ایک پودے کا فاصلہ پلنچ اچھ کافی ہے ورنہ بڑی اقسام کے پودوں کی باہمی دُسی دُش اچھ ہونی چاہیئے۔ پنیری ایک جگہ سے دوسری جگہ اُسوقت لگانی چاہیئے جبکہ پودے قریب چھ اچھ اُوپے ہو جاویں۔ قطاروں کا باہمی فاصلہ چھوٹی اقسام کے لیئے دُش اچھ اور بڑی کے لیئے چودہ اچھ رکھنا مناسب ہے۔ پنیری کی جڑ کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں گاڑنا چاہیئے۔ پنیری لگانے کے بعد فی الفور گیاریوں کو پانی سے تر کر دینا واجب ہے جن پودوں سے تخم حاصل کرنے ہیں انکو خوب نشرو نما



ہونے دیں اور جب بیج پکنے پر آویں تو انکے سروں پر ٹمل کا کپڑا بطور  
تھیلی باندھ دیں تاکہ وہ پرندوں کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ جب تک پیاز کے  
پتے موسم گرما کے شروع میں مڑھانے نہ لگیں تب تک کیاریوں کو خشک نہونے  
دیں۔ پیاز کو کھودنے کے بعد دو تین دن دھوپ میں سکھانا چاہیئے۔ بعد  
از اس خشک اور ہوا دار مکان میں انھیں زمین پر پھیلا دینا چاہیئے (سطح  
سے کہ گتھیاں ایک دوسرے سے ملی نہ رہیں۔ ورنہ پیاز کی حیثیت میں فرق  
آ جاویگا۔ چونکہ پیاز کی فصل چھ ماہ میں تیار ہوتی ہے اس لئے ماہ اکتوبر  
میں ضرور تخمیری ہونی چاہیئے۔

ایک اور تجربہ کار صاحب پیاز کی کاشت کے متعلق چند ضروری امور اپنے  
مدت دراز کے تجربہ سے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جن کیاریوں میں پیاز بونا  
نہ نظر ہے انکی کھدائی یا جوتائی قریب دو فٹ گہری ہونی چاہیئے خوب بوسیدہ  
کھاد مجموعہ۔ اوپلوں اور کنڈوں کی راکھ ملا کر اچھی طرح سے ڈالنی واجب ہے  
جب پیاز کی گتھیاں کچھ موٹی ہو جاویں تو پودوں کی جڑوں میں ہفتہ میں  
ایک مرتبہ رفیق کھاد (مُراد گوہر اور مینگنیوں کو کسی گھڑے یا مشکے کے اندر  
پانی میں گھول کر اور تین چار دن رکھ کر) دیں۔

اگر پیاز کی پنیری وسط جنوری سے پہلے ایک جگہ سے  
اگھاڑ کر دوسری جگہ لگا دی جاوے تو اسکے پودے موسم گرما کے شروع ہوتے  
ہی پھول جاتے ہیں اور اس طرح سے انکی گتھیاں ہلکی رہ جاتی ہیں۔ نیز  
ان کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ جناب گولن صاحب کی رائے یہ ہے کہ



اول درجہ کا پیاز اُنھیں پودوں سے جنگی پنیری ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ نہ لگائی جاوے حاصل ہوتا ہے۔ اُنکی رائے ہے کہ بیجوں کو قطاروں پر جن کا ستوازی فاصلہ ایک ایک فٹ ہو بونا چاہیئے اور جب پودے پانچ چھ اونچے اُونچے ہو جاویں تو اُنھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دُوری قریب پانچ اونچے کے رہ جاوے۔ چھانٹے ہوئے پودوں کو اور جگہ لگا سکتے ہیں مگر ان سے درجہ دوم کا پیاز پیدا ہو گا۔ سہارنپور کے گرد و نواح میں عام کاشتکار پیاز کو پنیری کے ذریعہ لگاتے ہیں مگر وہ تخمیری نمبر میں کرتے ہیں۔ اس طرح دُست جنوری سے پہلے وہ پنیری کو قطاروں پر نہیں لگا سکتے اور انجام میں اچھا پیاز حاصل کر لیتے ہیں لیکن جناب گولن صاحب کا طریق کاشت بہر نوع افضل ثابت ہوا ہے \*

عام کیفیت ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ملک پرتگال کا پیاز زیادہ ٹرانگلستان کو جاتا ہے جہاں اسکی بہت قدر کیجاتی ہے اور گراں قیمت پر فروخت ہوتا ہے۔ چنانچہ پرتگال کے ایک کاشتکار نے صرف ایک ایکڑ زمین میں پیاز بو کر چھ سو ڈالر حاصل کیئے (ڈالر ملک امریکہ کا ایک چاندی کا سکہ ہے اور ایک ڈالر ہمارے سوا دو روپیہ کے برابر ہوتا ہے) پرتگال کے پیاز کو عام طور پر (cento one) دو پار ٹو او فی ان کہتے ہیں۔ ملک مصر کا بھی پیاز بہت مشہور ہے اور وہاں کے کاشتکار پیاز ایسی زمین میں زیادہ تر بوئے ہیں جہیں گندہک کا جزو زیادہ تر بوئے ہیں۔ جس زمین میں گندہک زیادہ ہو گی وہاں ٹڈرٹا پیاز عمدہ ہو گا \*



# ولایتی پیاز

(Allium Porum)

(Leek)

انگریزی یا لاطینی نام

لیک

ہندوستانی نام

کیرتھ۔ ولایتی پیاز۔ گندنی۔

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر مئی تک

وسط ستمبر سے اخیر اکتوبر تک

بیان و استعمال

اس پیاز کی گٹھیاں نہیں ہوتیں اسکی کاشت صرف اسکے موٹے اور گداز تنہ کے لئے کی جاتی ہے۔ اہل یورپ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اعلیٰ درجہ کے ہرے مصالحوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔

طریق کاشت کسی کیاری میں جو سایہ کے قریب ہو۔ بیج چھڑکواں بودیں اور ان کے اوپر باریک مٹی کا بہت ہلکا سا غلاف چڑھا دیں۔ جب بودے قریب پانچ انچہ کے اوپنچے ہو جاویں تو انھیں اکھاڑ اکھاڑ کر نالیوں میں لگانا چاہئے۔ بہتر یہ ہے کہ جب پنیری طیار ہو جاوے تو کیاریوں میں ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کے فاصلہ پر نالیاں کھودیں جن کی گہرائی چھ انچہ اور چوڑائی چار انچہ ہو ان نالیوں میں چھ چھ انچہ کی دُوری پر ایک ایک پنیری لگاتے چلے جاویں۔



پنیری لگاتے وقت صرف ایک انچہ کے قریب مٹی جس میں خوب بوسیدہ کھاد  
مجموعہ ملی ہوئی ہو چڑھا دیں۔ باقی نالیاں خالی رہنے دیں۔ کھودی ہوئی مٹی  
نالوں کے دونوں طرف کوٹ دیں کیونکہ اسے بعد میں کام میں لانا ہو گا۔ مہینہ دو  
مہینہ پودوں کو خوب بڑھنے دیں۔ اگر موسم خشک ہو تو چوتھے پانچویں پانی  
دیدیا کریں۔ جب دیکھیں کہ پودے کسی قدر تناور ہو گئے ہیں تو انکی جڑ میں  
ایک انچہ کھاد آمیز مٹی اور چڑھا دیں۔ بارہویں چودھویں نلائی کرتے رہیں اور  
نلائی کرنے کے بعد نالیوں کے دونوں طرف سے کھاد آمیز مٹی کی مقدار نالیوں میں ڈال دیا کریں  
پچھلے چھ مرتبہ اس عمل کو دہراتے سے نالیاں کیاریوں کی سطح کے ہموار ہو جاوینگی۔  
بعد ازاں صرف پندرھویں سوٹھویں نلائی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک  
ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔ نالیوں کے پُر ہو جانے کے  
دو تین ہفتہ بعد یہ پیاز قابل استعمال ہو جاتا ہے +

ایک تجربہ کار صاحب اس پیاز کی کاشت کے متعلق چند ضروری ہدایات  
اپنے ذاتی تجربہ سے یوں تحریر فرماتے ہیں کہ اس پیاز کی پنیری اٹھانے  
وقت خیال رکھیں کہ جڑوں کے ساتھ مٹی کا اتنا بڑا گولا لگا رہے کہ جڑوں  
کا ایک ریشہ بھی ننگا ہونے نہ پاوے۔ پنیری لگاتے ہی پانی دیدینا چاہیئے  
کھاد مجموعہ دو سال کی پُرانی اسکی جڑوں میں مٹی کے ساتھ ملا کر دینی  
چاہیئے۔ اگر کھاد تازہ ہوگی تو پودے کی خوبصورتی جاتی رہیگی اور اسکے نمو  
میں فرق آجاوے گا۔ ہر مہینہ پودوں کے سرے (مراد چوٹی کا حصہ) نوچتے رہیں  
تا کہ پودوں کی گردن سولی ہوئی جاوے جب پودے کچھ بڑے اور طاقتور



ہو جاویں تو دسویں بارھویں انھیں رقیق کھاد دیدینے سے بہت فائدہ  
مستور ہے +

عام کیفیت اس پیاز کی اقسام (Perpetual) اور  
(The Lyon) بہت مشہور ہیں اور ایک سال بعد صرف ایک  
پودے کی جڑوں کو علیحدہ کرنے سے بہت سے پودے لگا سکتے ہیں +

## ولایتی پیاز

(Allium Fistulosum)

(Ciboul)

انگریزی یا لاطینی نام  
سی بول

ہندوستانی نام  
ولایتی پیاز

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر مٹی تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

یہ بھی ایک قسم کا ولایتی پیاز ہے اس کی گٹھیاں نہیں ہوتیں مگر پتوں  
کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے +

طریق کاشت کیاریوں میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ بچھا کر چھ سات انچ  
گہری کھدائی کرانی چاہیئے اور مٹی کو ایسا باریک کیا جاوے کہ کھاد اور مٹی ایک



جان ہو جاوے۔ بعد ازاں چھ چھ انچہ کے فاصلہ پر آدھ آدھ انچہ گہری قطاریں بنا کر ان میں بیج چھڑکواں بو دیں۔ جب وہ پھوٹ آویں اور پودے چار پانچ انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری قریب پانچ انچہ کے رہ جاوے۔ بعد ازاں بارھویں چودھویں نکالی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔  
عام کیفیت پہاڑوں میں یہ پیاز بہت اچھا پیدا ہوتا ہے \*

## لسن

(Allium Sativum)

(Garlic)

انگریزی یا لاطینی نام  
گارلک

ہندوستانی نام  
لسن

### موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع فروری سے اخیر مارچ تک

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک

### بیان و استعمال

لسن کا استعمال زیادہ تر بطور مصالحہ ہوتا ہے مگر ادویات میں بھی یہ کام آ جاتا ہے۔ طریق کاشت کیاریوں میں خوب بوسیدہ بکھاد مجموعہ دیکر نو نو انچہ کے فاصلہ پر ایک ایک انچہ گہری قطاریں بنا لیں سران قطاروں میں چھ چھ انچہ کنی



دوسری پر لسن کی ایک ایک پھاڑی گاڑ دیں اس طرح پر کہ جڑ کی طرف کا سرا نیچے رہے اور گردن کا سرا اوپر کی جانب — پندرہویں سوٹھویں نکائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو دسویں بارہویں پانی دیدینا چاہیئے۔ موسم گرما کے شروع میں پتے مڑجھا جاتے ہیں اسوقت لسن کو زمین سے کھود لینا چاہیئے \* عام کیفیت لسن کے ڈنٹھلوں کے سرے پر جب گھنڈیاں نمودار ہوں تو انھیں پنج دینا چاہیئے ورنہ لسن چھوٹا رہ جاوے گا جن پودوں سے بیج حاصل کرنے ہوں انکی خوب غور و پرداخت رکھنی چاہیئے \*

## گندھن

(*Allium Ascalonicum*)

(Shallot)

انگریزی یا لاطینی نام  
شیلٹ

ہندوستانی نام  
گندنا۔ گندھن

موسم کاشت

(پہاروں میں)

(میدانوں میں)

شروع پاج سے اخیر اپریل تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

گندنا بھی لسن کی طرح بطور مصالحوہ استعمال کیا جاتا ہے \* طریق کاشت گندنا کو بیج سے بھی ہو سکتے ہیں اور اسکی گتھیوں سے بھی



کاشت کر سکتے ہیں۔ بالعموم اسے گٹھیاں سے بوئے ہیں۔  
 کیاریوں میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ دیکر ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر قطاریں  
 بنالیں۔ ان قطاروں پر چھ چھ انچہ کی دُوری پر گٹھیاں گاڑتے چلے جاویں  
 گٹھیاں لگانے کے بعد کیاریوں کو پانی سے تر کر دیں۔ پندرہویں سو پھویں نلانی  
 کرتے رہیں۔ اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے +  
 عام کیفیت موسم گریما کے شروع میں گٹھیاں کو اکھاڑ کر دو ایک دن دھوا  
 میں سُکھا لیں۔ بعد ازاں کسی خشک اور ہوا دار جگہ میں رکھ دیں +

## ولایتی لسن

(*Allium Scorodoprasum*)

(Rocambole)

(انگریزی یا لاطینی نام)		ہندوستانی نام
روکم بول		ولایتی لسن

### موسم کاشت

(میدانوں میں)		(بہاڑوں میں)
شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک		شروع فروری سے اخیر مارچ تک

بیان و استعمال

یہ بھی ایک قسم کا لسن ہے مگر عام لسن میں اور اس لسن میں صرف  
 یہ فرق ہے کہ لسن کی گٹھیاں جڑیں بیٹھتی ہیں اور اسکی گٹھیاں دُنگھلوں



کے سروں پر نمودار ہوتی ہیں۔ بطور مصالحوہ اسے استعمال کیا جاتا ہے \*  
**طریق کاشت** طریق کاشت بجنہ دہی ہے جو لسن کی بابت لکھا گیا ہے بجز اسکے  
 کہ لسن کی ایک ایک کر کے پھاڑیاں ہوتے ہیں اور اسکی سالم گٹھیاں جو دھٹلوں کے  
 اوپر ہوتی ہیں \*

**عام کیفیت** جہاں یہ عام طور پر پیدا ہوتا ہے وہاں اسے لسن کی جگہ استعمال  
 کرتے ہیں \*

## دھنیا

(Coriandrum Sativum)

(Coriander)

انگریزی یا لاطینی نام  
 کوری انڈر

ہندوستانی نام  
 دھنیا کوٹھ ریسر

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط پاج سے اخیر مئی تک

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک

## بیان و استعمال

دھنیے کا زیادہ پرخ بطور مصالحوہ ہوتا ہے مگر یہ ادویات کے کام میں بھی آتا  
 ہے۔ ہرے دھنیہ کے پتوں کی چٹنی بہت اچھی بنتی ہے۔ نیز پتے ترکاریوں  
 میں بھی خوشبو کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ اسکے نرم پتوں کو اہل یورپ  
 بطور سلاو استعمال کرتے ہیں \*



طریق کاشت اگر دھنیہ کو محض پتوں کے لئے ہونا ہو تو کیاریوں کو  
 درست کر کے بیج چھڑکواں ہو دیں۔ اگر موسم خشک ہو تو ہانچوں جھٹے پانی پیتے  
 رہیں۔ پیتے بہت جلد قابل استعمال ہو جاویں گے۔ اگر دھنیہ کی کاشت بیجوں  
 کے لئے کرنی منظور ہو تو کیاریوں میں ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر ایک ایک  
 انچ گہری قطاریں بنا لیں۔ ان میں بیج بو کر ہلکا ساسٹی کا غلاف چڑھا دیں  
 جب پودے پھوٹ کر پانچ چھ انچ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح  
 سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری قریب ایک ایک فٹ کے  
 جاوے۔ حسب ضرورت نلانی کر دیا کریں اور پانی دیدینا چاہیئے +  
 عام کیفیت پہاڑوں میں اگر محض پتوں کے لئے اسکی کاشت کرنی  
 منظور ہو تو موسم بہار اور گرما میں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ مگر بیجوں  
 کے لئے اگر اسکی کاشت مد نظر ہو تو موسم بہار میں تخم ریزی کرنی چاہیئے



# ہالم

(Lapidium Sativum)

(Cress, Garden)

انگریزی یا لاطینی نام  
کریس گارڈن

ہندوستانی نام  
ہالم - ہالوں - تیزک

## موسم کاشت

(بہاروں میں)

(میدانوں میں)

شروع پانچ سے اخیر ستمبر تک

شروع ستمبر سے اخیر فروری تک

## بیان و استعمال

ہالم کے پتے بہت چرپرے ہوتے ہیں اور انکے کھانے کے بعد منہ میں دیر تک جھال رہتی ہے۔ اسکے بیج ادویات کے کام آتے ہیں اور ہرے پتے بطور مصالحوں استعمال کیئے جاتے ہیں۔ اہل یورپ اسکے چھوٹے چھوٹے اور نرم پتوں کو بطور سلاڈ استعمال کرتے ہیں۔ اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو انھیں سجاوٹ کے کام میں لاتے ہیں۔ یورپ میں ہالم کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اور یہ قریب قریب سب دیکھنے اور ذائقہ میں عمدہ ہوتی ہیں۔

**طریق کاشت** ہالم کی کاشت اگر محض پتوں کے لیئے کرنی منظور ہے تو بیج کیاریوں یا گملوں میں چھڑکواں بویں۔ اوپر سے ہلکا مٹی کا خلاف چڑھا دیں اور مین کے فوارے سے ہلکا پانی دیدیں۔ روز مرہ کیاریوں یا



گملوں کو تر کرتے رہیں۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر پتے قابل استعمال ہو جاویں گے۔ پتوں کو نوچنا نہیں چاہیئے۔ تیز چاقو سے کاٹ لینا بہتر طریق ہے۔ اگر لگاتار پتوں کی ضرورت ہو تو موسم سرما میں ایک ایک ہفتہ کے بعد تخمیری کرنی چاہیئے۔ اگر ہالم کے بیج حاصل کرنے میں مد نظر ہوں تو بہتر ہے کہ تخمیری دُست نو مبر سے پہلے پہلے کیجاوے۔ پہلے کیاریوں کو درست کر کے اور خوب بوسیدہ کھاؤ مجموعہ دیکر ایک ایک فنٹ کے فاصلہ پر ایک ایک انچ گہری قطاریں بنا لیں۔ ان میں بیج چھڑکواں بو دیں۔ جب پودے چار پانچ انچ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دُوری چار انچ کے قریب رہ جاوے۔ بعد ازاں دسویں پندرھویں نلایں کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے \*

عام کیفیت ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ہالم کے گملوں یا چھوٹی چھوٹی کیاریوں کے اوپر اگر شیشہ دار ڈھانچا دن میں رکھ دیا جاوے تو پتے نہایت ملائم رہتے ہیں \*



# جل ہالم

(Nastutium Officinale)

(Gress, water)

انگریزی یا لاطینی نام  
گریس - واٹر

ہندوستانی نام  
جل ہالم

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

اخیر فروری سے اخیر جون تک

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک

بیان و استعمال

جل ہالم کا ساگ بنتا ہے اور اہل یورپ بڑے شوق سے اسے بطور سلا  
استعمال کرتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ میں جہاں پانی رواں رہتا ہے جل ہالم خود  
رو پائی جاتی ہے \*

طریق کاشت جل ہالم کی کاشت میں پوری کامیابی اسی وقت ہو  
سکتی ہے جبکہ اس کی قدرتی پیدائش کی نقل کی جاوے۔ بہترین ترکیب یہ  
ہے کہ کنوئیں کے قریب ایک کیاری بنائی جاوے۔ اس کیاری کی مٹی میں  
ریت کا جزو ضرور ہونا چاہیئے۔ اگر پہلے موجود نہ ہو تو دریا کا بالوریت خود  
شامل کر دینا چاہیئے۔ نیز خوب بوسیدہ پتوں کی کھاد کیاری میں دینی چاہیئے۔  
باغیچہ کو پانی دینے کی غرض سے کنوئیں سے پہلے ایک بڑی ٹالی نکالتے ہیں



اور پھر اس میں سے اور چھوٹی چھوٹی نالیاں مختلف اطراف کو نکالی جاتی ہیں جس کیاری کے بنانے کا ذکر کیا گیا ہے وہ بڑی نالی سے ملی ہوئی ہونی چاہیئے مگر نالی سے اسکی سطح کسی قدر نیچے رکھی جاوے۔ تاکہ بڑی نالی جب زور سے چلے تو تھوڑا تھوڑا پانی کیاری میں آتا رہے۔ نیز اس کیاری کے ایک گوشہ میں (جو بڑی نالی سے ملا ہوا ہو) چھوٹا سا سُورخ کر دینا چاہیئے تاکہ پانی کیاری میں بھرتا رہے مگر ساتھ ہی اس کیاری کے دوسرے سامنے والے گوشہ میں بھی ایک چھوٹا سا سُورخ کر دینا چاہیئے تاکہ کیاری کا زائد پانی نکل کر باغیچہ کی چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعہ اُور جہاں ضرورت ہو بہ جاوے۔ جل ہالم بیجوں کے ذریعہ بھی بو سکتے ہیں اور سال ڈیڑھ سال کے پودوں کی جڑوں کو علیحدہ کرنے سے بھی۔ اگر بیجوں کے ذریعہ کاشت کرنی منظور ہے تو کیاری میں بیج چھڑکواں بو کر اوپر سے ہلکا مٹی کا غلاف چڑھا دیں۔ اور فے الفور کیاری کو پانی سے خوب تر کر دیں۔ روزمرہ تازہ پانی کیاری میں چھوڑنا چاہیئے مگر اعتدال سے زیادہ نہیں۔ صرف کیاری کو خوب تر رکھنا کافی ہے۔ جب پودے کچھ اونچے ہو جاویں اور ابتدائی پتیاں تبدیل کر لیں تو پانی کی مقدار بتدریج بڑھانی چاہیئے یہاں تک کہ پودے ۲ انچ پانی آسانی سے گوارا کر سکیں اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ غرقاب ہو گئے ہیں یا پانی کے زور سے اُکھڑے جاتے ہیں بلکہ یہ کیفیت ہو کہ پودے پانی کے اندر لہراتے رہیں۔ جب پودے تناور ہو جاویں تو کیاریوں کے دونوں سُورخ ہر وقت کھلے رکھیں تاکہ جب تک کنواں چلتا رہے تازہ پانی



کیاری میں سے گزرتا رہے۔ اگر کسی دن کنواں چلانے کی ضرورت نہ ہو تب بھی آدھ گھنٹہ جل ہالم کی کیاریوں کی خاطر اُسے چلاویں۔ جل ہالم بند پانی میں کبھی سرسبز نہیں ہوتی۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اسے ہر روز تازہ پانی دیتے رہیں۔ اگر جل ہالم کو پُرانے پودوں کی جڑوں سے ہونا ہو تو انھیں کیاری میں چار چار انچہ کے چوگرد فاصلہ پر بویں اور پانی شروع سے ہی خوب دینا چاہیئے مگر چونکہ نئے لگائے ہوئے پودوں کی جڑوں کا پانی کی روانی سے اکٹھر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے جڑوں کے اوپر سٹی دبانے کے بعد پکی اینٹوں کے ٹکڑے بطور وزن رکھیں جب پودے اچھی طرح سے جڑیں پکڑ جاویں تو اینٹ کے ٹکڑے نکال کر پھینک دیں +

عام کیفیت پہاڑوں میں چونکہ کنوئیں کام نہیں دیتے اس لیے جل ہالم کو آب رواں کے کنارے لگانا چاہیئے۔ امریکن کریس (*Barbarea Proecox or American Cress*) جل ہالم بدل خیال کیجاتی ہے مگر اسکا طریق کاشت بجنسہ وہی ہے جو ہالم کے بیج حاصل کرنے کی نسبت لکھا گیا ہے +



# بڑی سولف

(Foeniculum Vulgare)

(Fennel)

انگریزی یا لاطینی نام

فے نل

ہندوستانی نام

بڑی سولف

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پرج سے اخیر مئی تک

شروع اکتوبر سے اخیر نومبر تک

بیان و استعمال

یہ پودا یورپ کے بعض حصوں اور ہندوستان کے کئی مقامات میں خود رو پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے کئی حصوں میں اسکے بیجوں کے لیے اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اسکے پتوں کی ترکاری بنتی ہے اور بیج مصالکے اور ادویات کے کام میں آتے ہیں۔ اسکے ڈنٹھلوں کو اہل یورپ بطور سلاو استعمال کرتے ہیں ۛ

طریق کاشت کیاریوں میں اٹھارہ اٹھارہ انچہ کے فاصلہ پر آدھ آدھ انچہ گہری قطاریں بنا کر ان میں بیج چھڑکواں بو دیں اور جب پودے قریب چار انچہ کے اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری قریب ایک ایک فٹ کے باقی رہ جاوے۔ پندرہویں سوٹھویں



نلائی کرتے رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے +

عام کیفیت اسکی جڑ ادویات کے مصرف میں آتی ہے اور پتے جب بڑے ہو جلتے ہیں تو اُن سے زیبائش کا کام لیا جاتا ہے +

## کلوہنجی

(*Nigella Sativa*)

(*Nigella or Small Fennel*)

انگریزی یا لاطینی نام  
نائیگلا

ہندوستانی نام  
کلوہنجی

## موسم کاشت

(یہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع اکتوبر سے وسط نومبر تک | شروع اپریل سے اخیر مئی تک

## بیان و استعمال

کلوہنجی کے بیج مصالحے اور ادویات کے کام میں آتے ہیں +  
طریق کاشت یکایوں میں ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر آدھ آدھ  
انچے گہری قطاریں بنا کر ان میں بیج چھڑکواں بوویں جب پودے دو تین  
انچے اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے  
کی باہمی دوری قریب چھ چھ انچ کے رہ جاوے۔ پندرھویں سو پھویں نلائی کرتے رہیں۔



اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے \*  
 عام کیفیت اگر پہاڑوں میں اسے بونا ہو تو ایسی جگہ انتخاب کرنی  
 چاہیئے کہ جہاں دن میں دھوپ اچھی طرح سے آتی ہو۔ ایک صاحب لکھتے  
 ہیں کہ کلونجی کے دانوں کو کپڑوں کے صندوقوں میں رکھا جاتا ہے تاکہ کڑا نہ لگے \*

## اجوائن

*Ligusticum Ajowan-Psychotis*  
*Ajowan* - (*Lovage*)

انگریزی یا لاطینی نام  
 لوویج

ہندوستانی نام  
 اجوائن

### موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع اپریل سے آخر ستمبر تک

شروع اکتوبر سے وسط نومبر تک

### بیان و استعمال

بطور مصالحہ استعمال کی جاتی ہے اور ادویات کے کام میں آتی ہے \*

طریق کاشت بجنہ وہی ہے جو کلونجی کی بابت لکھا گیا ہے \*

عام کیفیت اجوائن کے ہرے پتے دیکھنے میں خوبصورت ہوتے ہیں  
 اسلئے سجاوٹ کا کام دیکھتے ہیں \*



# سفید رائی

(Brassica Alba)

(Mustard, Garden)

انگریزی یا لاطینی نام

سٹرڈ۔ (گاڑون)

ہندوستانی نام

سفید رائی

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

باغیچوں میں سارے سال بوسکتے ہیں شروع پرج سے اخیر ستمبر تک

## بیان و استعمال

رائی کی دو اصل کئی قسمیں ہیں مگر سفید رائی بہت عمدہ خیال کیجاتی ہے ہندوستان میں رائی زیادہ تر بطور مصالحہ آچار وغیرہ میں پڑتی ہے اور کسی قدر ادویات میں کام آتی ہے۔ لیکن اہل یورپ رائی کو بطور خوراک روز مرہ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا قول ہے کہ اسکے کھانے سے معدہ کی اصلی طاقت بڑھتی ہے۔ کھانا خوب کھایا جاتا ہے۔ جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اور صحت ہمیشہ درست رہتی ہے۔ چنانچہ یورپ کے جن ممالک میں اسکے کھانے کا رواج کم تھا وہاں بھی اب اس کا استعمال ترقی پر ہے اسکے پتوں کو بطور سلاو استعمال کیا جاتا ہے †

طریق کاشت۔ سفید رائی کو باغیچوں میں جہاں پانی حسب ضرورت مل سکے



سائے سال لگا تار ہو سکتے ہیں۔ اگر اسکی پتوں کے لیئے کاشت منظور ہو تو کیاریوں گملوں یا کوندوں وغیرہ میں بیج چھڑکواں بودیں اور حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا پانی دیتے رہیں۔ جب پودے تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو پتوں کو تیز چاقو سے کاٹ کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر بیجوں (مراو رائی) کے لیئے کاشت منظور ہو تو پہلے کیاریوں کو درست کر کے دو دو فٹ کے فاصلہ پر آدھ آدھ انچہ گہری قطاریں بنا لیں۔ ان میں بیج چھڑکواں بودیں۔ جب پودے تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری قریب ایک ایک فٹ کے رہ جاوے۔ بعد ازاں ہند رھویں سوٹھویں نلائی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے +

عام کیفیت اگر پہاڑوں میں سفید رائی کو موسم بہار اور گرما میں بونا ہو تو کھلی جگہ ہو سکتے ہیں لیکن برسات میں اسے برآمدوں میں گملوں صندوقوں یا کوندوں وغیرہ میں بونا چاہیئے۔ اگر برآمدہ میں جگہ نہ ہو تو اور کسی سایہ دار جگہ (مثلاً چھیرا پھوس کے بنگلوں وغیرہ) کے نیچے ہو سکتے ہیں +



نرو

(Lavendula Vera)

(Lavendula<sup>or</sup> Spica)

(Lavender)

انگریزی یا لاطینی نام  
لیونڈرہندوستانی نام  
نرو

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

وسط پرج سے اخیر سٹی تک

ماہ اکتوبر

## بیان و استعمال

اسکے خوشبودار پتے بطور ہرے مصالحے استعمال کیئے جاتے ہیں۔ اور اسکے پھولوں سے عرق کھینچا جاتا ہے۔ یہ عرق بیش قیمت عطر کا کام دیتا ہے اور اہل یورپ اسکے بہت شائق ہوتے ہیں۔ مگر میدانوں میں یہ شاذ و نادر پھولتا ہے اس لئے صرف اسکے پتے کام آ سکتے ہیں۔ پہاڑوں میں اس کی کاشت کامیابی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اور وہاں اس کے پھولوں سے عرق کھینچا جا سکتا ہے۔

طریق کاشت موسم سرما میں اسکی قلمیں کاٹ کر لگا سکتے ہیں یا ماہ اکتوبر میں اسکے بیج بوسکتے ہیں۔ اگر بیج بونے ہوں تو یہ ترکیب کرنی چاہئیے کہ گداوں یا کھلے صندوقوں میں ایک حصہ باغیچہ کی مٹی ایک حصہ ریت اور



ایک حصہ صرف پتوں کی کھاؤ بھر دیں۔ ان میں تخم چھڑکواں بو دیں۔ اور  
 فوارہ سے روز مرہ ہلکا پانی دیتے رہیں۔ جب پودے کچھ بڑے ہو جاویں  
 تو ایک ایک پودا (سے مٹی کے گولے کے) اکھاڑ اکھاڑ کر ایک ایک چھوٹے  
 گملے میں لگاتے جاویں۔ مُراد یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے گملے میں صرف  
 ایک پودا لگایا جاوے دو ڈھائی مہینہ بعد ہر ایک پودے کو ان چھوٹے  
 گملوں سے اکھاڑ اکھاڑ کر ذرہ بڑے گملوں میں ایک ایک کر کے لگا  
 دیا جاوے۔ جب پودے ایک سال کے ہو جاویں تو انہیں کھلی کھاریوں  
 میں قطار در قطار ڈھائی ڈھائی فٹ کے چو گرد فاصلہ پر لگا دینا چاہیے۔  
 اگر کھاریوں کی مٹی نرم اور ریگ آمیز ہوگی تو پودے مدت دراز تک  
 قائم رہیں گے۔ ورنہ اگر بہت سخت اور چکنی ہوگی تو پہلی ہی برسات  
 میں پودے مڑجھا جاویں گے +

عام کیفیت پہاڑوں میں اگر اسے لگانا ہو تو قلیں اور بیج دونوں موسم  
 بہار میں لگانے چاہئیں۔ پہاڑوں میں اگر پودے جڑیں پکڑ جاویں تو  
 سالہا سال تک قائم رہتے ہیں +



# بن تلمسی

(*Origanum Vulgare-Common Marjoram*)

(*Origanum Onites - Pot - Marjoram*)

(*Origanum Marjoram-Sweet Marjoram*)

(*Origanum Heracleoticum - Winter Sweet Marjoram*)

انگریزی یا لاطینی نام  
مار جورم

ہندوستانی نام  
بن تلمسی - مروا

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پانچ سے دس جون تک

ماہ اکتوبر

## بیان و استعمال

ان چاروں قسم کے پودوں کے پتے بہت خوشبو دار ہوتے ہیں۔ اور ممالک یورپ میں انھیں ہرے اور سکھا کر دونوں طرح بطور مصالحہ استعمال کرتے ہیں۔ ہندوستان میں انکا استعمال بہت کم ہے۔ بعض اشخاص عام مروے کے پتے چٹنی میں ڈال لیا کرتے ہیں یا حسب ضرورت ادویات کے کام میں آجاتے ہیں \*

طریق کاشت گملوں یا کیاریوں میں انکے بیج چھڑکواں بو کر پھیری پیدا کر لینی چاہیئے۔ جب پودے چار پانچ انچ اونچے ہو جاویں تو یا انھیں



کیاریوں میں قطاروں پر جن کا باہمی فاصلہ ایک ایک فٹ ہو نو نو  
 انچہ کے فرق سے لگا دیں یا بڑے گملوں میں ایک ایک دو دو لگا دیں  
 اگر کیاریوں کی ڈھال اچھی ہوگی اور برسات کا فالتو پانی انہیں دیر  
 تک کھڑا نہیں ہوگا تو یہ پودے کئی سال تک اچھی حالت میں رہیں گے  
 ورنہ سوکھ جاویں گے۔ اگر ہر سال نئے بیجوں سے یہ پودے لگائے جاویں  
 تو خوشبو اچھی رہے گی۔ البتہ پہاڑوں میں ہر سال نئے بیج بونے کی  
 کچھ ضرورت نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہاڑوں میں پتوں کی خوشبو میں فرق  
 نہیں آتا۔ وہاں قلموں کے ذریعہ یا پودوں کی جڑوں کو علیحدہ علیحدہ  
 کر کے جس قدر چاہیں انکی کاشت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اگر قلمیں لگانی  
 ہوں تو برسات میں لگاویں اور اگر جڑوں کے ذریعہ کاشت کرنی ہو تو  
 موسم بہار میں جبکہ پودوں میں نیا شکوفہ نہ نکلا ہو کریں \*  
 عام کیفیت ہرے پتوں کو ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں اگر پتوں  
 کو سکھا کر رکھنا منظور ہو تو پھول آنے سے پہلے شاخوں کے سرے  
 توڑ کر اور دو تین دن سایہ میں خشک کر کے بوتلوں میں بند کر دیں  
 اور ڈاٹ خوب کس کر لگا دیں تاکہ ذرہ بھی ہوا اندر نہ جاسکے۔ شیشہ  
 کے ڈاٹوں کی بوتلیں اس مطلب کے لیے عین موزوں ہوتی ہیں \*



# گیندا

(*Calendula Officinalis*)

(*Marigold - Pot*)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

میری گولڈ (پاٹ)

گیندا

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع مارچ سے آخر جون تک

ماہ اکتوبر

بیان استعمال

ہندوستان میں گیندا صرف پھولوں کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ لیکن ممالک یورپ میں اسکی کاشت زیادہ تر مصالحوں کے لئے کیجاتی ہے۔ یعنی اسکے پھولوں

سے ہرے مصالحوں کا کام لیا جاتا ہے۔

طریق کاشت۔ کسی کیاری یا گلوں وغیرہ میں اسکے بیج چھڑکواں۔ بو کر

پنیری پیدا کر لیں جب پودے پانچ چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں

اکھاڑ اکھاڑ کر قطاروں پر جن کا باہمی فاصلہ قریب پندرہ پندرہ انچہ

کے ہو ایک ایک فٹ کے فرق سے لگا دیں پندرہویں سوٹھویں نلانی کرتے

رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا کافی ہے۔

عام کیفیت۔ ممالک یورپ بالخصوص فرانس میں گیندے کی بہت سی



قتیں ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ اگر انکے بیج منگوا کر بوئے جاویں  
تو باغیچہ کی خوبصورتی دو بالا ہو سکتی ہے +

## پودینہ

(Spear-mint - Mentha Viridis)

(Peppermint - Mentha Piperita)

(Pennyroyal - Mentha Pulegium)

(Mint)

انگریزی یا لاطینی نام  
منٹ -

ہندوستانی نام  
پودینہ - پینا -

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پانچ سے اخیر اپریل تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

پودینہ کی کئی قسمیں ہیں اور سب کی صورتیں اور ذائقے کی مقدار مختلف  
ہوتے ہیں۔ پودینہ کے پتے چٹنی وغیرہ میں مصالحو کا کام دیتے ہیں خشک  
کر کے انھیں مدت تک رکھ چھوڑتے ہیں۔ اور حسب ضرورت استعمال میں لاتے  
ہیں۔ پودینہ ادویات کے کام میں بھی آتا ہے۔ چنانچہ اسکا عرق بہت زیادہ  
کھینچا جاتا ہے۔ پیپر منٹ (Peppermint) جسے ولایتی پودینہ بھی



کہتے ہیں۔ عام پودینہ کی نسبت بہت تیز ہوتا ہے۔ مالک۔ یورپ سے اسکا  
 عرق چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بند ہو کر آتا ہے اور یہ شیشیاں بڑے  
 داسوں کو بکھتی ہیں۔ سپے ارمنٹ (Spear mint) میدانوں میں جیسا  
 کہ چاہیے پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ پہاڑوں میں بالخصوص کوہ نیلگیری پر خوب ہوتا ہے  
**طریق کاشت** گو پودینہ کو بیجوں کے ذریعہ بوسکتے ہیں مگر یہ بہت کم  
 دستیاب ہوتے ہیں۔ عام طور پر پودینہ کی کاشت اس طرح کی جاتی ہے  
 کہ پودینہ کے چھتوں کو نکالکر اور انکی جڑوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے بوسکتے  
 ہیں۔ ان جڑوں کو قطار در قطار جن کا باہمی فاصلہ قریب ایک ایک فٹ  
 کے ہو چھ چھ انچہ کے فرق سے لگا دینا چاہیئے۔ دسویں بارھویں گودائی کرتے  
 رہیں اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ پانی دے دینا کافی  
 ہے جن کیاریوں میں پودینہ لگایا جاوے انھیں پہلے سے خوب درست کر لینا  
 چاہیئے۔ اگر بیجوں سے پودینہ بونا ہو تو پہلے بیج بوسکر پودے پیدا کر لیں۔  
 پھر حسب ہدایت بالا انھیں قطار در قطار کیاریوں میں لگا دیں +  
 عام کیفیت برسات میں پودینہ اکثر مرجھا جاتا ہے۔ جن کیاریوں میں بارش  
 کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے ان میں پودینہ دیر تک سرسبز نہیں رہ سکتا۔ پودینہ  
 کی کیاریوں کی ڈھال اچھی ہونی چاہیئے تاکہ فالتو پانی رکانہ رہے۔ جاڑوں  
 میں جبکہ رات کو سخت پالا پڑتا ہے ان دنوں پودینہ کی کیاریوں کو چٹائیل  
 یا پھوس سے ڈھک دینا چاہیئے۔ گرمیوں میں پودینہ گملوں میں جنھیں درختوں  
 کے سایہ کے نیچے رکھ دیا جاوے اچھی حالت میں رہتا ہے۔ گرمیوں میں دن



کے وقت اسے سایہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھیڑ بکری کی سینگنیاں  
اوپلوں اور لکڑی کی راکھ۔ اور پتوں کی کھاد پودینہ کے حق میں نہایت  
مفید ثابت ہوئی ہے +

# پارسلے

(*Petroselinum Sativum*)

(Parsley)

انگریزی یا لاطینی نام  
پارسلے

ہندوستانی نام

+

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

شروع پلج سے اخیر مئی تک  
شروع ستمبر سے وسط اکتوبر تک

اخیر ستمبر سے اخیر نومبر تک

## بیان و استعمال

پارسلے کے پتے بطور ہرے مصالحے استعمال کیے جاتے ہیں اور سجاوٹ کے  
کام میں بھی آتے ہیں۔ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ اسکی جڑوں کو ابال کر  
کھا سکتے ہیں اور انکا ذائقہ پارسنپ کی مانند ہوتا ہے +

طریق کاشت اگر ممکن ہو سکے تو اسکی کاشت کے لیے ایک قطعہ زمین  
انتخاب کرنا چاہیے جو کسی قدر سایہ دار ہو۔ کیاریوں کو درست کر کے کھاد



ایک فنٹ کے فاصلہ پر ایک ایک انچ گہری قطاریں بنا دیں۔ تخم ریزی سے دو ایک دن پہلے کسی قدر انھیں پانی سے تر کر دینا چاہیئے تاکہ بیج بونے کے وقت زمین مندار ہو۔ بیج قطاروں پر بونے چاہئیں۔ جب پودے تین چار انچ اونچے ہو جاویں تو انھیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دُورزی قریب چار انچ کے رہ جاوے۔ بارہویں چودھویں نکلائی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دیدینا چاہیئے۔ جب پودے تناور ہو جاویں تو پندرہویں سولہویں کیسے قدر ہلکی ریت کھا دُن کی جڑوں میں دیدینی نہایت مفید ہوگی +

عام کیفیت اگر موسم خشک ہو تو پارسلی کے بیج دو تین ہفتہ میں جا کر پھوٹتے ہیں ورنہ پانچ چھ دن میں پھوٹ آتے ہیں +



# روز میری

(Rosmarinus Officinalis)

(Rosemary)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

روز میری

+

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پچ سے اخیر اپریل تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

اس کی کاشت اسکے خوشبو دار پتوں کے لیے کی جاتی ہے جسے مصالحہ کا کام لیا جاتا ہے۔ اسکے عطر کو صابون وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں۔ نیز بہتے ادویات کے مصرف میں آتے ہیں +

**طریق کاشت گملوں میں** یزج چھڑکواں بو کر پنیسری لگا لیں۔ جب پودے تین انچہ کے قریب اونچے ہو جاویں تو انھیں اکھاڑ لیں اور ایک ایک پودا ایک ایک چھوٹے گملے میں لگا دیں۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد بڑے گملوں میں چھوٹے گملوں سے اکھاڑ کر ایک ایک کر کے پودے لگا دیں۔ حسب ضرورت پانی دیتے رہیں اور دسویں بارھویں گملوں کو آہستگی کے ساتھ گوڑ دینا چاہیئے۔ چونکہ موسم برسات کے شروع ہوتے ہی پودے مڑھانے لگتے ہیں اس لیے بہتر



یہ ہے کہ موسم گرما میں پودوں کے سرے کاٹ کر اور دو ایک دن سایہ میں خشک کر کے بوتلوں میں بند کر کے آئندہ استعمال کے لیے رکھ چھوڑیں۔ پہاڑوں میں اس کے پودے گلوں میں حسب ہدایت مندرجہ بالا لگا دیں جب وہ ایک فٹ کے قریب اوپنے ہو جاویں تو انہیں اکھاڑ کر کھلی کیاریوں میں قطار در قطار لگا دیں۔ پہاڑوں میں یہ پودا مدت دراز تک اچھی حالت میں رہ سکتا ہے۔  
 عام کیفیت روز میری کے پتے سجاوٹ کے کام میں بھی آتے ہیں۔

## سیستی

(*Salvia Officinalis*)

(Sage)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

سیج

سیستی

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(سیدانوں میں)

شروع پلج سے اخیر مئی تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

سیستی کی کاشت اسکے ہرے پتوں کے لیے کی جاتی ہے جنہیں بطور مصالحہ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز اسکی چوٹی کے نرم نرم کٹے بھی مصالحہ کے



کام میں لائے جاتے ہیں۔ اہل یورپ اس سے (Sage Cheese) "سیج کا پنیر" بناتے ہیں \*

**طریق کاشت** اگر غور و پرداخت کیجاوے تو میدانوں میں یہ پودا سالہا سال تک قائم رہ سکتا ہے۔ اسکے بونے کے لئے ایسی یکاریاں انتخاب کرنی چاہئیں کہ جنکی مٹی سخت اور بہت چکنی نہ ہو۔ نیز وہ نشیب میں نہوں۔ اور انکی ڈھال اچھی ہو تا کہ بارش کا پانی دیر تک رکا نہ کھڑا رہے۔ ماہ اکتوبر میں اسکے بچوں کو گملوں میں چھڑکواں بو کر پنیری پیدا کر لیں۔ جب پودے تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اکھاڑ کر اور ایک ایک کر کے بڑے گملوں میں لگا دیں یا یکاریوں میں قطاروں پر جن کا باہمی فاصلہ قریب اٹھارہ انچہ کے ہو ایک ایک فٹ کے فرق سے لگا دینا چاہیئے۔ اس کی کاشت یہاں پودوں کی قلموں سے بھی کیجا سکتی ہے۔ مگر یہ عمل نومبر یا دسمبر میں کرنا چاہیئے قلمیں ہمیشہ عمدہ اور پختہ شاخوں سے لینی چاہئیں۔ اور حسب ضرورت پانی دیتے رہیں \*

**عام کیفیت** سیستی کے چھ سات پودے ایک باغ کے لئے کافی ہیں۔ اور زیادہ کی ضرورت ہو تو اسے قطاروں پر لگانا چاہیئے۔ پہاڑوں میں اگر قلموں کے ذریعہ اسکی کاشت منظور ہو تو یہ عمل ماہ اپریل یا موسم برسات میں کرنا واجب ہے \*



# سیووری

(Satureia Hortensis : Satureia Montana)

(Savory Summer : Savory Winter)

انگریزی یا لاطینی نام

ہندوستانی نام

سیووری

+

## موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع پلج سے اخیر اپریل تک

ماہ اکتوبر

## میان و استعمال

سیووری دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک سیووری (سمر) یعنی گرما کی۔ دوسری سیووری (ونٹر) یعنی سرما کی۔ ان دونوں کی کاشت انکے خوشبودار پتوں کے لیئے کی جاتی ہے جنھیں بطور مصالحہ استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ سیووری ہندوستان میں شاذ و نادر ہوئی جاتی ہے لیکن اگر بوئی جاوے تو باسانی تمام پیدا ہو سکتی ہے۔

طریق کاشت گرما کی سیووری کو ہمیشہ بیجوں کے ذریعہ بوتے ہیں اسکے بیجوں کو پہلے گملوں یا صندوقوں میں چھڑکواں بو کر پنیری پیدا کر لیں۔ جب پلوے تین چار انچہ اونچے ہو جاویں تو انھیں اکھاڑ کر یا تو گملوں میں ایک ایک کر کے لگا دیں یا کیاریوں میں اس طرح پر لگاویں کہ ہر ایک



پودے کا چوگرد باہمی فاصلہ ایک ایک فٹ کے قریب ہو۔ سرما کی سیووری کو پہاڑوں میں یا تو قلموں کے ذریعہ بوتے ہیں یا پُرانے پودوں کی جڑوں کو نکال کر ایک ایک کر کے لگا دیتے ہیں۔ مگر سیدانوں میں بالعموم بیجوں کے ذریعہ اسکی کاشت کیجاتی ہے۔ اسکی بھی تخمیری گراما کی سیووری کی طرح ماہ اکتوبر میں کی جاتی ہے۔ اس کے پودوں کا بھی کیاریوں میں چوگرد فاصلہ ایک ایک فٹ کے قریب کافی ہے۔ گملوں میں ایک ایک پودا لگا دینا چاہیئے۔ اُونچے پہاڑوں پر جڑیں ماہ مارچ میں لگا سکتے ہیں۔ اور قلمیں ماہ اپریل یا موسم برسات میں +

عام کیفیت۔ گراما کی سیووری کے سروں کے پتے اُس وقت کاٹ لینے چاہئیں جبکہ وہ پھولنے لگیں۔ اسی طرح سے سرما کی سیووری کے سروں کے پتے وسط موسم گرما میں کاٹ لینے عین مناسب ہیں۔ پتوں کو دو تین دن سایہ میں خشک کر کے بوتلوں میں بند کر دینا چاہیئے +

---



# ارپا

(Thymus Vulgaris)

(Thyme)

انگریزی یا لاطینی نام  
تھائم

ہندوستانی نام  
ارپا

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

اوسط پانچ سے آخر مئی تک

ماہ اکتوبر

بیان و استعمال

اسکی کاشت اسکے خوشبو دار پتوں کے لئے کیجاتی ہے جنہیں بطور مصالحہ کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے +

طریق کاشت یہ ایک نازک پودا ہے اس لئے میدانوں میں اسکی کاشت بجائے کھلی کیاریوں میں کرنے کے گلوں میں کرنی چاہیئے۔ مگر اکتوبر میں گلوں کو کسی قدر سایہ دار جگہ میں رکھ کر مرکب مٹی سے پر کر دینا چاہیئے۔ (مرکب مٹی سے یہاں مراد یہ ہے کہ ایک حصہ دریا کا بالوریت۔ ایک حصہ باغیچہ کی عمدہ مٹی اور ایک حصہ بوسیدہ پتوں کی کھاؤ کو خوب ملا کر ہارپک کر لیں) بعد ازاں گلوں میں بیج چھڑکواں بو کر اوپر سے بہت ہلکا مٹی کا غلاف چڑھا دیں۔ اور ساتھ ہی ٹہین کے قوائے



سے ٹھوڑا سا پانی دیدیں۔ اسی طرح تیسرے چوتھے ہلکا سا پانی دیتے  
 رہیں۔ جب یہ پنییری دو تین انچہ اونچی ہو جاوے تو اسے اکھاڑ لیں  
 اور ایک ایک پودے کو ایک ایک چھوٹے گیلے میں لگا دیں ان گملوں  
 میں بھی وہی مرکب مٹی بھریں جسکے بنانے کی ابھی ترکیب لکھی گئی ہے۔  
 مہینہ دو مہینہ بعد جب پودے تناور ہو جاویں تو تیسری مرتبہ انھیں اکھاڑ  
 اکھاڑ کر ایک ایک پودا ایک ایک بڑے گیلے میں لگا دیں۔ مگر ان بڑے  
 گملوں میں بھی وہی مرکب مٹی بھرنی چاہیئے۔ جسکی ترکیب شروع میں  
 بتا دی گئی ہے۔ پانی ہمیشہ اسقدر دینا چاہیئے کہ گملوں کی مٹی بالکل  
 خشک نہو جاوے۔ تر رہے مگر کبھی زیادہ پانی نہیں دینا چاہیئے۔ برسات  
 میں یہ پودے مشکل سے بچتے ہیں۔ اسیلئے ہر سال نئے ہونا مناسب ہے۔  
 سرے کے پتے موسم گرما میں کاٹ کر دو تین دن سایہ میں سکھا لینے  
 چاہئیں۔ اور پھر بوتلوں میں بند کر کے آئندہ استعمال کے لیئے رکھ چھوڑیں +  
 عام کیفیت اگر پہاڑوں میں اسے ہونا منظور ہو تو تخمیزی موسم بہار یا  
 شروع موسم گرما میں کرنی چاہیئے۔ پنییری کو ایک سال تک گملوں میں ہی رہنے  
 دیں بعد ازاں اکھاڑ کر کھلی کیاریوں میں لگا سکتے ہیں۔ جب تک پودے گملوں  
 میں رہیں تب تک کسی قدر انھیں سایہ میں رکھنا چاہیئے مگر جب کیاریوں میں  
 لگا دیں تو وہاں کسی قسم کا سایہ ور کار نہیں ہوتا سخت اور نشیب کی  
 زمینیں اسکی کاشت کے لیئے موثر نہیں ہیں۔ اور حقیقت بہت اچھا مصالحو  
 ہے۔ اس لیئے اسکی کاشت پر توجہ کرنی چاہیئے +



# ٹے رے گن

(*Artemesia Dracunculus*)

(*Tarragon*)

انگریزی یا لاطینی نام  
ٹے رے گن -

ہندوستانی نام  
+

موسم کاشت

(پہاڑوں میں)

(میدانوں میں)

شروع اپریل سے آخر مئی تک


شروع اکتوبر سے آخر نومبر تک

بیان و استعمال

اس پودے کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور پتے نہایت خوشبو دار ہوتے ہیں جنہیں بطور مصالحہ استعمال کیا جاتا ہے +

**طریق کاشت** کیاریوں کو درست کر کے ایک ایک فٹ کے فاصلہ پر آدہ آدہ اچھے گرمی قطاریں بنانی چاہئیں۔ ان میں بیج چھڑکواں بو دیں۔ جب وہ پھوٹ آویں اور دو تین اچھے اونچے ہو جاویں تو انہیں اس طرح سے چھانٹ دیں کہ ہر ایک پودے کی باہمی دوری قریب اٹھارہ اٹھارہ انچ کے رہ جاوے۔ پندرھویں سوٹھویں نلانی کرتے رہیں۔ اور اگر موسم خشک ہو تو ہفتہ میں ایک مرتبہ پانی دے دینا کافی ہے +  
عام کیفیت - موسم گرما میں اسکے بے کاٹ لینے چاہئیں اور بوتلوں میں بند کر کے آئندہ استعمال کے لیے رکھ چھوڑیں +





(Crocus Sativus)

(Saffron)

انگریزی یا لاطینی نام  
سیفرن

ہندوستانی نام  
کیسر

### بیان و استعمال

کیسر کی نسبت اسوقت عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سوائے کشمیر کے اور کسی جگہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے البتہ یہ امر واقعہ ہے کہ ریاست کشمیر کے ایک حصہ میں اسکی کاشت مدت دراز سے کی جاتی ہے۔ اس لئے تمام کشمیر زعفران زار مشہور ہو گیا ہے چونکہ اسکی کاشت نہایت محدود ہے اس لئے اصل کیسر گراں اور کمیاب ہے۔ بازاروں میں سستے داموں جو کیسر بکتا ہے اُس میں زیادہ تر کرم (Carthamus Tinctorius) (Safflower) کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ اصل کیسر کی کمی کے سبب نقلی کیسر بہت بننے لگا ہے۔ چنانچہ دہلی میں نقلی کیسر اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہرے پیاز کی سوت کے مانند باریک جڑوں کو خوب پانی میں صاف کر کے تیز قینچی سے باریک باریک کتر لیتے ہیں۔ پھر ہار سنگھار کے پھولوں کو جوش دیکر اُس میں رنگ لیتے ہیں اور سایہ میں خشک کر کے ڈبّیوں میں بھر دیتے ہیں۔ بیچ بیچ میں کسی قدر اصل کیسر بھی خوشبو دینے کے لئے رکھ دیتے ہیں۔ یہ



نقلی کیسر چار آنہ چھ آنہ تولہ پک جاتا ہے۔  
جنوبی یورپ میں زعفران کی بہت کاشت کی جاتی ہے۔ کیسر ہندوستان  
میں کھانوں میں بطور مصالحو رنگ اور خوشبو دینے کے لیے استعمال کیا جاتا  
ہے یا ادویات کے کام میں آتا ہے۔ سبز اسکا عطر بھی کھینچا جاتا ہے جو  
بہت گراں بکتا ہے +

ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب لکھتے ہیں کہ ”کیسر کی کاشت بہت تھوڑی سی  
جگہ میں بمقام پام پور متصل سرنگرد واقع ریاست کشمیر کی جاتی ہے  
عین موقعہ پر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ کیسر کی گٹھیاں ماہ جون میں  
لگائی جاتی ہیں۔ اور انھیں پانی نہیں دیا جاتا۔ نیز یہ کہ زیادہ پانی دینے سے  
کیسر کی فصل کو نقصان پہنچتا ہے۔ دس بارہ برس کے بعد جبکہ گٹھیاں  
پُرانی ہو جاتی ہیں تو انھیں نکال دیتے ہیں اور انکی جگہ اور نئی لگا  
دیتے ہیں۔ ماہ اکتوبر میں کیسر پھولتا ہے اور اُس وقت اُسے چن لیا  
جاتا ہے۔ کیسر کے پھول بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں ۱۹۶۶ء میں کیسر  
کی چند گٹھیاں اپنے ساتھ وٹاں سے لاہور لے آیا اور انھیں لگا دیا تھا۔  
اگلے موسم بہار میں کیسر کے پودوں پر پھول آ گیا تھا۔“

گویا ۱۹۶۶ء میں ڈاکٹر صاحب کو خاص لاہور میں کیسر کی کاشت میں کامیابی ہوئی تھی  
جب لاہور میں ایک مرتبہ کامیابی ہوئی تو کوئی وجہ بظاہر نظر نہیں آتی  
کہ میدانوں میں اگر توجہ کے ساتھ اسکی کاشت کیجاوے تو کیوں نتیجہ  
اچھا نہ نکلے (جلندھر لاچھاوٹی) میں ایک یورپین صاحب کسی جگہ سے کیسر



کی گٹھیاں اپنے باغیچہ میں لگانے کے لیے لائے تھے۔ اتفاق سے وہ  
 مہینہ ڈیڑھ مہینہ اُنکے صندوقچہ میں پڑی رہیں اُنھیں نکالنا یاد نہیں رہا۔  
 بعد ازاں اُنھیں خیال آیا اور گٹھیوں کو نکال کر لگا دیا گیا۔ بہت جلد وہ  
 سر سبز ہو گئیں اور پودے خوب بڑھنے لگے۔ مگر افسوس کہ اُنکی ایک بیک  
 تبدیلی ہو گئی۔ اور اُنکے بعد باغیچہ کئی مہینہ تک کس پرسی کی حالت  
 میں رہا۔ اس لیے کیسر کے پودے خشک ہو گئے +

ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہر سال کسی قدر کیسر ملک فارس سے  
 براہ افغانستان ہندوستان میں آتا ہے۔ بہر حال اس کی کاشت کے  
 تجربات میدانوں اور پہاڑوں میں شوق سے لگا تار کرنے چاہئیں +



# ہینگ

(*Ferula Asafoetida*)

(*Asafoetida*)

## بیان و استعمال

ہینگ کی نسبت بعض اشخاص کے عجیب و غریب خیالات ہیں۔  
اس کا زیادہ تر استعمال بطور مصالحوں ہوتا ہے۔ مگر ادویات میں  
بھی یہ کام آتی ہے +

ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب فرماتے ہیں کہ وادی خاگان میں ہینگ  
کا پودا خود رو پایا جاتا ہے۔ بلکہ سلسلہ کوہ ہمالیہ میں آٹھ ہزار فٹ  
کی بلندی سے بھی اوپر کہیں کہیں یہ نظر آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کلکھارن  
صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر فلکونر صاحب نے مقام اسکردو سے  
ہینگ کے پودوں کے بیج سنگوا کر کوہ منصوری پر کھلی جگہ میں  
بوئے اور بہت جلد ہینگ کے پودے پیدا ہو گئے۔ اس بیان  
سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جب ہینگ کے پودے کوہ منصوری  
پر باسانی تمام بیجوں کے ذریعہ پیدا ہو گئے تو کوئی وجہ نہیں  
ہے کہ وہ اور پہاڑوں پر اسی آسانی سے نہ ہو جاویں۔ مجھے یہ تحقیق  
نہیں ہوا کہ ہینگ کی کاشت کے تجربات کبھی میدانون میں بھی کیے  
گئے ہیں یا نہیں۔ مگر میرا قیاس ہے کہ اگر دلی شوق سے کیے



جاویں تو غالب ہے کہ کامیابی ہو جاوے۔ بالفرض اگر میدانوں میں نہ تو پہاڑوں پر ہی سہی۔ پہاڑ کے باشندوں کو ایک نئی تجارت کی شے مل جاوے گی جس سے وہ اپنی آمدنی کو آسانی سے بڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں افغانستان سے ہر سال سینکڑوں من ہینگ آکر اچھے داموں بلا تردد فروخت ہو جاتی ہے۔ اگر ہندوستان میں ہی یہ چیز افراط سے پیدا ہونے لگے تو زیادہ فائدہ کی صورت ہو سکتی ہے۔

افغانستان میں ہینگ کے پودے میدانوں اور پہاڑوں پر خود رو پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ درہ بولان کی شمالی پہاڑیوں سے ہینگ زیادہ تر حاصل کی جاتی ہے۔ افغانستان میں ماہ اپریل و مئی میں ہینگ کے پودوں کی جڑوں کے چاروں طرف کسی تیز گھماڑی یا چاقو وغیرہ سے ٹک دیئے جاتے ہیں۔ شگاف ہوتے ہی دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو ہوا سے فی الفور جم جاتا ہے۔ یہ جما ہوا دودھ ”ہینگ“ کہلاتا ہے۔ بیلٹو صاحب لکھتے ہیں کہ افغانستان میں ہینگ کے پتوں کا ساگ بناتے ہیں۔ اور پودے کی نرم نرم کونہلوں کو مکھن میں نیک مصالحو دے کر تلتے ہیں اور شوق سے کھاتے ہیں۔

میں نے ذاتی طور پر جو ہینگ کے پودے کی نسبت اب تک تحقیقات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہینگ کا پودا قد اور صورت میں ڈنڈا کھور کے پودے کے مشابہ ہوتا ہے اسکے تنہ اور جڑ پر چھوٹی سی تیز گھماڑی سے ٹک



دیئے جاتے ہیں۔ اس عمل کے بعد گوند خود بخود نکل کر جم جاتا ہے۔  
 اسے جمع کر لیتے ہیں۔ اس وقت تک یہ گوند اصل ہینگ ہوتا ہے مگر  
 بیوپاری اس خالص گوند میں آمیزش کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ہینگ کے  
 پودے کی جڑ کو سُکھا کر اور اُس کا آٹا کر کے گوند میں شامل کر دیتے  
 ہیں اور کچھ بین اور جو کا میدہ وغیرہ ملا دیتے ہیں۔ یہی مال ہندوستان  
 میں فروخت کے لئے آتا ہے۔ ہینگ کے پودے کی نسبت حال میں مینے  
 جناب گولن صاحب سے دریافت کیا تھا وہ لکھتے ہیں کہ ”یورپ کے بوٹے  
 تک گارڈنز میں ہینگ کا پودا مینے بطور عجائبات دیکھا ہے۔ عام طور پر  
 نہیں پایا جاتا۔ کوہ منصوری پر کئی مرتبہ اسے لگایا گیا مگر ہر مرتبہ بہت  
 جلد ضائع ہو گیا۔ اسکے پتے (*Fennel*) بڑی سونف کے پتوں  
 کے بہت مُشابہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں۔ اسکی  
 جڑ موٹی اور گداز ہوتی ہے۔ جن مقامات میں یہ خود رو پایا جاتا ہے وہاں  
 کی آب و ہوا بالعموم جاڑوں میں بہت سرد اور گرمیوں میں گرم اور خشک  
 ہوتی ہے۔ کوہ منصوری پر اس پودے کی جڑ ہمیشہ برسات میں گل  
 جاتی تھی۔ بظاہر جنوبی حصہ کوہ ہمالیہ کی بارشیں اس پودے کے حسب  
 حال نہیں معلوم ہوتیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان اطراف میں اسکی کاشت میں  
 کامیابی نہیں ہوتی۔“

اگر ہندوستان کے مختلف حصوں میں اسکی کاشت کے مُتواتر تجربات شوقِ علم  
 احتیاط کے ساتھ کیئے جاویں تو بہت جلد حوصلہ افزا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ \*



# پمبش

(*Rheum Rhaponticum*)

(*Rheum Emodi*)

(*Rheum Moorcroftianum*)

(*Rheum Spiciforme*)

(*Rhubarb*)

انگریزی یا لاطینی نام  
رہو بارب

ہندوستانی نام  
پمبش

موسم کاشت

(بہاروں میں)

(میدانوں میں)

شروع پچ سے اخیر اپریل تک

کاشت نہیں کی جاتی

بیان و استعمال

میدانوں میں پمبش کی کاشت میں کامیابی نہیں ہوتی۔ بہاروں میں یہ خاطر خواہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسکی کاشت اسکے پتوں ڈنٹھلوں اور جڑوں کے لیئے کی جاتی ہے۔ اسکے پتوں کی چٹنی پیستے ہیں۔ ساگ بھی بنا لیتے ہیں۔ سُکھا کر رکھ چھوڑتے ہیں اور حسب ضرورت بھگو کر بطور سُوکھے پودینہ کے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ڈنٹھلوں اور گندلوں کی بھی چٹنی بنتی ہے اور اُبال کر ساگ بنایا جاتا ہے۔ اسکی جڑ ریوند چینی




کھلاتی ہے اور یہ ادویات میں کام آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسکے پھول بھی کھائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں اسے "رواش" کہتے ہیں۔ اور وہاں یہ پودا جنگلوں میں بکثرت خود رو پایا جاتا ہے۔ افغانستان میں بکے ڈنٹھلوں کو کچا بھی کھا جاتے ہیں اور ان کا کاٹ کر آچار بھی ڈال دیتے ہیں۔ سنا جاتا ہے کہ پیمیش کی جڑ علاقہ گرٹھوال میں مجیٹھ کے ساتھ ملائی جاتی ہے۔ اور اس سے سرخ رنگ رنگنے کا کام لیتے ہیں۔ اہل یورپ بھی اسکے ڈنٹھلوں سے ایک قسم کا آچار بناتے ہیں۔ کوہ ہمالیہ میں یہ پودا بقول ڈاکٹر سٹوارٹ صاحب چھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی سے لیکر سترہ ہزار فٹ کی بلندی تک خود رو پایا جاتا ہے طریق کاشت میدانوں میں اسکی کاشت کرنا فضول ہے۔ اگر میدانوں میں ماہ اکتوبر میں گھنیری کچا دے تو بیج پھوٹ آتے ہیں اور پودے بھی کچھ بڑے ہو جاتے ہیں لیکن موسم گرما کے شروع ہوتے ہی وہ رخصت ہو جاتے ہیں +

پہاڑوں میں اسے جہاں چاہیں بو سکتے ہیں۔ لیکن ان باغیچوں میں جو شمال رویہ ہوتے ہیں ہمیشہ خوب نشو و نما ہوتی ہے۔ موسم بہار میں گملوں یا کھلے ہوئے صندوقوں میں عمدہ باغیچہ کی مٹی بھر کر بیج چھڑکواں بو دیں۔ جب پودے دو تین ابتدائی پتیاں بدل لیں تو انھیں اکھاڑ اکھاڑ کر کسی قدر سایہ وار جگہ میں تین تین فٹ کے چوگرد فاصلہ پر لگا دیں۔ جہاں یہ پودے لگائے جاویں وہاں کی زمین عمدہ طاقت و



اور مرطوب ہونی چاہیئے لیکن ڈھال اچھی ہو ورنہ اگر پانی رکھا کریگا تو برسات میں ان پودوں کی جڑیں گل جاوے گی مہینہ میں ایک مرتبہ جڑوں کے ارد گرد گوڑ دیا کریں اور ناکارہ خار و خس نکال دیا کریں تاکہ پودوں کے بڑھنے میں فرق نہ آوے۔ ہر سال موسم خزاں میں خوب بوسیدہ کھاد مجموعہ جس میں گوبر کا جزو زیادہ ہو جڑوں کے ارد گرد تھامے کھود کر دیدیا کریں۔ اور پھر سطح کو ہموار کر دیں۔ بونے کے دن سے دو سال بعد جا کر پہلی فصل طیارہ ہوتی ہے بعد ازاں اگر غور و پرواخت رکھی جاوے تو سالہا سال تک پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ۔

عام کیفیت۔ اسکے ڈنٹھلوں کو سکھا کر پنساری ”رباس“ کے نام سے ادویات کے لئے فروخت کرتے ہیں۔ رباس زیادہ تر افغانستان سے ہندوستان میں آتی ہے ۔



بقلم احقر غلام رسول کاپی نویس پنجابی ساکن چند ڈیالہ ڈھابہ ضلع گوجرانوالہ



# امور قابل اضافہ

(ہر ایک ترکاری کے بیان میں مندرجہ ذیل ہدایات اور اضافہ کر لینی چاہئیں)\*  
ٹنڈس

(طریق کاشت کے ضمن میں) ٹنڈس بونے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے +  
”ٹنڈس کے بیج چھ سات دن پانی میں تر رکھیں تاکہ پوست نرم  
اور مغز پھول جاوے۔ جس زمین میں انھیں بونا مد نظر ہو اُسکے اوپر  
بوسیدہ کھاد مجموعہ رینچھا کر اُل چلوا دیں۔ بعد ازاں پانی چھوڑوا دیں۔ جب  
زاید تری دور ہو جاوے تو سہاگا پھروا کر بیجوں کو چھڑکواں بو دینا چاہیے  
تخمیزی کے بعد باہستگی دہ بارہ سہاگا پھروا دیں تاکہ بیج ڈھپ جاویں  
آٹھ دس دن کے اندر پودے برآمد ہو جاویں گے۔ بین پچیس دن بعد  
گڈائی (نلائی) شروع کرا دیں۔ ایک مہینہ میں پانچ مرتبہ گڈائی ہونی  
چاہیئے۔ ہر ایک گڈائی کے بعد ساتھ ساتھ کھریہ سے تھپ کر مٹی کو  
باریک کر دیں۔ جب پودوں کی بیلین چلنے لگیں اور پتوں پر رُواں  
سانگل آوے تو کھیت میں کھارے بنا کر حسب ضرورت آبپاشی  
کرتے رہیں +



## خرپڑہ

(طریق کاشت کے ضمن میں) بونے کی ایک ترکیب یہ بھی ہے  
 ”جس طرح سے ٹنڈس بونے کی ابھی ترکیب لکھی گئی ہے اسی طرح  
 خرپڑے بوتے ہیں۔ البتہ رینجوں کو بجائے چھ سات دن پانی میں تر  
 رکھنے کے صرف ایک رات بھگونا کافی ہے +

## کھیر

(طریق کاشت کے ضمن میں)

ایک تجربہ کار صاحب لکھتے ہیں کہ اگر ذیل کی ترکیب سے کھیرے بوئے  
 جاویں تو پوری کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

”کھیت میں باریک اور بوسیدہ کھاد مجموعہ بچھا کر گہرا ہل چلوا دیں  
 بعد ازاں پانی دلو دیں۔ جب ترمی اعتدال پر آجاوے تو چار چار فٹ  
 کے فاصلہ پر قطاریں بنا لیں۔ قطاروں کے دونوں جانب چھ چھ انچہ کی  
 دُوری پر ایک ایک بیج بو دیں جب تک بیل نہ چلے دسویں بارھویں گڈائی کرتے  
 رہیں۔ آپہاشی ہفتہ میں دو مرتبہ ہونی چاہیئے۔ جب پھل لگنے شروع ہو  
 جاویں تو روز مرہ یا ایک دن ناغہ کر کے صبح یا شام کے وقت پانی  
 دیتے رہیں۔ اگر برسات میں بھی آپہاشی ہوتی رہے تو کچھ مضائقہ نہیں  
 ہے۔ کیونکہ آب چاہ سے پھل زیادہ آتا ہے +



## گلڑی

(طریق کاشت کے ضمن میں)

گلڑی کے بیج بھی کھیرے کی طرح قطاروں کے دونوں طرف چھٹ چھٹ  
انچہ کی دُوری پر بونے چاہئیں \*

## مُولی

(سینگروں کے ضمن میں)

عام طور پر مُولی کو کاٹ کر بونے سے چھوٹی قسم کے سینگرے پیدا ہو  
جاتے ہیں مگر ایک قسم سینگروں کی علیحدہ بھی ہے۔ یہ صرف بیجوں سے  
بونے جاتے ہیں اور انکی جڑ میں مُولی نہیں ہوتی۔ یہ سینگرے خوش ذائقہ  
اور قریب ایک ایک ہاتھ کے لمبے ہوتے ہیں۔

## لوکی

(طریق کاشت کے ضمن میں)

ایک لمبی قسم کی لوکی ماہ اگست میں بونئی جاتی ہے۔ جعفری چھتر یا  
جھانکڑوں پر بیلین چڑھا دیتے ہیں۔ بعض بعض لوکیاں چھٹ چھٹ سات  
سات فٹ لمبی ہو جاتی ہیں۔ جاڑے کے شروع میں خوب لگتی ہیں۔  
لیکن جب کوہر زیادہ پڑنے لگ جاتی ہے اُسوقت اسکی بیلین ماری جاتی ہیں  
اگر کوہر سے بچاؤ رہے تو جاڑے بھر لوکیاں اُترتی رہتی ہیں \*



# گریٹ ایسٹرن ہوٹل کمپنی لمیٹڈ

گماشتہ میسرز سٹن اینڈ سنز

یہ کارخانہ تمام دینا میں ممتاز ہے۔ اور ہر قسم کے پھول اور ترکاریوں وغیرہ کے تخم اس سے نہایت عمدہ اور تازہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ مفصل حال ان کی فہرست منگوا کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تھوڑی مقدار کے خریداروں کی آسانی کے لئے ہر قسم کے تخم چھوٹے صندوقوں میں بند کئے گئے ہیں اور حسب فرمائش بھیجے جاتے ہیں۔ ذیل میں ان کے نرخ لکھے جاتے ہیں :-

پھولوں کے بیج ایک صندوق میں ۲۰ اقسام قیمت نقد روپیہ	ترکاریوں کے تخم ایک صندوق میں ۴۰ اقسام قیمت نقد روپیہ
ترکاریوں کے تخم ایک صندوق میں ۲۵ اقسام قیمت نقد چھ روپیہ	پھول اور ترکاریوں کے بیج ایک صندوق میں ۴۰ اقسام
۲۰ اقسام ۲۰ روپیہ	قیمت نقد ..... روپیہ

اس سے کم مقدار میں بھی ہر قسم کے چھوٹے چھوٹے پولندوں میں موجود ہیں ہر ایک قسم علیحدہ علیحدہ ہے۔ تخم سب یکساں ہیں۔ قیمت مقدار کی کمی بیشی پر مقرر کی گئی ہے۔ ہر ایک پولندہ ۵ آنہ سے لیکر ایک روپیہ ۸ آنہ تک قیمت کا موجود ہے۔ نقد قیمت بھیجکر طلب فرمائیے یا بصریہ قیمت طلب پارسل + تخم گھاس۔ لوسرن اور مرغزاروں کی گھاس۔ مقدار تخم فی پولندہ پاؤ بھر ایک روپیہ اقسام مرط۔ فی کوارٹ ۲ روپیہ ۸ آنہ سے لیکر دو روپیہ بارہ آنہ تک فی پنٹ ایک روپیہ ۶ آنہ سے لیکر ایک روپیہ ۸ آنہ تک۔

اقسام سیم فی پنٹ ایک روپیہ ۶ آنہ سے لیکر ایک روپیہ ۸ آنہ تک + درخواستیں ذیل کے پتہ پر بھیجئے :-

گریٹ ایسٹرن ہوٹل کمپنی لمیٹڈ کلکتہ



# ضروری اشتہار

اکثر اصحاب نے یہ ایماء فرمایا ہے کہ سبزی ترکاری  
”گھاس چارہ“ پھل اور پھولوں کی کتابوں کا دیوناگری  
بھاشا میں بھی شائع ہونا ضروری ہے تاکہ ہندی داں  
اصحاب اور بالخصوص کنیاؤں اور استریوں کو ان مضامین  
سے واقف ہونے کا موقع ملے۔ ہم اس تجویز کو بہت معقول  
سمجھتے ہیں۔ لیکن سوال صرف خریداری کا ہے۔ اگر ہر ایک  
کتاب کے لئے ڈھائی ڈھائی سو درخواستیں بھی آجاویں  
تو فی الفور کتابیں بھاشا میں چھپ کر تیار ہو سکتی ہیں  
بلکہ ان میں کچھ اور بھی اضافہ کیا جاسکتا ہے۔  
درخواستیں ذیل کے پتہ پر آنی چاہئیں :-

منیجر امپیریل بک ڈپو چاندنی چوک دہلی



## نوٹ

اس کتاب میں تختیرزی کے لیے بیجوں کی مقدار بٹل - کوارٹ - اونس وغیرہ میں دی گئی ہے۔ یعنی بہت کوشش کی کہ دیسی اوزان میں یہ مقدار لکھی جاوے مگر اب تک کامیابی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ بٹل کوارٹ - اونس وغیرہ دراصل اوزان نہیں ہیں بلکہ انگریزی پیمانے ہیں۔ مثلاً بٹل ایک پیمانہ غلہ و بیجوں وغیرہ کا ہے جو ۴۲ ۱۵۰ ۲۱ مکعب انچ کا ہوتا ہے۔ اس میں آٹھ گیلن گیہوں آتے ہیں۔ اور یہ ایک گیلن مساوی ۸ پونڈ یعنی چار سیر کے ہوتا ہے۔ اور بڑی وقت یہ پیش آئی ہے کہ ایک پیمانہ میں مختلف اقسام کے بیج یکساں وزن کے نہیں اترتے مثلاً ایک بٹل کے پیمانے میں اگر مٹر کے بیج بھر کر تولے جاویں گے تو وہ بوجہ جسامت میں بڑے ہونے کے جگہ زیادہ گھیریں گے۔ اور وزن میں بمقابلہ رائی کے بیجوں کے کم نکلیں گے۔ یعنی رائی کے بیج بوجہ چھوٹے ہونے کے جگہ کم لیں گے۔ اس لیے وزن میں مٹر کے بیجوں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ نیز یہ انگریزی پیمانے ہندوستان میں کیاب ہیں۔ البتہ ہر ایک ترکاری کے تخم جس مقدار میں مطلوب ہوں تخم فروشوں سے فرمایش کرنے پر دستیاب ہو سکتے ہیں۔ ہندوستان کے بھی بعض مقامات میں غلہ وغیرہ کے پیمانے پائے جاتے ہیں مگر ان میں بھی دو مختلف قسم کے غلے یکساں وزن میں نہیں اتر سکتے۔



# غلط نامہ

التماس۔ براہ مہربانی اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل غلطیاں درست کر لیجئے

صفحہ نمبر	غلط	صحیح	صفحہ نمبر	غلط	صحیح
-----------	-----	------	-----------	-----	------

[صفحہ ۱۶۳ سے پہلے بجائے ۱۶۲ کے ۱۰۲ غلطی سے چھپ گیا ہے]

۳۴	+	استعمال	۱۵۵	۵	پچاس
۵۸	۱۲	+	۱۵۶	۱۶	بویا جانا
۶۰	۷	۵۰ گز لمبی	۱۵۸	۵	گئے
"	۱۴	سے ٹریو	"	۷	انگلی
۷۲	۲	Dioica	۱۵۹	۱۶	Moringa Morning
۸۱	۱۶	انے	۱۶۷	+	Bulbous Bulbous
۸۶	۱۸	نائڈوں			- rooted = Rooted
۹۱	۱۹	ہو جانا ہے	۱۷۸	۱۷	سوٹ
۹۵	۴	Zingiber Zingiber	"	۱۸	"
۱۰۲	+	گلوب	۱۸۳	۹	کھڑی
۱۱۷	۷	Beet Brat	۱۸۷	۱۲	اندائیو
۱۲۶	۱۴	گلوں	۲۵۴	۱۵	(چھاوٹی)
۱۳۴	۱۰	کرسن مشاری			جلندہر (چھاوٹی)

تمت

Cloves

لونگ

Black pepper

رونگ

مشر



مصالح

انگریزی	ہندوستانی	کشمیری
Aniseed	سواف	بادیانہ
Sweet Basil	تکلی - ریحان	بہ ہر
Caraway	زیرہ	زلیو
Onion	پیاز	پوران
Garlic	لہسن	لوسن
Coriander	دھنیا - گشنہ	دانیہ دل
Lovage	اجوائن	جاوین
Marjoram	بن تلی	ون بہ ہر
Mint	پودینہ	پدینہ
Saffron	کیر - زعفران	کونگ
Assafoetida	ہینگ	ہینگ
pepper. Chilli	لال مرچ	مر تڑہ وانگن
Ginger	لونیٹا ادرک	شونٹ ادرک
cochiscom	مرغ کیرس - تاج فوس	مہ ول
Turmeric	ہلدی	کیر
menth		وینٹہ
Cardamums	الابی	آکس
Cinnamon	دارچینی	آلم دال چین بڑہ آلم



حوداد کشمیری ترکاریاں

انگریزی	ہندوستانی	کشمیری
<i>Malva rotundifolia</i>		سوٹل
<i>Amarantus</i>	چولائی - لال ساگ	ب
<i>sorrel</i>	باجی ساگ	ع
<i>Rumex</i>	کھٹا یا چوکا پالک	ادرنج
<i>purslane</i>	کافہ - خرف	نہ نہ
<i>Album</i>	باہو - بھو	کنہ
<i>Dioscorea deltoidea</i>		کرٹ
<i>polygonum</i>		ہند میدانی
<i>polystachyum</i>		ژدک لڈر
<i>Rhubarb</i>	پلمیش	یکمہ خاک
<i>Rheum</i>		
<i>Dipsacus inermis</i>		اوپل خاک
		لے گاس
<i>capsella Bursa-pastoris</i>		کراک منہ
<i>Mushroom</i>	مڈھنگری	سپٹ
<i>morel</i>		کنہ



water Cress

جل ٹالم

مانہ پیر

chicory

کاسنی

کاسنی ہند

lettuce

کاسنی

کوسنہ

polygonum sp

کاسنی

درہ

Campanula sp

کاسنی

تڑا ہاک

R. acetosa

کاسنی

چونچور مار

کاکو تر

دھند

menth

دینہ

Hydnum coralloides

دھنگرا

کادھور

Agaricus flamman

"

سیر

cress

چمک

مازھیل

مترہ ہد

تڑدک ترن